


醫
學
心
悟
三



天都普明子程國彭鍾齡著

中風門

中風者真中風也。有中腑中臟中血脈之殊。中腑者中在表也。外有六經之形症。與傷寒六經傳變之症無異也。中太陽用桂枝湯。中陽明葛根湯加桂枝。中少陽小柴胡湯加桂枝。其法悉具傷寒門。茲不贅。中臟者中在裏也。其人眩仆昏冒不醒人事。或痰聲如曳鋸。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素挾虛寒。或暴中新寒。則風水相遭。寒冰徹骨。而風為寒風矣。假如其人素有積熱。或鬱火暴發。則風乘火勢。火借風威。而風為熱風矣。為



熱風多見閉症。其症牙關緊閉。兩手握固。法當疏風開竅。先用
搐鼻散吹之。次用牛黃丸灌之。若大便閉結。腹滿脹悶。火
盛者。以三化湯攻之。為寒風多見脫症。其症手撒脾絕。眼
絕。口張心絕。聲如鼯。肺絕。遺尿腎絕。更有兩目直視。搖頭
髮直如粧。汗出如珠。皆脫絕之症。法常溫補元氣。急用大劑附
子理中湯灌之。若痰涎壅盛。以三生飲加人參灌之。間亦有寒
痰壅塞。介乎閉脫之間。不便驟補者。用半夏橘紅各兩許。濃煎
至一杯。以生薑自然汁對沖。頻頻灌之。其人卽甦。然後按其虛
而調之。然予自揣生平。用附子理中治愈者甚多。其用牛黃丸
治愈者亦恆有之。惟三化湯一方。並未舉用。此必天時地土人



北京中医药大学图书馆藏

事之不同。然寒熱之劑。屹然並立。古方具在。法不可泥。以備參酌。中血脈者。中在經絡之中也。其症口眼歪斜。手足不遂是也。大秦苧湯主之。偏在左。倍用四物湯。偏在右。佐以君子湯。左右俱病。佐以八珍湯。並虎骨膠丸。此治真中之大法也。

口噤角弓反張。瘧病也。但口噤而兼反張者。是已成瘧也。小續命湯。口噤而不反張者。是未成瘧也。大秦苧湯。其瘧病俱見前傷寒兼症中。宜細加查核。

不語有心脾腎三經之異。又有風寒客于會厭。猝然無音者。大法若因痰述心竅。當清心火。牛黃丸。神仙解毒丹。若因風痰聚。

于脾經當導痰涎。二陳湯加竹瀝薑汁。並用解語丹。若因腎經
虛火上炎。當壯水之主。六味湯加遠志石菖蒲。若因腎經
厥逆。當益火之源。劉河間地黃飲子。或用虎骨膠丸。加
風寒客于會厭。聲音不揚者。用甘桔湯加疎散藥。
遺尿謂之腎絕。多難救。然反目遺尿者。為腎絕。若不反目。但遺
尿者。多屬氣重。用參芪等藥補之。則愈。

桂枝湯

葛根湯

小柴胡湯

俱見傷寒

搐鼻散

治一切中症。不省人事。用此吹鼻中。有嚏者。生。無嚏

者難治

細辛

去毒

皂角

去皮。各一兩

柴胡

五錢



為極細末磁餅收貯勿洩氣隔川次一二分入鼻孔中取嚏

牛黃丸 治中風痰火閉結或癩癧難換語言蹇澁恍惚

精神昏憤不省人事或喘嗽痰壅煩心等症

牛黃 六錢

麝香

龍腦 以上三味另研

羚羊角

當歸 酒洗

防風

黃芩

柴胡

白朮

麥冬 去心

白芍 各七錢五分

桔梗

白茯苓

杏仁 去皮尖

川芎

大荳黃卷

阿膠 各八錢五分

蒲黃

人參 去蘆

神麩 各一兩二錢五分

雄黃 另研四錢

甘草 二兩五錢

白歛

肉桂 去皮

乾薑 各三錢七分

犀角 鎊一兩

乾山藥 三兩五錢

大棗 五十枚 蒸爛去皮核



金箔

六仙五十片內
存二百片為衣

為細末、煉蜜同聚膏九每兩作十九、用金箔為衣每服

溫水化下

三化湯

治中風入臟、熱勢極盛、閉結不通、便溺阻隔不行、

風火相搏而為熱風者、本方主之、設內有寒氣、大便反鞭、名

曰陰結、陰結者、得和氣、日暖、寒水自化、不可誤用攻藥、誤即

不能復救、慎之慎之

厚樸

薑汁炒

大黃

酒蒸

枳實

麩炒

羌活

各一錢
五分

水煎服

附子理中湯

見中寒

治寒風中臟、陰冷極盛、脫症隨見、此風



水相遭而為寒風者急服此藥猶可得生去病屬脫症設
用疏通開竅之藥如人既入井而又加之以石也必須
大劑飲之方為合法

三生飲 治寒風中穢六脈沉細痰壅喉響不省人事乃寒
厥逆之候

生南星

生烏頭 去皮

生附子 各一錢

生薑 五片

生木香 五分

水煎服。薛立齋云三生飲乃行經紹治寒痰之良藥斬關

奪旗之神劑每服必用人參兩許駕馭而行庶可驅外邪而

補真氣否則不惟無益適以取敗觀先哲用芪附朮附參附



等湯其義可見

大秦朮湯 治風中經絡口眼歪斜半身不遂或語言蹇澀

血弱不能養於筋宜用養血疏風之劑經云治風先治

行風自滅是也

秦朮 一錢五分

甘草 炙 川芎

當歸 芍藥

生地

熟地 自製 茯苓

羌活 獨活

白朮

防風 白芷

黃芩 酒炒名 八分

細辛

飛煎服如或燥口渴加石膏一錢五分陰雨加生薑三片

春夏加知母八分



竊謂本方初時宜用若日久則以四物四君子為主而以風藥佐之庶收全功。

四物湯 四君子湯

八珍湯 俱見虛症

虎骨膠丸 見宛症

小續命湯 見傷寒發瘧

石味湯 見後類中門

甘桔梗湯 見傷寒咽痛

神仙解語丹

白附子 炮

石菖蒲 去毛

遠志 去心甘草水炮炒

天麻

全蝎 去尾甘草水洗

南星 牛膽製多次更佳各一兩

木香 錢五

右為末麩糊丸龍眼大每服一九薄荷湯下

二陳湯

陳皮

茯苓

半夏 薑汁炒

炙草 各一錢五分



薑一片、大棗二枚、水煎服。

地黄飲子

熟地 九蒸 二錢

巴戟 去心

黃肉 去核

肉蓯蓉 酒浸

石斛

附子 炮

五味 炒

白茯苓 各一錢

石菖蒲 去毛

桂心

麥冬 去心

遠志 去心 甘草 水

入薄荷少許、薑一片、棗二枚、水煎服。口氣虛、加入參二錢。

類中風

類中風者謂火中虛、中濕、中寒、中暑、中氣、中食、中惡中也。共有八種與真中相類而實不同也。然類中有與真中相兼者須細察其形症而辨之。凡真中之症必連經絡多見歪斜偏廢之候。



與類中之專氣致病者自是不同然而風乘火勢邪乘虛入寒
風相搏暑風相炫飲食招風種種變症所在多有務在詳察
細果其為真中也則用前驅風法果其為類中也則照本門施
治果其為真中類中相兼也則以兩門醫法合治之斯無弊耳
茲舉類中諸症詳列於左俾學者觸目洞然也

一曰火中火之自外來者名曰賊實火也火之自內出者名曰
子虛火也中火之症良由將息失宜心火暴盛腎水虛衰不
能制之故猝然昏倒不可作實火論假如怒動肝火道途散
心火鬱結牛黃清心丸肺火壅遏貝母瓜蒌散思慮傷脾加
味歸脾湯腎水枯涸虛火上炎者六味地黃湯若腎經陽虛



火不歸原者。八味地黃湯。劉河間地黃飲子。並主之。此治
中之法也。或問火中而用桂附者何也。答曰。腎陽飛越。
則虛冷。其痰涎上壅者。水不歸原也。面赤煩躁者。火不
也。惟桂附八味能引火歸原。火歸水中則水能生木。木不
風而風自息矣。

二曰虛中。凡人體質虛弱。過於作勞。損傷元氣。以致痰壅氣浮。
猝然昏倒。宜用六君子湯主之。中氣下陷者。補中益氣湯主
之。

三曰濕中。濕中者。既痰中也。凡人嗜食甘肥。或醇酒乳酪。則濕
從內受。或山嵐瘴氣。久雨陰晦。或遠行涉水。坐臥濕地。則濕



從外受風 生痰痰生熱熱生風故猝然昏倒無知也蒼白二

陳湯主之

四曰寒中凡人暴中於寒卒然口鼻氣冷手足厥逆或腹痛下

利清穀或身體強硬口噤不語四肢戰搖此寒邪直中於裏

也宜用薑附湯或附子理中湯加桂主之

五曰暑中凡人務農於赤日行旅於長途暑氣逼迫卒然昏倒

自汗面垢昏不知人急用千金消暑丸灌之其人立甦此藥

有回生之功一切暑藥皆不及此村落中各宜預備瀧醒後

以益元散清之或以四味香薷飲去厚朴加丹參茯苓黃連

治之虛者加人參餘詳論傷暑門



六曰氣中七情氣結或怒動肝氣以致氣逆痰壅牙關緊急
與中風相似但中風身熱中氣身涼中風脈浮中氣脈沉
病有根由必須細究宜用木香調氣散主之

七曰食中醉飽過度或着腦怒以致飲食填塞胃中胃氣不

卒然昏倒宜用橘紅二兩生薑一兩炒鹽一撮煎湯灌而吐

之次用神木散利之其最甚者胸高滿悶閉而不通或牙關

緊急厥暈不醒但心頭溫者卽以獨行九攻之藥既下嚙其

人或吐或瀉自應漸甦若瀉不止者以冷粥湯飲之卽止

八曰惡中登塚入廟冷屋棲遲以致邪氣相侵卒然錯語妄言

或頭面暈暗昏不知人急用薑葱湯灌之次以神木散調之



蘇合丸

加味逍遙散

治肝經鬱火、胃腸脹痛、或作寒熱、甚至肝

風眩暈、振搖、或咬牙發瘧、一目斜視、一手一足瘳、此

氣不和之症、云木鬱達之是已

柴胡

甘草

茯苓

白朮

當歸

白芍

枳殼

黑梔

薄荷

五分

水煎服

牛黃清心丸

見真

地黃飲子

附子理中湯

俱見真中

加味歸脾湯

黃芪

一分

人參

白朮

茯苓



當歸

棗仁炒各一錢

遠志去心

甘草炙各七分

丹皮

黑山梔各八分

元眼肉五枚水煎服

六味地黃湯

滋水制火則無上盛下虛之患

大熟地四錢

山萸肉去核

山藥各二錢

丹皮

茯苓

澤瀉各一錢五分

水煎服。本方加肉桂熟附子各五分名八味地黃湯若為

九十倍其藥煉蜜丸加梧桐子大

六君子湯

理脾祛痰

人參

茯苓

白朮陳土

陳皮去白

