

本草類方卷之二

吞酸嘈雜第十四

食積痰火

瀉肺火胃火白石石膏火煨出火毒半斤爲末醋和丸梧子大每服四五十九白湯下

○丹溪方

食已吞酸

胃氣虛冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑炮等分爲末湯服一錢○聖惠方

醋心吐水

檳榔四兩橘皮一兩爲末每服方寸匕空心生蜜湯調下○梅師方

醋心上攻

如濃酸用茱萸一合水三盞煎七分頓服近有人心如蜚破服此二十年不發也累

用有效○兵部手集

嘈雜吐水

真橘皮去白爲末五更安五分於掌心舐之卽睡三日必效皮不真則不驗○怪證

野蘇水

奇方

野蘇水。治一切瘡毒。不問新久。洗之即愈。此水。乃野蘇根。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。此水。乃野蘇根。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。

食物醋心

胡桃爛嚼以生薑湯下立止。傳信適用方

酒心土文

酒心土文。治一切瘡毒。不問新久。洗之即愈。此水。乃酒心土。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。此水。乃酒心土。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。

酒心土水

酒心土水。治一切瘡毒。不問新久。洗之即愈。此水。乃酒心土。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。此水。乃酒心土。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。

食日吞酒

食日吞酒。治一切瘡毒。不問新久。洗之即愈。此水。乃食日。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。此水。乃食日。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。

食日吞酒

食日吞酒。治一切瘡毒。不問新久。洗之即愈。此水。乃食日。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。此水。乃食日。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。

食日吞酒

食日吞酒。治一切瘡毒。不問新久。洗之即愈。此水。乃食日。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。此水。乃食日。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。

吞

吞

本草綱目

本草綱目。治一切瘡毒。不問新久。洗之即愈。此水。乃本草綱目。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。此水。乃本草綱目。洗淨。切細。入水。煮之。取汁。洗之。即愈。

本草類方卷之二

噎膈第十五

噎

疾

古塚內罐罌中水但得飲之即愈極有神效。壽域方

噎食不納

畢澄茄白豆蔻等分爲末乾舂之。壽域神方

噎膈反胃

鄧才清典用北庭砂二錢水和蕎麥麵包之煨焦待冷取中間濕者焙乾一錢入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七厘燒酒送下日三服愈即止後喫白粥半月仍服助

胃丸藥。孫天仁集效方用北庭砂二兩一兩用人言末一兩同入罐內文武火升

三炷香取出燈盞上末一兩以黃丹末一

兩同入罐內如上法升過取未用桑灰霜

一兩研勻每服三分燒酒下愈即止。又

方平胃散各一錢入礞砂生薑各五分爲

噎食膈氣

末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗按北庭砂即硃砂馬蹄香即沉香四兩為末好酒三升熬膏每服二匙好酒調下日三服。孫氏集效

噎膈拒食

端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜子樣者等分為末無灰酒一盞隔湯頓熱

徐嚥初服二分次日四分三日五分。楊起簡便方

噎食不下

鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒丸綠豆大每服八粒溫酒下不可多用即急性子

也。摘玄方

五噎吐逆

心膈氣滯煩悶不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓溫服。金匱玉函

膈氣噎噎

甘遂麵煨五錢南木香一錢為末壯者一錢弱者五分水酒調下。怪病奇方

噎食不下

赤稻細稍燒灰滾湯一盞隔絹淋汁三次取汁入丁香一枚白豆蔻半枚米一盞煮

粥食神效。
摘玄妙方

噎

食

蕎麥稽燒灰淋汁入鍋內煎取白霜一錢入蓬砂一錢研末每酒服半錢。海上方

膈

氣

生桑寄生搗汁一錢服之。集簡方

噎塞膈氣

威靈仙一把醋蜜各半盃煎五分服之吐出宿痰愈。唐瑤經驗

噎食病

白鷺尾毛燒灰米湯每服一錢

膈氣噎塞

飲食不下用碓嘴上細糠蜜丸彈子大時時含嚥津液。聖惠

梅核膈氣

取半青半黃梅子每個用鹽一兩淹一日夜晒乾又浸又晒至水盡乃止用青錢三個夾二梅麻線縛定通裝磁罐內封埋地下百日取出每用一枚含之嚥汁入喉即

消收一年者治一人二年者治二人其妙絕倫。龔氏經驗方

卒然食噎

橘皮一兩湯浸去瓢焙為末以水一大盞煎半盞熱服。食醫心鏡

膈氣疼痛

白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效。孫氏

食

噎

鷹糞燒灰水服方寸匕。外臺

噎膈吐食

用蛇含蝦蟇泥包煨存性研末每服一錢酒下。壽域方

噎

膈

用蛇含蝦蟇泥包煨存性研末米飲服

噎塞不通

寡婦木梳一枚燒灰煎鎖匙湯調下二錢。生生編

噎塞不通

羚羊角屑為末飲服方寸匕并以角摩噎上。外臺

膈氣吐食

用地牛兒二箇推屎虫一公一母同入罐中待虫食盡牛兒以泥裹煨存性用去泥陳皮二錢以巴豆同炒過去豆將陳皮及虫為末每用一二分吹入咽中吐痰三四

次卽愈。孫氏集效方

膈氣吐食

用大鯽魚去腸留鱗切大蒜片填滿紙包十重泥封晒半乾炭火煨熟取肉和平胃

散末一兩杵九梧子太密收每服三十九米飲下。經驗

噎膈不食

黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之俟其下糞淘洗米令淨煮粥入薤白一握泡熟

去薤入沉香末二錢食之。永類鈴方

反胃噎膈

大力奪命丸牛嘔草杵頭糠各半斤糯米一升爲末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟

食之入沙糖二兩尤妙。醫學正傳

老人噎食

不通黃鸝雞肉四兩切茯苓二兩白麵六兩作餛飩入豉汁煮食三五服效。養老

書

噎食病

數月不愈者用狗寶爲末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水一鍾攪勻

去滓調服日二不過三日愈後服補劑。杏林摘要

氣噎不通

雞嗉兩枚連食以濕紙包黃泥固煨存性爲末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和

丸梧子大每服下三丸

噎食不下

人尿入蘿蔔內火煉三炷香取研每服三分黃酒下三服效。海上名方

噎食不下

用生人膽一箇盛糯米令滿入麝香少許突上陰乾一半青者治瘡一半黑者治噎

並爲末每服十五粒瘡用陳皮湯下噎用通草湯下。俱出普濟方

噎膈反胃

諸藥不效真阿魏一錢野外乾人尿三錢爲末五更以薑片蘸食能起死人乃趙王

困方也。永類鈴方

膈氣不食

天靈蓋七箇每箇用黑豆四十九粒層層隔封水火升降楊梅色冷定取出去豆不

用研末每服一錢溫酒下。孫氏集效方

噎食反胃

秋石每用一錢白湯下。醫方摘要

噎

食

取鵬鳥未生毛者一對用黃泥固濟煨存性爲末每服一匙以溫酒服。壽域神方

一

後服到朝。春秋摘要。

下

五分

食料爲末
煎黑末生手齊一
倍限黃散固衛歟

豆食又胃平水。醫方前

未食服

上箇蒜頭黑豆四十斤

本草類方卷之二

反胃第十六

翻胃吐食

男婦皆治白善土煨赤以米醋一升淬之再煨再淬醋乾為度取一兩研乾薑二錢

半炮為末每服一錢調下服至一斤以止為妙○千金翼

反胃吐食

或狷皮燒灰酒服或煮汁或五味淹炙食○普濟

反胃轉食

地龍糞一兩木香三錢大黃七錢為末每服五錢無根水調服忌煎燂酒醋椒薑熱

物一二服其效如神○邵真人經驗方

反胃吐食

竈中土年久者為末米飲服三錢經驗○百一選方

翻胃吐食

梁上塵黑驢尿調服之○集簡方

然糯米少煮汁共小豆

反胃噦逆

黑鉛化汁以柳木槌研成粉一兩入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許搗丸小豆

大每服一丸薑

湯下。聖劑

多年反胃

不止紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽鹵汁五兩燒鉛以鹵汁淬盡與亭脂同炒焰起挑

于水上焰止研勻蒸餅和丸梧子大每服二十丸煎石蓮乾柿湯下。聖濟方

反胃氣逆

胃虛鉛丹二兩白礬二兩生石亭脂半兩以丹礬研勻入坩鍋內以炭半稱煨赤更

養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和丸綠豆大每日米飲下十五丸。聖濟錄

脾疼反胃

靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各四十九粒爲末自然薑汁煮半夏粉糊丸

梧子大每薑湯下

二十丸。普濟方

反胃吐食

雌黃一分甘草生半分爲末飯丸梧子大以五葉草糯米煎湯每服四丸。聖濟錄

反胃吐食

絕好赤石脂爲末蜜丸梧子大每空心薑湯下一二十丸先以巴豆仁一枚勿令破

以津吞之後乃

服藥○聖惠方

反胃嘔吐

白礬硫黃各二兩銚內燒過入硃砂一分爲末麪糊丸小豆大每薑湯下十五丸○

又方白礬枯三兩蒸餅丸梧子大每空心米飲服十五丸○普濟方

反胃上氣

食入卽吐茅根蘆根各二兩水四升煮二升頓服得下良○聖濟總錄

反胃惡心

藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分爲末每服一錢沸湯點服○聖濟總錄

脾虛反胃

白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁和丸梧子

大每服百丸薑湯下名太倉丸○濟生方

反胃嘔吐

飲食入口卽吐困弱無力垂死者上黨人參三大兩拍破水一大升煮取四合熱服

日再兼以人參汁入粟米雞子白薤白煮
粥與噉李直方司勳於漢南患此兩月餘
諸方不瘥遂與此方當時便定後十餘日
遂入京師絳每與名醫論此藥難可為儔

也○李絳
兵部手集

血風反胃

香白芷一兩切片瓦炒黃為末用猪血七
片沸湯泡七次蘸末食之日一次○婦人

良方

翻胃吐食

白麵二斤半蒸作大饅頭一個頭上開口
剗空將皂礬填滿以新瓦圍住鹽泥封固

窰土窰安放文武火燒一日夜取出研末
棗肉為丸梧子大每服二十丸空心酒湯

任下忌酒色

○醫方摘要

反胃上氣

蘆根茅根各二兩水四升
煮二升分服○千金方

反胃吐食

火欬草焙為末蜜丸梧子大每沸湯下五十丸。百一選方

反胃吐食

芥子末酒服方寸匕日三服。千金方

久冷反胃

經驗方用大附子一個生薑一兩剉細同煮研如麪糊每米飲化服一錢。衛生家

寶方用薑汁打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十丸。斗門方用長大附子

一個坐于磚上四面着火漸逼以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半盃

乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘥或以猪腰子切片炙熟蘸食。方便集

用大附子一個切下頭子剉一竅安丁香四十九個在內仍合定線紮入砂銚內以

薑汁浸過文火熬乾為末每挑少許置掌心舐喫日十數次忌毒物生冷

反胃吐食

馬電兒燈上燒存性一錢入好棗肉平胃散末二錢酒服食即可下即野甜瓜北方

多有之。

丹溪纂要

虛寒反胃

神麴六兩麥蘖炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉焙四兩爲末蜜丸梧子大每服五十丸米飲下日三服

和劑局方

反胃欬噫

生薑四兩擣爛入蘭香葉一兩椒末一錢鹽和麵四兩裹作燒餅煨熟空心喫不過兩三度效反胃入甘蔗汁和之。普濟方

反胃膈氣

不下食者太倉散用倉米或白米日西時以水微拌濕自想日氣如在米中次日晒乾袋盛掛風處每以一撮水煎和汁飲之卽時便下。又方陳倉米炊飯焙研每五兩入沉香末半兩和勻每米飲服二三錢。普濟方

反胃吐食

脾胃氣弱食不消化湯飲不下用粟米半升杵粉水丸梧子大七枚煮熟入少鹽空

心和汁吞下或云納醋中吞之得下便已。心鏡

反胃羸弱

兵部手集用母薑二斤搗汁作粥食。傳信適用方用生薑切片麻油煎過為末軟

柿蘸末嚼嚥

反胃吐食

罌粟粥用白罌粟米二合人參末三大錢生山芋五寸細切研三物以水二升三合煮取以合入生薑汁為鹽花少許和勻分服不計早晚亦不妨別服湯丸。圖經

反胃吐痰

柳樹葦五七箇煎湯服即愈。活人心統

反胃噎疾

蘿蔔蜜煎浸細細嚼嚥良。普濟方

反胃上氣

白芥子末酒服一二錢。普濟方

反胃吐食

乾柿三枚連蒂搗爛酒服甚效切勿以他藥雜之

本草類方

反胃