

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室



臨證指南醫案卷九

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲

姪旦玉堂

調經

血滯 愁鬱氣

張九經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脉絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

川芎

當歸

肉桂

生艾

小茴



後期
鬱傷八
嗽肺氣
虛

茯苓 生香附 南山查 益母膏丸

姚二久嗽背寒晨汗右卧咳甚經事日遲脉如數而虛

減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草

南棗 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脉數虛火也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之餒已甚可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣

肝犯胃

而桂枝白芍非飲陰和血之妙品乎

秦

一氣衝心痛嘔涎氣墜少腹為瀉經來後期具

或紫病在衝脉從厥陰陽明兩海

川連

小茴

川棟

歸尾

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

肝傷脾

華

二鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血况春深泄氣之候必

佐益氣之屬方為合法 歸脾湯

又 向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少



腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此爲
肝木拂逆甚則爲厥夫肝臟相火內寄病來迅速
極之徵爲肝用太過宜制其用前此莖朮守補
矣安胃理中丸去黃柏細辛

錢 脉濡腕悶減食經水來遲腹痛墜

柴胡

炒白芍

黃芩

鬱金

香附

茯苓

蘇梗

神麴

又 諸恙未減腹但痛不墜 逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許 八經閉寒熱便澹腹痛

加味道遙散去山梔



血絡鬱
熱腹痛

某 血虛內熱經不至 加味逍遙散去木

某 經遲腹痛風疹絡血不寧久鬱成熱法當通利

涼膈去芒硝加丹皮赤芍

奇脉虛
寒滯

孫二 奇脉下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商入脉

法 歸建中湯

又 久嗽遇勞寒熱 歸芪建中去薑

謝三 能食不運寢泄經事愆期少腹中乾涸而痛下焦麻

痺衝心嘔逆腹鳴心辣八脉奇經交病

人參

茯苓

艾葉

製香附

淡薤蓉

淡骨脂

肉桂

當歸



鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

王三脉右緩左瀉。經水色淡後期。嘔吐痰水食物。累月

載餘不孕。此久鬱凝痰滯氣。務宜宣通。從陽明經。

方

半夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山查肉

薑汁法丸

又

三月中。用辛溫宣鬱方。痰瘀自下。胸次寬。嘔逆緩。今

喜暖食惡寒。經遲至五十餘日。來必色淡且少。議用溫

養衝任栽培生氣方法

八珍去木草地加小茴肉桂

斷艾香附紫石英河車膠丸



肝腎虛寒

朱六經水一月兩至或幾月不來五年來並不孕育下

肢體常冷是衝任脉損無有貯蓄煖益腎肝主之

人參

河車膠

熟地

砂仁製

歸身

白朮

川芎

香附

茯神

肉桂

艾炭

小茴

紫石英

益母膏丸

衝脉肝

程七十三年不孕育其中幻病非一病人述經期遲至來

期預先三日周身筋骨脉絡牽掣痠楚不得舒展凡女

人月水諸絡之血必彙集血海而下血海者即衝脉也

男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脉病也腹為陰陰

虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛



損惑見病治病之悞。有終身不育淹淹之累。肝血陰虛。木火內寄。古人溫養下焦。必佐涼肝堅陰。勿執經後期。為氣滯亂投破氣剛藥劫陰。

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

肝腎奇
脉陰虛

朱

經云。陽維為病。苦寒熱。緣上年冰雪甚少。冬失其藏。

春牛潮濕。地氣升泄。以肝腎血液久虧之。腎春生力淺。

八脉隸乎肝腎。一身網維。八脉乏束固之。司陰弱內熱。

陽微外寒矣。督脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。

情景已露。局方逍遙散。固女科聖藥。大意重在肝脾二。

經因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。使氣血
微升。以引少陽生氣上中。三焦之鬱。勃可使條暢。入
暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不暢。不
束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當示
仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

炙甘草

阿膠

細生地

生白芍

麥冬

牡蠣

其

陰虧內熱經事愆期

雄烏骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

芩蔚子

女貞子

桂圓

陰虛



痛經
鬱傷氣
血滯

右十味用青蒿汁童便醇酒熬膏加密丸

張四
三寒熱間日經來腹痛。

小生地

丹皮

知母

花粉

生鱉甲

澤蘭

某十二
先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病。

與下焦瘕泄則異。

川芎

當歸

香附

煨廣木香

查肉

茯苓

某六
寒熱無汗經先腹痛腹中燥癢咳逆食物不思此鬱

傷氣血八脉主病姑先與澤蘭湯



南京中醫藥大學圖書館藏

歸身

澤蘭

丹參

白芍

柏子仁

茯神

周七十室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之

爲重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴怒瀉

結究脉察色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而

奇經衝任躋維諸脉皆肝胃屬隸脉不循序流行氣血

日加阻痺失治必結瘕聚痞痞之累

南山查

生香附

延胡

常歸

青皮

三稜

蓬朮

牛膝

川棟子

澤蘭

肉桂

炒小茴

葱白汁丸



顧經來筋掣腹痛。常有心痛乾嘔。此肝氣厥逆。衝任

病。務在宣通氣血。以調經溫燥。忌用自可得效。

川棟 一錢

丹皮 三錢

炒查 二錢

胡連

延胡 一錢

澤蘭 二錢

歸鬚 二錢

生白芍

又 柏子仁丸

吳 鬱傷絡脉。痛經。

川芎

當歸

香附

小茴

烏藥

茯苓

紅棗

費

經水紫黑。來時嘈雜。脉絡收引而痛。經過甚下。不斷

形瘦日減。脉來右大左弱。上部火升。下焦冷徹。骨中陰

陽華遠焉得孕育問醫都以補血清劑且平鮮效謹

鮑魚

生地

煖荜蓉

天冬

當歸

柏子仁

炒山查

牛膝

茯苓

紅棗蘄艾湯法丸

氣分熱

未

脉數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有

熱

細子芩

白芍

黑山梔

鈎藤

茯苓

當歸鬚

香附

羌蔚子

桑枝

食酸氣
血滯

李

酸滯入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹昔經行三



經閉
木火
熱

日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經讀

以辛勝酸主治但辛氣最易入表當求其宣絡者

芫白汁

桃仁

延胡

當歸鬚

川棟上

土三

苦辛泄降胸膈張悶已舒此嗽血皆肝胆氣火上逆

必經來可安

南山查

桃仁

黑山梔

丹皮

橘葉

降香末

老芫白汁

朱

當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月

事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔

胃陽虛



臍滯常停以理胃陽為務

人參

半夏麴

廣皮白

茯苓

生益智仁

煨薑

脾胃陽虛

某

脉數形疲咳經閉半年已經食減便澀浮腫無他

通經之理扶持中土望其加穀 四君子湯

脾胃不運

某

三經閉兩月晚痺嘔惡此氣壅不宣胃陽得鈍使然當

用和中為主

半夏麴

老蘇梗

茯苓

廣皮

枳殼

川斛

濕滯腹痛瀉

某

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣



血不和兼有時令濕邪

茯苓皮 三錢

大腹皮 一錢

半

生益智 一錢

錢

厚朴

蓬莪木 五分

青皮子 五分

炒研

又服五劑後氣已畧平

葱白九

用生蘆艾 三分

紅棗 十五枚

煎清湯送

某

脉數經閉腹脹足腫

茯苓皮

大腹皮

青皮

小杏附

延胡

炒山查

羌蔚子

炒砂仁

顛

經停四月。腹滿尻髀足肢盡腫。食納脹悶。不化大便。

溇瀉不實。女科認為胎氣。恐未必然。方書謂先經斷而



南京中醫藥大學圖書館藏