

東坡西寶鑑  
四

東醫寶鑑內景篇卷之四

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

小便

小便原委

靈樞曰水穀者常並居胃中成糟粕而俱下焦滲而俱下

焦而滲入膀胱之中脬氣化之而為尿以泄出也

難經註曰水穀自膀胱上口而為洩便詳此三說則

小便即泌尿別之水液滲入膀胱以出者內經曰

飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於

肺通調水道下輸膀胱則小便又似水飲精微之

本體固不能上升則豈可謂小便獨為氣化所成

者我內經曰膀胱者津液藏焉氣化則水滯

或運者化蓋謂小便不通此理故也

### 膀為尿管

膀居膀胱之中焉故內經曰膀移熱於膀

膀胱靈樞曰膀居於膀胱也膀胱以濡類纂曰膀胱者膀之

既盛於膀外積於膀下必因乎氣化而後能漸漬浸

也若曰膀下無空處則人尿不急時至膀胱安能即出

乎夫惟積滿膀下之空處而不可再容故急急則出

### 辨尿色

水液渾濁皆屬於熱小便黃者小腹痛中有熱

盛則尿色黃濁○痘證小便如黃柏汁○小便

有五色惟赤白者多赤色多因酒得之白色乃

### 脉法

少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋○腎脉

滑實為瘰癧○遺精白濁當驗於尺結菀動緊

二證之辨  
膀胱之辨  
兩尺脈  
則數必便赤黃實脈  
瘧閉熱

在膀胱之辨  
○兩尺脈  
則數必便赤黃實脈  
瘧閉熱

治大而實者生  
○脈細數何妨  
少陰微者瘧病  
閉  
○細不

小便難外候  
其候其鼻頭黃色黃者  
○小便必難辨  
○候

小便不利  
陰虛則小便難辨  
○小便必難辨  
○候

陰降火四物湯  
○黃芩四物湯  
○知母黃柏  
○牛膝下焦無血

熱而小便難辨  
○惟陰分虛而陽熱乘之  
若小便則黃赤

則萬全木通散  
○利之  
○少者一也  
宜利而己  
若熱

若大便泄瀉  
○而津液少者  
一也  
宜利而己  
若熱

氣滯下焦  
○津液不能行  
者二也  
必滲瀉者  
三也  
可順

便赤澁  
○或化而欲成淋  
宜茯苓清心蓮子  
○飲瀦  
○觀導赤散  
○魁

五臟。如欲參之。○腎虛小便數而瀝。

萬全木通散。治赤茯苓車前子。炒瞿麥各一錢。右為末。水煎服。或取末。

末水煎服。或取末。三錢水調服。

茯苓琥珀散。治小便澀數。宜滲泄。世分利之。澤瀉一兩。滑石七錢。赤茯苓白朮琥珀。猪苓各五錢。

羹肉桂甘草。灸各三錢。右為末。每三錢。以長流甘爛水一盞。調下。以羨饑壓之。以

平補元。治小便製山茱萸酒浸。焙常歸。益智仁各五錢。川鑲肉。牛膝。胡蘆巴。炒杜仲。薑汁炒巴戟。肉蓯蓉。

酒浸各三錢。或半乳香二錢。右為末。糯米糊和丸。梧子大棗湯。或薑湯下。五十九。

一方。連翹。甘草。蓄熱。小便赤澀。梔子。仁。大黃。畏。

一方。連翹。甘草。蓄熱。小便赤澀。梔子。仁。大黃。畏。

小便不通。胞移熱於膀胱。則癃。尿血。○。○。足厥陰之脈。

過陰器所生病遺尿閉癰腎冰者女子入繫挺孔

其孔尿之端也其生病癰瘳痔遺尿足三焦者六

陽之別也入絡膀胱約下焦實則癰閉虛則遺尿

殊蓋閉者暴病為尿點滴不出俗呼一小便不通是

也癰者久病為尿澀淋瀝點滴而出一日數十次

或百次名為淋病是也脚熱在下焦填塞不便

其證小便閉塞亦不渴時見躁者是也說小便

不通有氣血之異如渴而小便不通者熱在上焦

氣分宜清肺散如不渴而小便不通者熱在下焦

血分宜滋腎丸二如氣不能化而通則陳皮茯苓湯調木香沉香末二錢空心服蒸用吐法以提

之如血汚於下而不通則用挑仁承氣湯之類提  
噴以破之絕無其熱微者小便難而僅有熱盛者  
小便閉而血澀致氣不通而竅澀宜導氣除燥湯  
便不通乃血澀致氣不通而竅澀宜導氣除燥湯  
宣氣散通開九猪苓湯  
加味五苓散透泉散

八正散 治胸膈熱積小便癃閉不通 大黃木通瞿麥

一貼入燈心一錢 空心水煎服

清肺散 治渴而小便閉猪苓通草各一錢半赤茯苓

七分琥珀五分右剉作一貼空心水煎服

滋腎丸 治肉桂半錢右為末水丸梧子大空心白湯

下百丸煉一各泄腎丸○一人病小便不通腹脹脚腫雙睛凸出晝夜不眠苦痛不可言且苦嘔噦

衆醫無效東垣曰膀胱者津液之府氣化則能出矣小便癃閉是無陰而陽氣不化者也此人奉養

不厚膏粱積熱故膀胱者腎之府久而乾涸小便

其疾自愈遂處此方服之 須更尿出如涌泉即差

導氣除燥湯 治小便不通赤茯苓一錢半只栝一錢

貼入燈心一錢  
空心水煎

### 導赤元

治膀胱有熱小便不通大黃一兩半炒  
赤芍藥赤

茯苓滑石各四錢右為末蜜九梧子大  
導赤散 煎水空心吞下三五十九丸  
以

### 地膚子湯

治下焦熱結小便不通地膚子一錢知母  
黃芩猪苓瞿麥枳實升麻通草冬葵子海

藻各七分右剉作一貼空心水煎服  
後小便不通脈沉細用猪腎半隻同煎  
服最效

### 宣氣散

治癰閉急痛甘草梢木通各三錢  
葵子滑石各一錢右末二錢燈心湯調下  
二錢

### 通關丸

治小便不通黃栢三錢知母並酒炒  
木通一兩肉桂三錢右為末水丸梧子各  
大二兩

心白湯下  
百九

### 猪苓湯

治熱結小便不通猪苓木通澤瀉滑石  
黃栢酒浸牛膝麥門冬瞿麥篇蓄車前子  
各

七分甘草一錢空心水煎服  
七分心一錢空心水煎服

加味五苓散 治虛寒小便不通五苓散料等分加當歸枳殼牛膝木通甘草梢亦等分右剉

入燈心一撮空 心同煎服

透泉散 治小便赤澀不通滑石一兩芒硝甘草各五錢琥珀二錢半右細末每二錢空心以燈心煎

煎湯調 下

老虛人癃閉 年老人小便不通多是氣短血虛 湯加黃芪煎水吞下滋腎丸 煎湯調

老人氣虛小便不通四物湯加黃芪末以人參赤 腎丸煎湯調

茯苓煎湯調 空 心服

癃閉宜吐 小便不通屬氣虛血虛有實熱有痰閉 皆宜吐之以提其氣升則水自降蓋

氣承載其水也氣虛用參朮升麻血虛用四物痰 多二陳皆先服後探吐之實熱當引之入正

坊見○一人病小便不通藥無效丹溪曰此積 痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦

閉則下焦塞比如滴水之器必上竅通而後下竅

之水出焉乃以二陳湯先飲大吐之病如失瀨煎之多阻滯水道不通二陳湯加香附木香木通

煎之先服一盞以餘渣探喉中吐之以提其氣氣

升則水自降一實熱不通砂糖水調黑牽牛末一二錢服探吐之

癰閉宜瀉通實熱癰閉用水道不行其本在腎動則小便自

澤瀉其末在肺合用葶藶桑皮更以木通滑石佐之又能透達雖然大便小便更絡相貫入有多日

小便不通但用神保元藟水丸三花神祐丸自通灌○實熱尿管閉宜用導水丸三花神祐丸

轉脬證脬急疾走或飽食忍尿或飽食走馬或忍尿入房使水氣上逆氣迫於脬故屈戾而不得舒張也

脬落即殂灌○轉脬證候孕婦多有之患在忍縮也小便或醉飽入房使小腸之氣逆而不得出膀胱之

氣與之俱滯外水不得入膀胱內水不得出膀胱之似淋瀝急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急頻併

似痢非痢必以手按臍下庶可立出小便甚者因

此大腹脹迨其腫治法用京藥疎利小腸中熱仍與通

正小便者自然順流者食味厚者大率有病稟受弱者

憂問多者性急躁者食味厚者大率有病稟受弱者

疏水道自行一婦患此診之兩手似瀉重取則弦

此得之憂患瀉為血少氣多弦為有飲遂以四物

湯加參朮半夏陳皮甘草生薑空心煎服隨以指

探喉中吐出血汁少頃又與一貼次早亦然如

是與八貼而安此法恐偶中後歷用數人皆驗

○轉脬宜二石散加木通車前子等分煎服仍施

陰陽法因篤欲死六味地黃丸倍澤瀉服之效

老婦人脬轉因篤欲死六味地黃丸倍澤瀉服之效

二石散治脬轉八九日不得尿滑石寒水石葵子

蒲黃散治脬轉不得尿蒲黃滑石各等分

滑石散 治 臍轉不得一尿寒水石二兩滑石亂髮灰車  
前子木通各一兩葵子一合右剉水一斗煮

取五升每服一升  
日三次即通效

葱白湯 治 小便秘卒暴不通小腹膨脹氣上衝心悶絕  
欲死此因驚憂暴怒氣乘膀胱鬱閉而臍系

不正陳皮三兩葵子一兩葱白三莖  
右剉水五升煮取二分三服

參朮飲 治 孕婦轉臍小便不通四物湯料加人參白  
朮半夏陳皮甘草冬一錢右剉入生

薑三片大棗二枚水煎空  
一方葵子梳子炒滑石各五錢木通三錢右剉作

一貼水煎空心服外以葵子臍中  
曰螺肉擣膏或生葱汁調貼臍中  
通石為細末入

婦九月轉臍尿管閉脚腫形瘁脉左稍和而右溢此  
必飽食氣傷胎系弱不能自舉而下壓膀胱故閉

而四不通以人參白朮當歸芍藥陳皮半夏甘草煎  
服四貼次早煎查頓服探吐小便大通皆黑水

○一孕婦轉臍脉細氣弱胎壓膈下口用補藥  
恐加急滿令產婆以香油抹手入產門托起其胎

胎尿自出如墜轉其尿注又法將孕婦倒豎起

關格證

邪在六府則陽盛矣邪在五臟則陰盛矣

不和則血留之血留則陰盛矣陰氣太盛則

營故曰關陰陽俱盛不得相營故曰關格則

逆關者甚熱之氣格者甚寒之氣無出塞不開

曰格寒在胃中遇絕不入熱在下焦填塞不便

格熱在丹田小便不通故曰關格○水漿不下故曰

便格者吐逆上下一俱病也○內經曰迎四倍名曰

關○兩寸俱盛曰關格其證嘔逆而小便秘不通者

大小便不通亦謂之陰陽關格乃三焦約者不行之病也

欲升煎不升正散服之願○關格者謂膈中覺有所碍

益氣湯關格宜芒硝湯大承氣湯 關格者積縮二陳湯

芒硝湯治關格不通芒硝二兩半滑石三兩冬葵子

至半入芒硝一錢再一沸空心服

枳縮二陳湯治關格上下不通此痰隔中焦也服此

貝母陳皮蘇子瓜蒌仁厚朴便香附子各七分香沉香各五分甘草三分右除二香剉作一貼薑

三片同煎入竹瀝及沉香木香濃磨水調和服之

關格宜吐瀉關格必有用吐以提其氣之橫格不必在

中氣虛而不運者補中益氣湯加大木香檳榔以升

降之明關格死在朝夕但治下焦可愈宜大承

氣行方見關門一婦人忽吐逆大小便不通煩

亂四肢漸冷無脉與大承氣湯一劑至夜半漸得

大便通脉漸和翌日乃安此關格之病極為難治

垂死而活。只此一兒小耳。洩不通。關格忌用。淡滲利小。

便之藥。砂石大便。秘肛門脫。出一二寸。戴人曰。此下焦塞。

也。不利吐。不調胃承氣湯。一兩加牽牛子。頭末三錢。河。

水煎服。又用萊菔末糊丸。芥子許六十丸。吞下。上。

吐下瀉。一時齊出。有膿。一盞其病。如失。令飲。

新水。二三。十次。每次飲。一盞。其病。如失。令飲。

洗熨法。通陰。先熨法。又名冷熱熨法。治後以熱物熨。如前。

數。又以冷物熨之。自通。呷湯。密室內熏。洗小腹。外。

薑葱白紫蘇葉各一握。煎湯。密室內熏。洗小腹。外。

腎肛門等處。再溫再洗。拭乾。於綿被仰坐。垂脚。自。

舒其氣。次用赤茯苓赤芍藥白芍藥各五錢。蜀葵。

子二錢。半右。剉一兩。煎水。調蘓合香元氣。三九。

并青鹽末。半錢。空心溫服。即效。辨。○香元氣。三九。

脹不急。治殺人葱白。三斤。細剉。炒熱。以帕子包。分。

兩裹。更替熨臍下。即通。○細剉。炒熱。以帕子包。分。

臍下亦通。○細剉。炒熱。以帕子包。分。

省此由產時。尿。臍。運。動。不。便。不。順。用。鹽。填。臍。中。葱。白。十。

餘根細切厚鋪鹽上用大艾炷灸之  
覺熱氣直入於腹內即通神驗效

### 掩臍法

調轉臍一證諸藥不效失救則死以及甘遂末水  
敷臍下內以甘草節煎湯飲之此救急之處

良方也但二反臍自轉矣小水來如泉涌不可一處  
臍二藥相反臍自轉矣小水來如泉涌不可一處

同買為妙。小便不通麝香半夏末填臍中上葱  
通。治小。便。不。通。麝。香。半。夏。末。填。臍。中。上。葱。

白田螺二味擣成餅封臍上用布線縛定下用皂  
角。田。螺。二。味。擣。成。餅。封。臍。上。用。布。線。縛。定。下。用。皂。

紙七重密封瓶口於患人臍內用鹽一捻填之有  
○置瓶口覆在臍上偃卧如覺冷小便即通散

○治小便秘閉不通宜貼臍膏方便通散

### 通關散

以治小便秘不通白礬生白鹽各二錢半右研  
紙。圈。圍。臍。抄。藥。在。內。滴。冷。水。藥。上。半。右。研。

### 難治不治證

便不通為下焦血氣乾者死。難治人中氣虛短病小  
尿。頭。無。汗。者。可。治。有。汗。者。死。難。治。中。氣。虛。短。病。小。

尿頭無汗者可治有汗者死。難治人中氣虛短病小

小便不通此為陽脫不治得言凡關格見頭汗者

小便不禁

遺尿者尿出不止者覺也膀胱不藏也註曰

水泉者前陰之流注也納者腎與膀胱俱虛因氣

遺盛不愈多指下焦蓄血與虛勞內損則便尿自

欲出而不知禁髓之肺氣虛則尿色變卒遺失無度

水自謂膀胱下相為貫通也景曰下焦竭則遺尿失

便其氣虛不能自禁制也又云下焦不歸則遺失者

肺氣虛也宜安胃養氣禁勞役以參芪補之不愈

為熱色白為虛也黃丸虧去澤瀉加益智仁

睨寒虛者五苓散合四物湯加山茱萸五味