

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十九卷目錄

墜墮金瘡等四十七問

從高墮下方三首

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

墜損方三首

墜落車馬方六首

折骨方三首

傷筋方三首

筋骨俱傷方七首

折腕方一首

折腕瘀血方四首

蹉跌方三首

被打有瘀血方一十三首

被打損青腫方七首

許仁則療吐血及墮損方三首

金瘡禁忌序一首

金瘡預備膏散方三首

金瘡方一十一首

金瘡續筋骨方三首

金瘡止痛方五首

金瘡生肌方四首

金瘡去血多虛竭內補方二首

金瘡中風方八首

諸瘡中風寒水露方五首

被刀箭傷方一十一首

竹木刺不出方一十六首

狐尿刺方二首

狐刺方五首

惡刺方三首

灸瘡方四首

灸瘡膿不差方三首

火燒瘡及火油天火瘡方三首

火灼爛壞方五首

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

湯火瘡無問大小方四首

湯火爛瘡方五首

湯煎膏火所燒方四首

漆瘡方二十七首

侵淫瘡方七首

月蝕瘡方一十二首

代指方一十一首

甲症方五首

肉刺方二首

手足皸裂方五首

手足逆臚及疥癩方二首

疣目方一十九首

去黑子方二首

疣贅疵黑子雜療方六首

滅癰痕方一十七首

唐王燾先生外臺秘要方第二十九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

從高墮下方三首

千金療丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷絕崩中皆主之方

阿膠

乾薑

艾葉

芍藥

唐德按
千金經
艾二兩

右四味切以水八升煮取三升去滓入膠令消分二服
羸人三服女人產後崩中傷下血過多虛喘腹中絞痛

下血不止服之悉愈

又療從高墮下瀉血及女人崩中方

當歸 二分 大黃 一分

右二味搗為散酒服方寸七日三

范汪同並出第二十卷中

千金翼膠艾湯主男子傷絕或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡經內絕者方

阿膠 炙

艾葉

芍藥

乾地黄

各三兩

乾薑

當歸

甘草 炙

芎藭

各二兩

右八味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服

羸人三服此湯正主婦人產後崩中傷下血多虛喘欲

尚德按 千金大 黃二分

尚德按 千金阿 膠艾葉 各二兩 乾薑一

死腹痛血不止者服之良

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

廣濟療從高墮下內損瘀血消血散方

蒲黃 十分

當歸

乾薑

桂心 各八分

大黃 十二分

蜚蠊

四分去足超熬

右六味搗為散空腹以酒服方寸匕日再漸漸加至一

匕半忌生葱猪犬肉

出第四卷中

肘後療卒從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死方

取胡粉一錢匕以水服之 備急文仲同

又方

煮大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之彌佳

千金備急

文仲同一云大豆二升煮令熟取汁二升去豆以醇酒六七升和飲之一日飲盡小豆亦佳

又方

生乾地黃二兩熬末以酒服之

又方

生地黃搗取汁服一升或二升尤佳

又方

烏鷄翅羽二七枚燒末酒和服之卽當吐血也如得

左羽尤佳

又療從高墮下若爲重物所頓竿得瘀血方

豆豉三升沸湯二升漬之食頃絞去滓內蒲黃三合攪調頓服之不過三四服神良

刪繁小品文仲儻急集驗千金同

又方

烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消

文仲儻急

千金同

又方

取茅連根葉擣絞取汁一二升服之不過三四服愈

冬用根

又方

刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三七日四五服良

又方

末鹿角酒服三方寸匕日三千金同

又方

取敗蒲薦燒灰以酒服方寸匕並出第三卷中

深師療從高墮下傷內血在腹聚不出療下血方

取好大黃二兩 桃人三十枚

右二味擣以水五升煮取三升分爲三服去血後作地黃酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下之虛極殺人也

又療墮落瘀血桃枝湯方

桃枝一握中 芒硝五分 大黃四兩 當歸

甘草炙 桂心各二兩 蜚蠊二十枚去翅足熬

水蛭二十枚熬 桃人五十枚去尖皮熬

右九味咬咀以水八升煮取三升去滓溫分三服內消

又瘰癧落積癰血消血理中膏方

大黃二兩 猪脂二斤 桂心一兩 乾薑一兩

通草 亂髮各一兩

以膏煎髮令消盡擣藥下篩須令絕細下膏

諸藥與之微火煎之三上三下即藥成去滓以

並出第二十六卷

二十九卷

近効土質汗療折傷內損有瘀血每天陰則疼痛兼

婦產後諸疾神効方

開寶本草云質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋消惡血下血婦人產後諸

血並酒消服之亦敷病處出西蕃如凝血蓄人煎甘草松淚糲乳地黃並熱血成之今以益母成煎故謂之土質汗也

三月採益母草一重擔

一名夏枯草

右一味揀擇去諸雜草及乾葉以新水淨洗於箔上攤

曬令水盡則用手捩斷可長五寸勿用刀切卽置鑊中

量水兩石令水高草三二寸則縱火煎候益母草糜爛

水三分減二漉去草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日

以綿濾取清汁盆中滓澱並盡弃之其清汁於小釜中

慢火煎取一斗如稀餳每取梨許大煖酒和服之日再

也
目列

服和羹粥喫並得如遠行不能將稀煎去卽更鍊令稠
硬停作小丸服之七日內則疼痛漸瘳二七日平復
有產婦惡露不盡及血運一兩服卽差其寒熱風濕
心力無所忌

鄭長史處史部李師自服之得力

墜損方三首

廣濟療墜損骨肉苦疼痛不可忍方

故馬璫兩段其璫欲得故璫者於鎔中以酒五六升
著一抄鹽煮令熱卽內璫於鎔中看璫熱便用裹所
損處冷卽易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定卽
止仍服止痛藥散卽漸差

又療男子虛勞墜傷內損吐血不止欲死面目黑如漆者

悉主之方

黃耆

芩藳

當歸

芍藥各三兩

甘草

炙三兩

生薑

八兩

右六味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服服

別相去六七里

並出第四卷中

近効療墜損方

生地黄一斤分爲三分

右每服取一分熬令焦黃以酒半升煎一兩沸絞去滓令溫煖得所食前日三無所忌馬墜亦療之