

百
代
医
宗

五



萬國太醫院頒行内外諸科方論百代醫宗卷之五

金谿 省吾 徐紳 菁述

太醫院醫官 繡谷 振吾 張文英 參訂

金陵 少泉 李潮 刻行

剛柔二症論

夫瘡有陰陽二症有汗曰柔瘡無汗曰剛瘡又曰剛爲陽瘡柔爲陰瘡按大抵剛柔二症先傷風又感寒濕致之正所謂虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出或由咽逆汗之必發瘡病濕家發汗稍表亦作瘡病婦人新產血虛汗出傷風發瘡無疑矣項背強直身反張頭掣縫喋口不語發熱腹痛鎮日不醒其狀可畏病在足太陽經其或牙緊手撒痰涎壅盛昏濶煩渴小便赤澀先議語而發者此剛瘡也其或便滑洩不渴不語先手足冷而發者此柔瘡也剛瘡爲之發汗柔瘡爲解肌並以小續命湯剛瘡去附子用麻黃柔瘡用附子去麻黃大銀

利而厥逆者用熟附子佐之其間身體壯強語口乾手足反微寒未便反滑洩此爲剛柔不分之症可用生附子小續命主之剛症用黃芩

根湯柔症桂枝葛根湯善治症者不可專作風治而用風藥反燥其血而致不救矣大抵與癇病相似而尤甚多是氣虛有火兼痰宜用人身竹體之類所以症發通身戰掉角弓反張渾身強直皆曰氣虛扶痰火所致正猶火炎而旋轉火能燥物而使氣液之不足世俗多有不識者誤作風症治之而用風藥風能勝湿是不足之中而又見損也此病只宜補氣液而散痰火故仲景曰剛柔二症不可不辯蓋剛爲陽症柔爲陰症太陽惡熱無汗惡寒脈且強長胸滿口噤手足牽急咬牙甚則搘搘用弓反張此爲柔症太陽微熱多汗不惡寒脈且遲細四肢不收時時搘搘開目含口此爲柔症乃是風濕襲於太陽之經亦有輕重之分又有諸虛之候亦能成此症病表虛不任風寒亦能作此症候或瘡瘍瘡瘍一切去血太甚皆能成此疾也是乃虛爲本而風爲標耳古人云

勞風卽痓之屬強上者是角弓反張也宜緩者目開不見其物也所
剛柔二痓者當以虛實論之一屬外感一屬內傷其外感者屬剛痓也
內傷者爲柔痓剛痓者宜用麻黃葛根湯栝萎桂枝湯小續命湯在於此
者大承氣湯之類柔痓者宜用補中益氣湯八物湯四物湯之類嘗見
一婦八月經頻數忽然發痓口噤手足牽縮角弓反張是去血過勞風
邪乘虛而入用四物湯加防風荆芥羌活少加附子引經六貼而愈始
錄之傳爲一驗案醫者又當參補

活人舉卿散 治新產血虛發痓者

荆芥穗不拘多少發炒爲末每服三五錢外以大黃豆卷以蒸酒沃
之去黃卷用汁調下效如神

活人葛根湯 治太陽病無汗而小便或上氣上衝胸口噤不得欲作則
痓之症 方見寒門

大承氣湯 治剛痓大便實熱 方見傷寒門

防風當歸散 治發汗過多發熱頭搖口噤背脊反張

防風

當歸

川芎

生地黃各二錢
五分

右切一劑白水煎服

栝蔞桂枝湯 治太陽傷寒成瘓

栝蔞根

甘草炙各二兩

桂枝

芍藥

生薑各三兩

大棗十二枚

右六味作一服用水九升煮取三升作三服連進取微汗如無汗時用
煮熟粥發之

麻黃葛根湯 治剛痓無汗惡寒

麻黃

赤芍各三錢

千葛四錢

豆豉半合

右切一劑煎熟服取汗

防風當歸散 治發汗太多發熱頭搖口噤反張身者宜祛風養血

防風

當歸

川芎

地黃各二錢
五分

右切一劑煎服

小續命湯 治剛柔二痙

方見中風門

當歸補血湯 治一切去血太妄自無血養筋令人四肢攀急口癰初

一兩

當歸五錢

右切一劑煎服

黃芪

一兩

當歸五錢

右切一劑煎服

挾風加防風羌活荆芥各一錢甘草五分蕷芪減半

葛根湯 治桑瘡有汗

桂枝

四錢

芍藥

三錢

甘草六錢

葛根一兩

生薑三錢

右切每劑五錢煎服

大棗

四枚

右切每劑五錢煎服

理中湯 治桑瘡厥冷自汗

人參

三錢

川白薑炮

一錢

甘草

一錢

白朮各等分

右爲末每用三字煎服

二生飲 治桑瘡自汗肢體厥冷

南星

川烏生

附子各五錢炮

本香一分

右作散每用一錢生薑五片水煎服

翻胃膈噎論

蓋翻胃之症朝食暮吐暮食朝吐或食罷卽吐是也謂膈者五膈是也患寒熱氣之五者謂噎者有五噎也憂思勞食氣者是也膈者在心之間上下不通若拒隔之狀或結於咽喉之傍時覺有碍吐之不出之不下由氣鬱痰轉而然久則漸妨飲食而爲膈症矣噎者飲食之際氣卒阻滯飲食不能順下而爲噎症明矣又所謂翻胃膈噎三者之症目火而成其來有漸思慮過度動於脾火者忿怒過度動於肝火者暴食煎燙動於胃火者淫慾忘反動於腎火者只目火炎於上薰蒸津液而成痰疾初則痰火未結咽膈乾燥飲食不得順流所以爲膈爲噎久而痰火已結胃之上脘不開飲食須進而痰火壅塞停滯膈間須更復出謂之嘔吐至於胃之下脘不開飲食雖進停滯胃中良久方出謂之

胃丹溪曰年高氣血俱衰者不可治也昔少年氣血未虛以藥劫

痰火病尚可治老年氣血已虛再用藥却去痰火雖得暫愈其病復生難治所以氣虛則不能運化以生痰血虛則不能滋潤而生火固矣病症決不可用香燥之藥蓋香能散氣燥能耗血且此疾屬於熱燥固宜用極爲當也鈎玄云翻胃大約有四血虛氣虛有痰有熱血虛者脈必數而無力以四物湯養血爲主氣虛者脈必緩而無力以四君子補氣爲主有痰者脈必滑數以二陳湯有主有熱者脈必數而有力以鮮毒湯爲主大法當養血生津清痰降火潤燥補脾抑肝開鬱其病自安張鷄峰曰噎是神思間病惟內觀以自養可也一凡膈噎翻胃三者宜用二陳湯加竹瀝薑汁童便韭汁之類可爲主治或暮食朝吐朝食暮吐食下須臾卽吐者此是胃可容受而脾不能運化傳送或大小腸閉而不通食返而上奔者有之矣加酒蒸大黃以潤之脾不磨者以神農山楂枳實以助其化之機又有氣虛肥白之人膈噎者宜四君子湯加竹瀝薑汁是爲要藥其間有七情鬱結而成氣噎者以香附撫芎木香

檳榔括囊砂仁之類飲酒太過而傷之者以砂糖驟服共而服之腹
大便燥結者用大黃乃急則治標之法仍用四物湯加童便薑汁浸牛
牛羊之乳亦爲上策如氣血虛甚者口渴出沫必先之兆大便如羊
者亦不治也大腸無血故也又考內經曰三陽結謂之膈三陽者大小
腸膀胱是也結者熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能通膀
胱熱結則津液涸三陽既結則前後二便閉塞下既不通必反而上行
所以噎食不下縱下而復出之也此陽火不下降而上行也所謂噎膈
翻胃大抵是血液乾涸其或咽喉窒塞食不能下其稿在吸門其或食
下胃脘當心作痛須臾吐出食出痛止其稿在賣門此上焦之膈噎也
其或食物可下良久復出稿在幽門此中焦之膈噎也其或朝食暮吐
暮食朝吐其稿在闌門大小腸之間此下焦之膈噎也前所云血液俱
耗胃脘乾槁其稿在上近咽之下水飲可行硬物難入間或可入食亦
不爱名之曰噎其稿在下與胃爲近食須可下難盡入胃良久復出名

曰膈亦曰翻胃名須不同病出一体又曰噎病生於血乾血屬陰也
土平靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二臟有養陰血自生陽
胃津液傳化合宜何噎病之有醫者當知此意切不可用燥熱之藥以
火濟火則何異以挺劍而殺人耶慎之慎之

十膈氣散 治十般膈氣漸成翻胃

人參

白茯苓

官桂

枳壳

神曲炒

麥芽

乾生薑

荊子煨

三棱

莪术

陳皮

甘草

白朮各一兩

厚朴

檀榔

木香各五錢

右爲末每服二錢鹽少許入白湯調下

養胃散 治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

人參

砂仁

丁香

白豆蔻

附子炮

沉香

陳皮

肉豆蔻

麥芽

神曲

甘草

各二錢

右爲末每服二錢薑鹽湯調下

健脾丁香湯 治翻胃嘔吐達氣噎關格不通

淨全丁香

廣木香

各一兩

右切每用四錢水一錘煎六分服宜先用好黃土和泥做一個黃泥碗
用煎藥瀝入土碗中病者溫服煎渣仍前法服此方得傳於內臺有效
不可輕視

五噎散 治五噎食不下嘔吐痰涎咽喉噎塞胸膈滿痛

人參

半夏

泡七次

桔梗

白豆蔻

木香

杵頭糖

沉香

火不見

薑澄茄

枇杷葉

乾生薑

白木

鐵

甘草炙

火不見

右切一劑水二錘薑七片煎至一錘食后服

五膈散

治胸膈痞滿諸氣結聚脇肋脹滿痰達惡心不進飲食等症

枳壳

青皮

土伏子

半夏麵

丁香

火不見

南星

湯泡七次

乾薑

麥芽

草果

白木

各二錢

甘草

分五次

右切一劑煎服

五噎立效散

枇杷葉去毛陳皮各一錢

生薑五錢

右切一劑煎服

嗉子丸 治男婦氣噎效方

用鷄嗉子二個和內宿食溫絲包黃泥固濟灰火燒爛去泥用
嗉子內宿食已灰全用爲末熟糞肉研爲丸如梧桐子大每服三十
丸食前米飲送下

又一方

加木香

丁香

沉香各一錢

右爲末均入棗嗉內共爲丸尤妙

人參利膈丸 治膈噎胸中不利大便燥結痰嗽喘滿脾胃壅滯推陳
新治膈氣之聖藥也

甘草

枳實各一錢半

大黃酒蒸

厚朴姜製

人參

當歸

藿香

右爲末滴水丸如梧桐子大每服五十九溫水送下

祖傳潤腸膏 治膈噎大便燥結食進良久復出及朝食暮吐更食朝以者其捷

威靈仙

四兩
開花者
酒浸者
生薑

五月用瓦
可取汁用
搗汁
四兩

白砂蜜

一兩

真麻油

二兩

白砂蜜

一兩

右四味同入銀石器中攪均文火煎候如膏時時用筋搗
匙食之一料不效宜再進一料未有不效者也

噎方

千年石灰

古銅錢

沉香

花椒

右用燒酒一瓶共同一處煮二炷香去火毒每服一小鍾

金燒酒

治翻胃吐酸

一用古銅錢四錢打碎如米粒大入核挑一斤搗爛好燒酒一斤共

處均入銅鉢內裝錫瓶內封固瓶口以大鍋水注將藥瓶置於鍋內
柴火煮一周時取出埋地下一時以去火毒每日空心進一盞

重午後再進一盞十日內見效如神

頭痛論

按春氣者病在頭又謂諸陽會於首如足太陽膀胱之脈起於目眚上交
夾癥上入絡腦還出別項下病衝頭痛又足少陽膽之脈起於目眚者
在頭角痛則頭角額痛益風從上受之風寒侵上邪從外入客於經
令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則
瀉汗之則愈此傷寒頭痛也有頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生此
氣虛頭痛也有心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰此溫熱頭痛
也如氣上不下頭痛癩疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎
此寒溫頭痛也如頭半寒半痛者先取手少陽陽明次取足少陽陽明
此是偏頭痛也其真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節即死有厥逆頭
痛者所犯大寒內至骨髓者以腦爲主腦逆故令頭痛者齒亦痛也其
所頭痛者皆以風爲治總其大槩而言之高顙之上惟風可到故味之

薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛
惡風脈浮緊宜用川芎羌活獨活麻黃爲主少陽經頭痛脈弦細從來
寒熱宜用柴胡爲主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者宜升麻
葛根石膏爲主太陰頭痛必有痰身重或腹痛痰癖其脈沉緩宜用葛
木半夏南星爲主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒
厥其脈沉細宜麻黃細辛附子爲主厥陰經頭項痛或吐痰沫厥冷其
脈浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎氣虛頭痛人參黃芪氣血
俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荆子細辛其效如神白术半夏天
麻湯乃治痰厥頭痛之藥空青膏者風溫頭痛之藥羌活附子湯治厥
陰頭痛之藥如溫氣在頭者以苦吐之不可執方而治古人嘗病頭痛
發時兩頰青黃眩暉目不欲開顙言身體沉重兀兀然欲吐累古云此
厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更多俠谿穴卽愈此
在踝內後跟骨動脈陷中宜灸三壯其論至爲詳悉丹溪曰爰主於

其痛甚者火盛宜清痰降火芳疫下虛之人似傷寒發熱汙出兩大作痛此相火自下衝上宜補中益氣借用川芎當歸甚者加知母子又曰自魚尾上攻而偏屬血虛宜用當歸川芎再加酒炒黃柏又偏頭風者在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熟用酒炒片芩在左屬血虛風用荆芥薄荷故荆芥薄荷是頭之主藥也宜詳証加減用之血虛宜當歸川芎白芍黃柏王節齋曰久病頭痛畧感風寒便發遇寒月須重綿厚帛以包裹者此屬營熱正是本熱而標寒俗人不知率用辛溫解散之藥暫得其效誤認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疏故風寒易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之藥須能開通閉逆散其標之寒邪以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣惟當泄火涼血爲主而佐以辛溫散表之藥以從治之法治之則病可愈而根可除又所謂頭痛頭風者兩無異也但有新久畱去之分淺而近者名曰頭痛其痛卒然而發以易於解散深而遠者名曰頭風其痛不常愈而渭感復作此

頭痛頭風遠近之分也。脈之浮滑者易治，脈之短濶者難愈。醫者務宜詳辯而細察焉。毋得倉卒而進藥矣。

選奇湯 治眉稜骨痛不可忍者大有神效

羌活

防風各二錢

甘草五分

酒芩一錢各半夏五錢

右切一劑入酒一小鍾引藥上行

清上瀉火湯 治熱厥頭痛上焦熱甚者

荆芥

川芎各五錢

蔓荆子

當歸各二錢

蒼朮二錢

黃連

生芍

藁本

生甘草

升麻

防風各五錢

酒柏一錢

黃芪

酒芩五錢

酒知母一分

羌活二錢

柴胡三錢

細辛二錢

紅花二錢

右切二劑煎服宜稍熱進

清空膏 治偏正頭痛年深不愈善療風濕熱頭痛上壅及腦目俱痛
止者諸頭痛悉皆治之惟血虛頭痛不可治