

韶關專區油料、雜糧、綠肥、

作物良種介紹



韶關專區良種公司

前 言

我区在一九五六、五七年，全面进行了杂粮、油料、綠肥等作物品种普查整理和鑑定工作，并在几年来的生产实践证明，已基本确定了全区共有蕃薯品种92个（良种占24个）、花生品种34个（良种18个）、油菜品种17个（良种8个）、玉米品种29个（良种9个）、高粱粟品种18个（良种11个）、杂豆品种51个（良种4个）、小麦品种17个（良种7个）、綠肥良种7个、芋头品种40个、大薯品种10个等优良品种。为使种子工作赶上农业生产更大跃进的要求，和更进一步的发挥良种的作用，特将我区的杂粮、油料、綠肥等作物良种的性状和适应性能栽培注意事项与品种来源分布等情况，编印成册子以供各地农业工作者們研究参攷。

但由于整理材料时很多作物还未收获，所以对一九五八年大跃进后出现的新情况还未很好补充，同时因作物种类較复杂、品种多、分布較广，加上限于人力与水平关系，这册子材料是不够完善的，請讀者們多提出补充和修改意見。

韶关专区良种公司

1958年12月

目 录

花 生

(一) 直生型

大珠豆.....	1
珠豆.....	2
一穴豆.....	3
山东一窝蜂.....	3

(二) 丛生型

獅头企.....	4
白头企.....	5

(三) 蔓生型

大鈎咀.....	6
竹絲豆.....	7
鑽地龙.....	7
番鬼豆.....	8
大油豆.....	9
大直絲.....	10
桂花豆.....	11
連地針.....	12
天津洋豆.....	13

鈍篤仔·····	14
----------	----

油 菜

大桥油菜·····	15
曲江油菜·····	16
大样油菜·····	17
鉄龙油菜·····	18
始兴油菜·····	19
珠砂紅油菜·····	19
四川大粒油菜·····	20
四川早黄油菜·····	21

大 豆

大黄豆·····	23
大青豆·····	23
二青豆·····	24
春分豆·····	25
田唇豆·····	26

蕃 薯

番北白皮白心·····	27
細叶薯·····	28
安南薯·····	29
杉薯·····	29
胜利百号·····	30

大叶薯	31
烏骨企龙	32
白骨企龙	33
湖南三十日早	34
番鬼薯	35
杜粪薯	36
鷄乸薯	37
紅藤密苳	38
黑尾薯	38
称钹薯	39
台农三号	40
原香薯	41
杂交十八号	42
紅藤薯	43
紅皮白心	43
藤仔薯	44
餓死猪	45
正紅心薯	46
懶佬薯	47
东莞紅莖木薯	47

玉 米

金皇后	49
百二早黄玉米	50
大暑麦	51
深仁紅麦	52

深仁白麦	53
火燒麦	53
八月麦	54
六月麦	55
七托麦	56
白馬牙	57
五合仔	58

麥 類

河婆六角麦	59
陈桥小麦	60
东莞小麦	60
南大2419	61
簕衣麦	62
乔麦	63

高 梁、粟 类

密高粱	64
白米矮脚高粱	65
高脚糯米高粱	65
大粒高粱 (高脚种)	66
矮脚高粱	67
湖南高粱	68
馬尾扫	69
紅高粱	70
狗尾粟	71

拳头粟·····	71
金黍·····	72

綠 肥

紫云英·····	74
連县蘿白青·····	75
滿园花·····	76
黃花目宿·····	77
白花豌豆·····	78
大莢荷兰豆·····	79
狗爪豆·····	79

花生

(一) 直生型

大珠豆

一、品种来源及历史：

系連县农家良种，已栽培三十余年，分布于連县、曲江、仁化、連山、韶关市郊等地，其中以連县栽培最多，現有面积約5000亩。

二、表現情况：

早熟。三月中旬播，六月下旬收，生长期一百天。一般亩产150—200斤，曲江县一九五八年高产800斤一亩，連县最高达1230斤一亩。該种直生，适于高度密植，死兜少，壳薄，拆仁率高，有推广前途。

三、特征特性。

生势强，分枝中，株高1.5尺直生，叶色濃綠，平均每株結荚17个，最多72个，分层結荚而集中，成熟不太整齐，空壳率7%，壳較薄，拆仁率81%，出油率47%。抗旱性强，耐寒性弱，耐肥中等，抗病虫害力強，耐湿性中。各种土壤均可种植，但以沙壤土为最好。

四、栽培注意事項：

1. 不宜低窪潮湿的地方种植。
2. 注意打頂摘心。
3. 开花时要施一次石灰或草木灰，以中和土酸促进結荚。

珠 豆

一、品种来源及历史：

农家良种，分布于全区各县。由于栽培历史悠久，分布广所以别名很多，常叫的有：四季豆、吊豆、百日豆、雪豆、六月爆、賊佬豆、六月吊、早花生、六月狼子等，現有面积45,300亩。

二、表現情况

直生，早熟，生长期九十天至一百天，可以翻秋。分枝中等，适于高度密植，結荚多而飽滿，一般亩产120—225斤，連县高产600斤一亩，适应性广，出油率高，极受群众欢迎。

三、特征特性：

直生型，生势中，分枝3—7个，莖长6—9寸，根瘤多。莖色淡黃，叶色淡綠，叶片橢圓形，叶柄长1.5寸，开花部位低，数量多，淺黃色，分枝与主莖成二十度角，每株結荚20—27个，空荚率8%，子房柄长1—1.5寸，荚果成熟一致，每荚1—2仁。圓形，皮色淡紅，中等大小，壳薄飽滿，折仁率82%，出油率30%。耐肥，耐寒，耐酸力弱。抗病虫害力中，抗旱力强，耐湿性弱。

四、栽培注意事項：

1. 选择疏松沙质壤土。

2. 适当施用石灰。

3. 注意培土剪心。

一 穴 豆

一、品种来源及历史：

原产怀集县，近年引入阳山县试种，现有面积约60亩。

二、表现情况：

中熟，生长期一百三十天，经阳山七拱人民公社试种，表现结荚多而集中，一般亩产300斤，适于沙质壤土栽培。

三、特征特性：

株高1.2尺，分枝中等，直生，叶色浓绿，每株结荚30—40个，大而集中，每荚二仁，红褐色，壳厚中等，黄白色。耐肥力强，耐湿性中，病虫害少，抗旱性中，不宜连作。

四、栽培注意事项：

1. 选择沙质壤土增施草木灰作基肥。

2. 适期追施石灰。

3. 与玉米、蕃薯轮作较好，不宜连作。

山 东 一 窝 蜂

一、品种来源及历史：

山东一窝蜂原产山东，一九五七年引入南雄县试种，有二年历史。

二、表现情况：

經兩年試種結果，适于我区环境栽培，生长期一百一十天至一百二十天，直生，結莢多而集中，一般亩产150斤以上，有推广前途。

三、特征特性：

生勢強，分枝特多，主莖較短，莖葉濃綠色，根瘤多；每株平均有效莢25——40个，結莢整齊，每莢二仁，大粒，皮紅色，壳厚。抗旱力中等，十分耐肥，耐湿中等，耐寒及抗病虫力都強，适于沙泥田种植。

四、栽培注意事項：

1. 該品种結实較淺 吸肥力強，必須施足基肥，及早追肥，否則实粒不多。
2. 注意培土使子房柄能全部入土。
3. 开花期进行松土以便落針。

(二) 丛生型

獅 头 企

一、品种来源及历史：

一九五六年由汀海县引入曲江、南雄等县种植。

二 表現情况

丛生，早熟种，三月中旬播，七月上旬收，生长期一百天，在曲江县熟期較迟，春分播，小暑收，生长期为一百一十天。一般亩产110——160斤；曲江县艺州农场一九五八年高产达1200斤。适于肥沃壤土，宜密植。

三、特征特性：

生势强，分枝中，苗高1.5尺，根瘤多，叶色绿。每株结荚18—30个，集中空荚率8—10%，落针整齐，成熟齐度中；每荚二仁居多，壳薄，子粒大而饱满，外表光滑，出油率高。耐肥力强，耐寒性中，抗病虫害力强，抗旱性弱，耐湿性中。

四、栽培注意事项：

1. 选择肥沃的壤土，早播密植。
2. 始花期适当施用石灰。
3. 注意培土和剪心。

白 头 企

一、品种来源及历史：

一九五六年由汀海县引入曲江县试种，面积甚少仅5亩。

二、表现情况：

经曲江黎市艺州农场三年试种表现良好，生长期一百天左右，一般亩产200斤，一九五八年高达820斤一亩，适应性强，可连作，有推广价值。

三、特征特性：

生势强，分枝多，苗高2—2.1尺，丛生，根瘤多，叶绿色。每株结荚20个，集中，空荚率10—15%，荚果成熟整齐，壳薄比较光滑，每荚2仁，大粒，红色，含油率高。耐肥，抗旱，耐湿，耐寒均中等，抗病虫害力强，宜沙质壤土。

四、栽培注意事項：

1. 選擇沙質壤土，早播密植。
2. 基肥應加石灰，始花期追磷、鉀肥，並適當加施石灰。
3. 適期收穫。

(三) 蔓 生 型

大 鉤 咀

一、品種來源及歷史：

曲江縣農家良種，栽培歷史悠久，現有面積1500畝。

二、表現情況：

蔓生，遲熟種，清明播，處暑收，生長期一百五十天。
植株高，莢果長大，常產200斤一畝，今年一般畝產1000斤左右，曲江縣樟市人民公社衛星田畝產6300斤，周日創造了畝產6850斤的最高紀錄。

三、特征特性：

生勢強，分枝多，株高2.2—3尺，根瘤多，葉綠色。
每株平均17個莢，空莢率12%，成熟整齊，莢果鉤咀，壳厚，平均3仁，出仁率60%。耐肥，耐寒性中，抗旱性弱，耐濕性中，抗病蟲力強，不易脫莢。

四、栽培注意事項：

1. 選擇肥沃壤土，提早播種。
2. 施足基肥，增施磷、鉀肥和石灰。

3. 做好剪心压蔓工作，提高单位面积产量。

4. 不宜连作。

竹 絲 豆

一、品种来源及历史：

又名双料大督仔，是翁源县农家良种，已栽培三十多年，現有面积33,500亩。

二、表现情况：

迟熟种，生长期一百三十五天；产量高而稳定，一般亩产150—200斤，一九五八年翁源县新江翁城人民公社的卫星田，平均亩产达334斤。适宜沙质壤土。

三、特征特性：

生势强，分枝多，蔓生。主蔓长2.5尺，根瘤少，叶色青绿；每株平均结荚27个，成熟整齐，空荚率11%，每荚3—4仁，子粒大，壳厚，出仁率68%。耐肥、抗旱性强，耐寒性中，耐湿性弱，怕浸，抗病力中，抗虫力强。

四、栽培注意事项：

1. 选择排水良好的沙质壤土种植。
2. 多年栽培，混杂很多，注意选种。
3. 适时收获，防止生芽。

鑽 地 龍

一、品种来源及历史：

鑽地龙又名八月爆、大豆，系曲江县农家良种，栽培

历史悠久，現有面积800多亩。

二、表現情况：

蔓生，迟熟种，清明播，处暑收，生长期一百五十天，荚果大，成熟整齐，产量高，过去一般亩产150—200斤，一九五八年普通亩产都有1500斤。适应性强，群众欢迎，有推广前途。

三、特征特性：

生势强，分枝多，莖蔓粗壮，根系发达深生，根瘤多，主莖长1.8—2.2尺，叶片淡綠色，平均每株25荚，空荚率19%；荚果成熟整齐，每荚2—3仁，中等大小，壳厚，出仁率65%。耐肥，抗旱性弱，耐湿性中，抗病虫力强，耐寒性中，难脱荚。

四、栽培注意事項：

1. 根系发达深生耐肥，以选择疏松肥沃的沙质壤土种植为宜。
2. 注意防旱。
3. 适当施用石灰。
4. 做好剪心压蔓工作。

番 鬼 豆

一、品种来源及历史：

番鬼豆又名番鬼子、大粒豆、迟花生、大豆等，系我区农家良种，全区各县都有种植，栽培历史悠久，現有面积8万亩。

二、表現情况：

中熟，生长期一百三十天；一般亩产150—250斤，今年清远县高产610斤一亩，乳源县幸福公社創造了亩产1450斤的高产纪录，該品种結荚多，适应性广，出油率高，有推广前途。

三、特征特性：

生势强，分枝中，蔓生，莖叶繁茂，主莖中长，莖叶青綠，根系发达，根瘤中等，結荚整齐，每株25—30个，空荚率12%，每荚2仁居多，中等大小，壳厚。耐肥强，耐寒性中，耐湿性较强，抗旱性中，抗病虫力中等。

四、栽培注意事項：

1. 选择疏松沙泥田加施石灰
2. 种子不宜过于老熟，并要精选种子。
3. 不宜連作。

大 油 豆

一、品种来源及历史：

本地良种，又名油豆，栽培悠久，連县、英德局部地方有种植，現有面积2000亩。

二、表現情况：

迟熟种，生长期一百八十天；适于山地栽培，不死苗，結荚多，空荚少，产量高而稳定，一般亩产150—250斤，比較高的有750斤，英德县产量较高，一九五八年上游人民公社英德耕作区27.5亩，平均亩产1251斤，最高1300斤，有推

广前途。

三、特征特性：

苗高1.5—2尺，蔓生，根瘤多，叶青绿色，底有茸毛；每株结荚25—46个，多达120个，荚果大壳厚，每荚2—3仁，子粒大，出油率43%，生食甜，适应性强，耐肥，抗旱，耐寒中，抗病虫害力强，怕浸；宜黄沙坭种植。

四、栽培注意事项：

1. 选择排水佳良黄沙坭田，不宜易浸地种植。
2. 播种前用石灰水选种。
3. 注意压蔓。
4. 不宜连作。

大 直 絲

一、品种来源及历史：

农家种，又名大勾咀、大粒勾、大花子、花罗生、牛角豆、大金勾、纯篇豆、大豆、大个子、大个勾等，栽培历史悠久，分布于英德、南雄、始兴、曲江、乐昌等地，现有面积8万多亩。

二、表现情况：

清明前播，秋分收，生长期165天迟熟。各地种植表现产量高而稳定，过去一般亩产200斤左右，一九五七年高产达800斤一亩，有推广前途。

三、特征特性：

生势强，分枝多，茎高2尺余；蔓生，根瘤多，叶色浓