

瘡疾 痢疾 痞症 泄瀉 吞酸

黃疸 水腫 鼓脹 赤白濁

暑門

瘧疾

十八

丹溪心法

○瘧疾有風

暑

食

痰

老瘧

瘧母

大法風暑當發汗

月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也

惡飲食者必自飲食

得之

無汗者要有汗散邪為主帶補

有汗者要無汗正氣為主

帶散

一日一發者受病一月

間日一發者受病半年

三日一

發者受病一年

二日連發住一日者氣血俱病

瘧病感虛者須

以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同

發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果前服

久

瘧不得汗者二陳湯如檳榔倍蒼朮一方加柴胡葛根川芎一補
一發不可直截老瘧病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散
入方宜

川芎

撫芎

紅花

當歸

炒栢

白朮

蒼朮

甘草

白芷

右剉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分
者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬

○瘧按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟傳出致腑亂而
失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之術下陷謂陽氣下
陷人陰血中無汗要有汗多用川芎蒼朮乾葛升柴胡之屬此

丹溪治瘧之微旨學者所當知也

瘧常山飲

穿山甲 炮五分 草果 八分

知母 一錢

檳榔 七分

烏梅 八分 常山 八分

甘草 炙二分

石吹咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為順

云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮

又方

柴胡 草果 常山 知母 貝母 檳榔 各等分

右用酒水同煎一宿臨發前一時服

又治瘧母此藥消導

青皮 桃仁 紅花 神麴 麥芽

鼈甲醋炙

三稜

海粉

莪朮

香附醋炙

右為末丸如梧子大每服五七十九白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲水水外多汗出

人參

蒼朮

白朮

黃芪

黃芩

黃連

山梔炒

川芎

半夏

天花粉

右咬咀水三鍾薑三片煎服

又治瘧疾發渴

生芩

麥門冬

天花粉

牛膝

知母

炒栢

葛根

生甘草

右咬咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿

冬瓜葉

官桂

馬鞭草

右焙乾為末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一時服盡

又云青蒿一兩冬青葉二兩馬鞭草二兩杜二兩未知孰是姑

兩存之以俟知者

截瘡

檳榔

陳皮

白朮

常山

各三錢

茯苓

烏梅

厚朴

各一三半

右咀咀作二服水一鍾酒一鍾煎一鍾當發前一日一服臨發日

早一服服後少睡片時

又瘡疾後

白朮

半夏

一兩

黃連

陳皮

各半兩

白芍

二錢

右爲末粥丸如梧子大每服六十九薑湯下

附諸賢論

心法附錄曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之脾寒此因名而遂其
實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他乎在其陽分者
易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅爲主東垣謂寒
瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘧
此言是但三陰經說不明凡在於子午卯酉者少陰瘧也寅申
巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

附脉理

脉訣舉要曰瘧脉自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷
心法附錄曰瘧脉多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久

而脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之中見弦也
手耳細察可見也

附諸方

黃連香薷飲 治伏暑發瘧煩渴者 見中暑

桂枝羌活湯 按粹方 治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮惡寒有汗者

桂枝 羌活 防風 甘草 各半兩

右為粗末每服半兩水煎如吐加半夏麴等分

麻黃羌活湯 按粹方 治瘧疾頭痛項強脉浮惡風無汗者

麻黃 羌活 防風 甘草 各半兩

右為粗末每服五錢水一鍾半煎服如吐加半夏麴等分

麻黃桂枝湯 按粹方 治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

麻黃一兩 去節

甘草三錢 炙 黃芩五錢

桂枝二錢

桃仁二十個 去皮尖

右為末水煎服 桃仁散血暖肝夜發乃陰經而有邪用此湯散血

中風寒也

桂枝黃芩湯按粹方

治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三

陽合病也

桂枝二錢 黃芩

甘草 人參各四兩半

柴胡一兩四錢 石膏

知母各五錢 半夏四錢

右為粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯按粹方 治瘧疾先寒後熱熱多寒少

桂枝五錢 石膏

知母各一兩半 黃芩一兩

右為末分三服水二鍾煎服問日者邪氣所合故也

人參養胃湯

治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四

獸飲之類截之因食倍加草果

見胃寒類

萬安散

濟生方

治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效

氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮

酒浸去
皮炒

厚朴

薑製
少

陳皮

去白

檳榔

常山

酒浸

甘草

炙各一
錢半

右咬咀水鍾半煎一鍾露一宿當發日作二服忌熱性物片時

定齋草果飲子

藥易方

快脾治瘧

草果

蒼朮

酒浸

厚朴

陳皮

半夏麴

甘草

炙

烏梅

支核各等分

右咬咀每服半兩水鍾半薑五片棗二枚煎七分不拘時服寒多

者加乾薑附子熱多者只加柴胡瘡瘡加檳榔

柴胡桂枝湯治人方治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者并治勞瘧

柴胡四兩

桂枝去皮一兩半

黃芩一兩半

瓜蒌根一兩

牡蠣炮碎炒

甘草名

乾薑各一兩炮

右咬咀每服五錢水一鍾半煎至八分溫服

柴胡加桂湯治人方

治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡八兩去苗

人參六兩

甘草炙

半夏炮七次

黃芩

肉桂去皮各二兩

右咬咀每服五錢水鍾半薑七片棗二枚煎服若渴者去半夏加

人參瓜蒌根同煎服之

○已上數方治瘧寒多熱少發散之劑無汗可用

小柴胡湯 治瘧疾熱多寒少但或單熱頭疼口乾胸滿者方見類

柴胡括裏根湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡去苗一兩 七錢半 天花粉一兩 黃芩去黑心 人參 甘草炙七錢半

右服一兩薑五片棗一枚水二鍾煎一鍾去渣通口服

白虎加桂枝湯治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母六兩 甘草炙二兩 桂枝三兩 粳米二兩 石膏一斤

右咬咀每服五錢水鍾半煎一鍾去渣溫服

清脾飲治瘧瘧來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽

熱小便赤澀

青皮去白 厚朴薑製 白朮 半夏湯洗七次 黃芩

草果仁 柴胡去苗 茯苓去皮 甘草炙各等分

右吹咀每服四錢水鍾半薑五片煎七分溫服不拘時

參蘇飲

治發瘧熱多寒少兼咳嗽者

見傷風類

驅瘧飲

治發瘧熱多寒少者

前胡

柴胡

各四兩

桂心

桔梗

厚朴

半夏

各三兩

黃芪

乾薑

炮

甘草

炙各二兩

右剉水二鍾生薑三片棗四枚煎至一鍾溫服

○已上數方治瘧熱多寒少發散之劑

有汗可用

大柴胡湯

治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利為度餘邪

未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪

方見濕熱

白芷石膏三物湯

白芷

一兩

知母

兩七錢

石膏

四兩

右為粗末每半兩水一鍾煎服

○已上二方治瘧熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲

簡易方

治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與

衛氣相搏發為瘧疾

人參

去芦

白朮

茯苓

去皮

橘紅

草果仁

半夏

湯泡

棗子

生薑

烏梅

去核各等分

甘草

炙減半

右以咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮令香

熟焙乾每服半兩水二鍾煎六分未發前作進數服

七寶飲

簡易方

治一切瘧疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘧

厚朴

薑製

陳皮

甘草

炙

草果仁

常山

雞骨者

檳榔

青皮

各等分

右吹咀每服五錢水一鍾半酒半鍾煎至一鍾露一宿空心向東

溫服睡少頃時須忌熱性物寒多加酒服

清肺飲三四方治飲食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴四兩薑炒烏梅去核半夏湯去滑青皮

良薑各二兩草果去皮一兩甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一鍾薑三片棗一枚煎七分未發前併二服

忌生冷油膩之物

○已上三方治瘧寒多熱少止截之劑

常山飲和劑方治瘧疾發散不愈漸成勞瘵

知母 川常山 草果各二兩良薑二兩

甘草 烏梅去核各一兩六錢

右吹咀母服五錢水一鍾薑五片棗一枚煎七分溫服

六和湯

人參

知母

草果

貝母

白芷

烏梅

檳榔

柴胡

各一錢用酒拌常山 二錢

右剉薑三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

○已上二方治瘧熱多寒少止截之劑

鬼哭丹

治瘧三二日一發者

常山

一斤醋浸春五夏二日秋七冬十日

檳榔

各四兩

半夏

貝母

各二兩

右爲末用雞子清麪糊爲丸如梧桐子大每服三十九丸隔夜臨睡

令酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸

治瘧三日一發或十日一發

薑黃

三錢

白朮

半兩

人參

檳榔

草果

我朮

醋炒

厚朴

各半兩

黃芩

半夏

青皮

各一兩

甘草

三錢

右為末飯丸如梧子大每服六十九一且二服食遠白湯下

紅丸子

濟生方

專治食瘡

青皮

炒三兩

阿魏

醋化二錢五分

蓬朮

醋煮

京三稜

醋煮各二兩

胡椒

一兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十九至

百丸淡薑湯下或因食生果成瘡用麝香湯吞下

老瘡飲

三因方

治久瘡結成癰瘕疔瘰在胸脇諸藥不愈者

蒼朮

米泔浸

草果

去皮

桔梗

青皮

陳皮

良薑

各半兩

白芷

茯苓

半夏

湯洗去滑

甘草

炙

枳殼

麩炒

桂心

乾薑

炮各三錢

紫蘇葉

川芎

各一錢