

續名醫類案

弟六

S28
1800
1716



續名醫類案十六卷

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄重校
定州楊照藜素園

同校

痰

洞虛子曰。痰之爲病。成偏頭風。成雷頭風。成太陽頭痛眩暈。如坐舟車。精神恍惚。或口眼瞤動。或眉稜耳輪俱痒。或頷腮四肢遊風腫硬。似疼非疼。或渾身燥痒。搔之則陰疹隨生。皮烘熱。色如錦斑。或齒頰似痒似痛。而無定所。滿口牙浮。痛痒不一。或噁氣吞酸。鼻聞焦臭。喉間豆腥氣。心煩鼻



塞咽隘不利。咯之不出。噦之不下。或噴嚏而出。或因舉動而吐。其痰如墨。又如破絮。或如桃膠。或如蜆肉。或心下停水。鐵閉。滯窒妨悶。噯噯連聲。狀如膠氣。或寢夢如刑戮。刀兵劍戟。或夢入人家。四壁圍繞。暫得一竇。百計得出。則不知何所。或夢在燒人地上。四面烟火。枯骨焦氣。撲鼻無路可出。或因觸發忿怒。悲啼而淚。而寤。或時郊行。忽見天邊兩月交輝。或見金光數道。回頭無有。或足膝痠軟。或骨節脚腰腎疼痛。呼吸難任。或四肢肌骨間痛。如擊戮。乍起乍止。並無常所。或不時手臂麻疼。狀如風濕。或如芒刺在背。着膚。或如毛蟲所螫。或四肢不舉。或手足重滯。或眼如薑

蜚膠黏痒。瀹開闔甚難。或陰晴交變之時。胸痞氣結。閉而不發。則齒痒咽痛。口糜舌爛。及其奮然而發。則噴嚏連聲。初則唾稠黏。次則清水如注。或眼前黑暗。腦後風聲。耳內蟬鳴。筋攣肉惕。治之者。或曰腠理不密。風府受邪。或曰上盛下虛。或曰虛。或曰寒。或曰發邪。惟洞虛子備此苦疾。乃能治療。病勢之來。則胸腹間如有二氣交紐。噎塞煩鬱。有如烟火上冲。頭面烘熱。眼花耳鳴。痰涎涕淚。並從肺胃間涌起。凜然毛豎。噴嚏千百。然後遍身煩燥。則去衣涼體。稍止片時。或春秋乍涼之時。多加衣衾。亦得暫緩。或頓飲冰水而定。或痛飲一醉而甯。終不能逐去病根。乃得神祕沉

香丸屢獲大效。愈人萬數。但不欲輕傳匪人。故以詩隱括之。詩曰。甌裏看翻甲帶金。於今頭戴草堂深。相逢二八求斤正。硝煨青礞倍若沉。十七兩中沉半兩。水丸梧子意須斟。驅除怪病安心志。水瀉雙身却不任。大黃蒸八兩。黃芩八兩。青礞石一兩。硝煨如金色。沉香半兩。

孫兆治綵白舖劉員外。患傷寒六七日。晝夜不得眠。方眠卽起。方起卽倒。未嘗少息。時復身上冷出汗。孫診之。尺寸脈皆沉。關中亦沉。重脰之鼓。擊於指上。此寒痰積聚於胸中也。遂用陳皮半。夏乾薑三物各一兩。爲飲。生薑半兩。槌碎。以水兩碗。煎七分去渣。分二服。服藥經時遂睡。經一晝夜。

不甦既覺下痰一塊如雞子大其病遂愈凡痰皆有冷汗其症明矣

張子和治一婦人。心臍上結硬如斗。按之若石。人皆作痞治。鍼灸毒藥禱祈無數。如捕風然。一日張見之曰。此寒痰也。脰其兩手寸關皆沉。非寒痰而何以瓜蒂散吐之。連吐六七升。其塊立消過半。俟數日後再吐之。其涎沫類雞黃。腥臭特殊。約二三升。凡如此者。三以人參調中湯五苓散調服以平矣。

朱丹溪治白雲許先生。始因飲食作痰。成脾疼。後累因觸冒風雪。腿骨作疼。衆皆以脾痰骨疼爲寒。雜進黃牙等藥。雜

治十餘年間。艾炙數萬計。或似有效。及至病再作。反覺加重。至五十一歲時。又冒雪乘船。而病愈加。至坐則不能起。扶起亦不能行。兩胯骨不能開合。若脾疼作時。則兩胯骨痛處似覺稍輕。若飲食甘美。脾疼不作。則胯骨痛增重。諸老袖手計無所出。朱謂此初因中腕有宿食積痰。雜以冲冒寒濕。抑遏經絡血氣津液不行。痰飲注入骨節。往來如潮。其涌而上。則爲脾疼。降而下。則爲胯痛。非涌泄之法。不足以治之。時七月二十四日。遂以甘遂末一錢入豬腰子內。煨以食之。連瀉七行。至次日兩足便能行步。至八月初三日。嘔吐大作。不能起床。顆粒不食。但時煩躁。氣弱不能

言語諸老皆歸罪於七月之瀉而又知累年之熱補俱悞
皆不敢用藥朱嘗記金匱云病人無寒熱而短氣不足以
息者此實也其病多年鬱結一旦以刀圭之劑泄之走動
猖狂之熱未有制御之藥所以如此仍以吐劑達其上焦
以次第治及其中下二焦於初三日用瓜蒂吐不透初六
日用梔子又吐不透初九日用附子三枚和漿與之始得
大吐嘔噦終日前後所吐共得膏痰沫液一大水桶初十
日遂以朴硝滑石黃芩石膏連翹等涼藥咬咀一斤蒸濃
汁放井水中極冷飲之十一十二十三十四日每日食上
件藥一盞十五日腹微滿大小便皆祕悶朱欲用大承氣

下之諸老皆以爲不可十六日六脈皆歇止朱診其脈獨

歇止於卯酉二時其餘時刻平和如舊朱曰卯酉爲手足

陰陽之應卯時屬大腸酉時屬胃此大腸與胃有積滯不

行當速瀉之爭論不已至十八日遂作紫雪半斤十九日

紫雪成成每用一匙頭以新汲井水化下至二十日天未

明已服紫雪五兩神思少安腹滿亦減秀按觀于此案丹

識定力色色可臻絕頂若少一游移大事去矣景岳輩每疵議丹溪之學不知遇此大症能措手否遂收起

紫雪不與二十一日大爲小便閉作痛所苦遂飲以蘿蔔

汁半茶盅隨手痛止小便立通二十二日小腹滿痛不可

捫摸神思不佳遂以大黃牽牛作丸服至三百丸至二十

三日巳時大小便併通如爛魚腸三碗許臭惡可畏是日
神思少安。脰其脈不歇止矣。二十四日腹大絞痛殆不能
勝者約一時許腰膀沉重且墜兩時不出聲不能言。渴不
穢物如柏油條者一尺許。肚中如燒。片時方定。至二十五
日神思漸安夜間得睡。二十六日漸出聲音語自初二日
至此並顆粒不曾入口。語言並不出聲至二十七日方啜
半盞稀粥者四次似有生意。至次月初四日方平安其脈
自嘔吐至病安日皆平常弦大之脈。唯有中間數日歇止
少異耳。至次年四月復行倒倉法。方步履如初。

徐東泉治匡掌科夫人年三十餘病胃腕連胸脇痛日輕夜

重兩寸關脈弦滑有力諸醫以爲積滯凝寒用發散及攻下藥繼用鐵刷散四磨飲等方俱不效後至湯水皆吐而不納經月不食痛且益甚徐謂其爲痰鬱明矣但痛久弱甚不敢行吐法奈何偶一醫謂五靈脂沒藥素用有效遂皆哂之曰此藥用之久矣多矣徐謂再用亦無妨何哂之有彼用酒調服病者到口便吐隨吐綠痰兩碗許痛卽止遂納飲食此蓋痰在上下之亦不去必得吐法而後愈經曰有故無隕此之謂也歟

全書

孟望湖淮安人耳中聞人聲悉是祖考談其家擾撓不休邀劉春齋醫治診之曰暴病謂之胃火怪病謂之痰用滾痰



丸下之而痊續金陵瑣事

一男子吐痰胸膈不利飲食少思服海石瓜蒌之類不應曰此脾氣虛弱不能消導而爲痰當健脾爲主彼不信又服驅逐之劑其痰如漏四肢浮腫小腹腫脹小便瀼滯曰此復損脾腎所致也先用金匱加減腎氣丸補中益氣湯治之諸症漸減又用八味丸兼前湯而愈

一男子素吐痰遇怒其痰益甚胸膈痞滿此肝木制脾土也用六君子湯加木香泊而愈

一婦人吐痰頭暈帶下青黃用四七湯送白丸子小柴胡加白朮茯苓治之而安

舊僚錢可久素善飲面赤痰盛大便不實薛以爲胃痰壅滯
用二陳苓芩連山梔枳實乾薑澤瀉升麻一劑吐痰甚多
大便始實此後日以黃連三錢泡湯飲之而安

一婦咳嗽其痰上壅日去五六碗作氣虛水泛爲痰用六味
丸料及四君子各一劑而愈

陳三農治一人痰出盈盆不止脈豁大無力此內傷不足之
症用人參附子各五錢乾薑蘆撥枳榔枳壳一劑而愈

一人滿口痰珠至舌尖則成大泡綿綿不絕此火熱在胃大
寒在肺也

肺與胃息息相通斷無胃熱而肺反寒之理
矣且試觀其用藥治胃熱輕而肺寒重耳

用

參附湯保定肺氣後砂仁益元散散瀉胃火而安

一人痰涎壅盛汗出不止此脾虛不能攝痰而肺失所養切
不可作痰治只補脾胃為主用參朮煨薑各二錢半夏一
錢煎服愈

陸養愚治董潯陽夫人稟氣怯弱性情沉鬱年三十得一病
晚間發熱天明始止飲食漸減煩躁不安初服補血養陰
年餘轉羸瘦又服參耆補氣不效醫謂脈已歇止恐不能
久診之右手果然左手但微弱而數詢其月事則先期而
少曰先期是血熱應左手之數少是血虛應左脈之微脈
症相應奮手歇止此必鬱痰伏在氣分故脈結不至非死
脈也第發熱必有所起之處令詢之則曰右脇一團熱起

漸延遍身。再問熱起處。必有結而成形者。按之果有柔塊。如碗狀。曰不足憂也。攻去其塊。諸症自愈矣。爲製一方。香附一斤。醋製。與巴豆二兩。同炒至巴豆黑色去之。醋打麩糊爲丸。梧子大米飲下五十丸。日三服。又用四物湯加山梔貝母白蔻仁木香薑棗煎。日一劑。半月塊消。肌肉漸長。一月精神爽健矣。

陸肖愚治李安吾正室。不育及納妾則俱孕。生子出痘正者死。而妾者生。悲愁彌月。遂胸脇脹痛。每臥必令人於背上槌之。良久方得就枕。片時臥不能仰。仰則氣涌而喘。食減肌消。月事數月不行。脈之寸沉而數。關沉而滑。尺沉而弱。

脈興病應此鬱火成痰之症也用調氣養榮湯加白芥子
倍霞天麴數劑胸脇少舒可仰臥矣第大便五日不行小
腹脹急與滾痰丸二錢又慮元氣不足改用補氣養榮湯
二劑大便秘去燥矢數枚後出皆痰積脹痛減後與補藥間
服月餘而安

吳遜齋體肥素有酒積胃脘作疼近又肢節疼而下體更甚
或以爲風用史國公酒酒療之時作時止改用虎潛河車
等丸則疼處且腫脈之六部皆緩滑而關稍帶弦此濕痰
流注關節而痛非風亦非虛也治法宜先用九劑清中宮
之積痰繼用煎劑疎筋絡之壅滯則肢節之痛除而胃脘

之疾亦愈矣。依法服之果然。丸方霞天麴、山查、橘紅、白朮、茯苓、枳實、神麴、竹瀝、打糊爲丸。食遠白湯送下。煎方蒼朮、苡仁、半夏、南星、白芥子、威靈仙、秦艽、炙甘草、青木香、枳殼、入酒一小杯半飽時服。

潘元石怒後縱飲，遂患吐逆，飲食半留半出，甚則嘔物如褐色，胸脇脹痛徹背。或以翻胃治之，反潮熱煩燥。又以肺癰治之，飲食減而嘔脹益甚。或見吐出之物，謂肺爛矣。診之見其肌肉未消，聲音不改，兩寸滑數，左關弦，右關滑，兩尺寸平。曰：此非肺壞也。第爲鬱怒所致耳。怒則血菀於上，與痰膠結，濁陰不降，而膈脹生焉。法當涌之，用常山五錢，紅