

南京中医药大学图书馆版权所有

鍼灸傳真內經刺法原叙

內經岐黃書也。岐黃鍼灸祖也。不讀內經。不法岐黃。而漫言我
鍼灸。是謂失所本而任意妄刺。未有能手到病除者。故古來若干
名醫。如扁鵲。倉公。和緩化元輩。無不以精研內經。祖述岐黃。得其
訣。而稱為絕技。後世醫道不明。鍼訣失傳。學其術者。多係下焉。中西之學圖書館所有
材。故人自為學。學各異術。父傳子。子傳孫。以訛傳訛。大失古聖之
意。此鍼道所以不明。而我國四千餘年之活人大法。遂致愈趨愈
下也。夫鍼灸賴有傳授。而得岐黃真訣者。乃為真傳授。岐黃創醫
術。而普濟蒼生。非惟行鍼取穴。未能出其範圍。即分經施藥。亦皆
賴以發明。楊繼洲鍼灸大成一書。開首引列內經刺法各篇。以為
標準。是矣。然引證無多。又少註解。學者每嫌其略。而尤病其難。蓋

岐黃為鍼家之祖。所言辨經取穴。補瀉刺法。莫詳於內經。故後世
鍼灸諸書。及以鍼術著名者。均未能別出岐黃刺法之外。岐黃為
遠師。親承其教者為近師。不讀岐黃書者。不成為上工。雖內經
書。學醫者未可遺讀一字。而擇要研求。升高自卑。舉一反三。養人
發憤。果能洞悉要旨。深通古法。則學有根據。變通在我。不背古而
又不泥古。將見由少積多。精益求精。安見岐黃鍼術。不復見於今
日哉。是為叙。

中華民國十二年二月十日山西雁門緝庵趙熙合叙

天津祥麟孫秉彝
天津郁文王秉禮

鍼灸傳真內經刺法凡例

一、岐黃為鍼家鼻祖，故本書特從靈樞素問諸篇中，選擇要言，列書首，務使學者知所遵循，不至誤入旁門。
一、鍼灸大成書首，引列內經刺法各篇，過於簡單，本書凡用，發明刺法處，無不廣為搜羅，彙集成編，或選要語，或錄全篇，務使先通古法，自可即此悟彼。

一、內經辭意深奧，最難了解，故讀者病其難而易生厭倦，本書凡於辭意深奧處，必採集前人註述，並參以三人歷年心得經驗之實，皆略為解釋，務求明白，自無害辭害意之弊。

一、難經為羽翼內經之書，難經所言刺法，不出內經範圍，故學鍼者仍宜以精研內經為目的，其他難經及各家鍼灸著述，可作參觀借助之用，不必多為摭拾，致生累贅。



一、內經所刺諸病往往散見於靈樞素問各篇中，學者非冷行熟讀，未易搜尋。本書凡於內經各篇所刺諸病，無不就中抽出，另為標題，以求醒目，自免絲亂無頭之弊。



南京中医药大学图书馆
南京中医出版社所有

鍼灸傳真內經刺法目錄卷之一

骨度 脈度

營衛生會 經別

經筋

衛氣行

營氣

骨空論

刺熱五十九俞

官鍼

小鍼解

根結

手足六經標本

氣街

經脈絡脉之隱見

本輸

脈象緩急大小滑濇

六變之刺法

榮俞治外經合治內府

六府病狀及刺法

三變

刺分陰陽

經絡之色

長刺節論

皮部論

內經刺法目錄卷之二

九鍼之圖

內經九鍼論

刺經刺絡之別

逆順

人迎寸口虛實補瀉法

瀉法 補法

調經論

五法

瀉方補員

刺法四要

解結

推而上之

引而下之

推而散之

刺奇邪在血絡之區別

共九條

行針六異

四時人氣所在

逆四時則生亂氣 調病 刺分淺深 三變 人有八虛以候其形志苦樂 陰陽虛實補瀉之先後 手病筋骨之別
刺禁 刺肥人及貪夫 刺瘦人 刺常人 刺壯士
五奪不可瀉 五逆不可刺 五禁不可刺 六經氣終不可刺
五臟氣絕不可刺 刺手足陰陽經脉多少淺深之常數
刺腰痛篇 刺瘡論 刺熱篇 刺膝痛 刺失音 刺五邪
刺目不瞑而不得卧者 刺口苦 刺五臟邪 刺寒熱病
刺齒痛 刺耳聾 辨目色 診目痛 診齶齒痛 出血針
雜病 刺欠 刺啼 刺振寒 刺噫 刺嚏 刺涕
刺太息 刺涎下 刺耳鳴 刺噏舌噏頰噏唇 慢頭痛
厥心痛

針灸傳真內經刺法卷之二

骨度

黃帝問於伯高曰。脉度言經脈之長短。何以立之。伯高曰。骨節之大小廣狹長短而脉度定矣。黃帝曰。願聞衆人之度。七尺五寸者。其骨節之大小長短各幾何。伯高曰。頭之大尺六寸。

衆人者常人也。謂上古適中之人也。適中之人頭骨亦適中。胸圍四尺五寸。腰圍四尺二寸。髮所覆者。額至項尺二寸。髮以下至頤長一尺。君子終折。

髮所覆者謂從前額額上至顰頂以至後髮際共長一尺二寸。髮以下至頤者謂從前額額之髮際以下至兩頤許長一尺。君子終折者謂君子之西部三停齊等可以始中終而三折之也。結喉以下至缺盆中長四寸。缺盆以下至鶻骨長九寸。過則肺大不滿則肺小。鶻骨以下至天樞長八寸。過則胃大不及則胃小。天



樞以下至橫骨長六寸半。過則迴腸廣長。不滿則狹短。橫滑長一寸半。橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸。內輔之上廉下至下廉長三寸半。內輔下廉下至內踝長一尺三寸。內踝以至地長三寸。膝膕以下至跗屬長一尺六寸。跗屬以下至地長三寸。故骨圍大則太過。小則不及。

膕音曷

骭音干

骭與骭不自書

誤為骨字處最多

人無骭骨者

從歧

骨際下行一寸無膕骭者心高

膕骭小短者心下

膕骭長者心

下堅

膕骭弱小以薄者心脆

膕骭直下不舉者心端正

膕骭偏

倚一方者心偏傾也

橫骨在曲骨下

膝下四寸為中極

中極下

一寸為曲骨

曲骨之分為毛際

毛際下即橫骨也

內輔者膝內

輔骨也

足面為跗

跗屬者

自內踝以前

而統之以跗

去內踝骨

不遠故膝膕以下至跗屬則長一尺六寸

跗屬以下至地僅長

一寸為曲骨曲骨之分為毛際毛際下即橫骨也內輔者膝內輔骨也足面為跗跗屬者自內踝以前而統之以跗去內踝骨不遠故膝膕以下至跗屬則長一尺六寸跗屬以下至地僅長

仰人骨度圖

頭之大骨圍二尺六寸
髮所覆者頤至頂一尺
二寸髮以下至頤一尺

耳前當耳門

小四寸九分
至結喉
故闕

目睛
至天樞

天樞至橫
骨守半

上

廉

一尺八寸

橫骨

至內

輔骨

下

踝

下

踝

上


踝

膝關以下至踝
屬反掌

手

上

踝



唇至齒長九分
廣一尺三寸
寸半齒以後至會厭深
三寸半大容五合舌重
十兩長七寸廣二寸半
咽門重十兩廣二寸半
至胃長一尺六寸見腸

仰人骨度圖

角以下至柱骨長一尺。行腋中不見者長四寸。腋以下至季脇長一尺二寸。季脇以下至髀樞長六寸。髀樞以下至膝中長一尺九

寸。膝以下至外踝長一尺六寸。外踝以下至京骨長三寸。下至地長一寸。

耳上之旁為角骨。肩脾上際會處為柱骨。肩上脇下際為膀胱。柱骨行於腋下之隱處長四寸。脇之下為季脇。撓骨之下為京骨。足太陽膀胱經穴名。在足少陰側大筋中。外踝骨以下至京骨長三寸。

側人骨度圖



耳後當完骨者廣九寸。耳後高骨耳前當耳門者廣一尺三寸。從耳後高骨相距七寸。兩顧骨相至鼻兩顧之間相去七寸。兩乳之間廣九寸半。兩乳頭相距九寸。

半兩髀之間。廣六寸半。兩髀相距六寸半長一尺二寸。廣四寸半。肩至肘長一尺七寸。肘至腕長一尺二寸半。腕至中指本寸。本節至其末長四寸半。

頭髮以下至背骨長二寸半。背骨以下至尾骶二十一節。上節長一寸四分之一。奇分在下。故上七節至於背骨九


分分之七。

臂骨以下至尾骶共二十一節計長三尺一寸四分一厘。臂骨以上計有七節乃項髮以下至臂骨之數也。每節長一寸四分一厘則七得七寸四分七厘。又每節一厘共計九寸八分七厘故曰九寸八分共九寸七分之七寸八分也。其數也。



所有

伏人骨度圖



此衆人骨之度也。所以立經脈之長短也。是故視其經脈之在於身也。其見浮而堅。其見明而大者多血。細而沈者多氣也。
即骨度可以定脈度之長短。而並言視經脈血氣之法。脉浮而望明而大者多血。脉細而沈者多氣。
古骨度與今不同。古尺寸亦與今不同。即今人之骨度。而大小肥瘦。又各不同。未可一例而論也。然有此骨度一篇。則大小肥瘦。正可比較而得也。聖人之垂教。遠矣。

脉度

脉脈同

黃帝曰。願聞脉度。岐伯答曰。手之六陽。從手走頭。長五尺。五尺二丈。手之六陰。從手至胸中。三尺五寸。三六一丈八尺。五六三尺二丈一尺。足之六陽。從足上至頭。八尺。六尺二丈八尺。足之二丈八尺從足至胸中。六尺五寸。六尺三丈六尺。五六三尺合三丈九尺。足之三丈九尺脉從足至目。七尺五寸。二尺一丈四尺。二五一尺合一丈五尺。督脈任脈。各四尺五寸。二尺八尺。二五一尺合九尺。凡都合一十六丈二尺。此氣之大經隧也。

手止有三陽。而今曰六陽者。以左右手各有三陽也。故謂之六陽。下文稱手之六陰。及足之六陽。六陰皆倣此。蹻脉有陽蹻。有陰蹻。陽蹻自足申脉行於目。陰蹻自足照海行於目。左右相同。是蹻脉有四。今止曰二。一大四尺。二五一尺。何也。蓋蹻脉雖



有四而男子數其陽女子數其陰。男子以左右陽蹻為經、陰蹻為絡。女子以左右陰蹻為經、陽蹻為絡。經脈為裡。支而橫者為絡。絡之別者為孫。盛而血者疾誅之。盛者瀉之。虛者飲藥以補之。

經脈隱於內裏。其浮而見於皮部者皆絡脈也。故曰經脈為裡。五藏常內閥於上七竅也。故肺氣通於鼻。肺和則鼻能知香臭矣。心氣通於舌。心和則舌能知五味矣。肝氣通於目。肝和則目能辨五色矣。脾氣通於口。脾和則口能知五穀矣。腎氣通於耳。腎和則耳能聞五音矣。五藏不和。則七竅不通。六府不和。則留為癰。故邪在府。則陽脉不和。陽脉不和。則氣留之。氣留之。則陽氣盛矣。陽氣太盛。則陰脉不利。陰脉不利。則血留之。血留之。則陰氣盛矣。陰氣太盛。則陽氣不能榮也。故曰闔。陽氣太盛。則陰氣弗能榮也。故曰



格。陰陽氣盛。不得相榮。故曰闕格。闕格者。不得盡期而死也。
黃帝曰。蹻脉安起安止。何氣榮水。岐伯答曰。蹻脉者。少陰之別。
於然谷之後。內踝之上。直上循陰股入陰。上循胸裏。入缺盆。上
人迎之前。入頤。屬目內眞。合於太陽陽蹻而上行。氣并相還。則
濡目。氣不榮。則目不合。藏臟同

帝問蹻脉起止。伯止答以陰蹻。而未言及陽蹻者。言陰蹻則陽
蹻可知矣。頤音仇。目下也。

黃帝曰。氣獨行五藏。不榮六府。何也。岐伯答曰。氣之不得無行也。
如水之流。如日月之行不休。故陰脉榮其藏。陽脉榮其府。如環之
無端。莫知其紀。終而復始。其流溢之氣。內溉五藏。外濡腠理。

陰脈者。如手足六陰經之脉也。陽脈者。如手足六陽經之脉也。
陰出之陽。如肺經行於大腸。陽入之陰。如胃經行於脾經。流行

卷五
五
黃帝曰。蹻脉有陰陽。何脉當其數。岐伯答曰。男子數其陽。女子數其陰。當數者為經。不當數者為絡也。

男子以陽蹻為經。陰蹻為絡。女子以陰蹻為經。陽蹻為絡。故曰。男子數其陽。女子數其陰。氣榮者為經。氣不榮者為絡。男女蹻脈經絡之異。有如此。

營衛生會 营榮古通用

黃帝問於岐伯曰。人焉受氣。陰陽焉會。何氣為榮。何氣為衛。榮安從生。衛於焉會。老壯不同氣。陰陽異位。願聞其會。岐伯答曰。人受氣於穀。穀入於胃。以傳於肺。五藏六府。皆以受氣。其清者為榮。濁者為衛。榮在脉中。衛在脉外。榮周不休。五十而復大會。陰陽相貫。如環無端。衛氣行於陰二十五度。行於陽二十五度。分為晝夜。故

