

丹溪先生心法卷五

新安吳勉學

校

癰疽八十五

○癰疽只是熱勝血 六陽經六陰經有多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久未合必成死症遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵 陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱瀋陽滯以寒治之陰滯以

熱治之 人中年以後不可生癰纔有痛腫參之脉
証但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅
熱拔毒紓氣之藥虛虛之禍如指諸掌 內托之法
河間治腫焮于外根盤不深形証在表其脉多浮病
在皮肉非氣盛則必侵於內急須內托以救其裏宜
復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料
飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱
已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能
內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於此
小瘡與冬月時令即可若潰瘍於夏月用之其桂杜

之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難爲倚杖
一婦年七十形實性急而好酒腦生疽纔五日脉緊
急且瀉急用大黃酒煨細切酒拌炒爲末又酒拌人
參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身
汗睡覺病已失此內托之意 又一男子年五十形
實色黑背生紅腫及胛骨下痛其脉浮數而洪緊食
亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附瓜蒌子
甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此
正內托之法非精要內托散乳香菴豆等藥想此方
專爲服丹石而發疽者設不因丹石而發恐非必用

之劑 瘡先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故其痛多
少瘡之始作時也膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而
反痛者此爲虛宜補亦有穢氣所觸宜和鮮風寒逼
者宜溫散

○腸癰 大腸有痰積死血流注 桃仁承氣湯加

連翹秦艽近肛門破入風者難治防風之類

○乳癰 乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母

不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰
之氣不行故竅不得通而汁不得出陽明之血沸騰
故熱甚而化膿亦有所乳之子隔有滯痰口氣穢熱

含乳而腫熱氣所次遂生結核於初起時便須忍痛
揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治必成癰癤
治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行
汗濁之血以生甘草之節消腫導毒以瓜蒌子或加
沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或散或加減
隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於
腫處其効尤捷不可輒用針刀必至危困若不得於
夫不得於舅姑憂怒鬱悶昕夕積累脾氣消阻肝氣
橫逆遂成隱核如大棋子不痛不痒數十年後方爲
瘡陷名曰妳岩以其瘡形嵌凹似岩穴也不可治矣

若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

乳癰方

青皮

瓜蒌

橘葉

連翹

桃仁

皂角刺

甘草節

破多加參芪

右以水煎入酒服

乳癰妳勞癰腫

石膏

煨

樺皮

煨

瓜蒌子

甘草節

青皮

右以水煎服

治乳有核

南星

貝母

甘草節

瓜蒌

各一兩

連翹

半兩

右以水煎入酒服

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮

連翹

瓜蒌

白芍

甘草節

乳岩小破加柴胡川芎

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥

一錢

甘草

三錢

當歸

三錢

右作一服水煎入酒少許熱飲

吹妳

金銀花

大蕎麥

紫葛藤

等分

右以醋煎洗患處立消如無下二物只金銀花亦

可

乳栗礮

少有破必大補

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

連翹

白芍

甘草節

右以水煎服

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破當
養血初腿腫以人參黃連茯苓各二錢瓜蒌子四
十八粒作二貼入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮佐黃柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月
加條子芩體虛者加牛膝以生甘草爲使大料煎
入姜汁帶辣食前飲之病深者恐木栢桂枝十數
貼發不動加少麻黃二三貼又不動恐癰將成矣
急掘地坑以火煨紅沃以小便赤體坐其上以被
席圍抱下截使熱氣重蒸腠理開氣血暢而愈

鉄圍散 治癰疽腫毒

乳香

沒藥 半兩

大黃

黃柏

黃連

南星

半夏

防風

皂角刺

木鱉子

瓜蒌

甘草節

草烏

阿膠

右爲末醋調成膏砂石器內火熬黑色鵝翎傳之

圍藥 諸般癰疽傳上消散

乳香

沒藥

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃柏

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌

阿膠

皂角刺

右研爲細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒

用

圍藥鉄井欄

貝母

南星各七錢

連翹

五倍子

經霜芙蓉葉

各一兩

右碾爲細末用水調傳四向腫處止留中間一竅

出毒氣

隔皮取膿法

馬蹄

細切一兩

蕎麥麴

一兩

白塩

半兩

草烏

四錢去皮

右爲末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末
醋調成膏用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫
自退

騎馬癰

用大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙
水盡爲末入皂角炭少許作四服湯調頓服效
又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用
敷疽癰方

草烏

黃連

紫荊皮

白芷

大黃

芙蓉皮

朴硝

粳米

各等分

右爲末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雄黃末圍定瘡
穴大小前後敷前藥末

一人肛門生癰久不收口有針竅三孔勞力則有膿

黃芪

條芩

連翹

秦艽

右爲末神麴糊爲丸

取朽骨久疽及痔漏者有之

取烏骨雞脰骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火
煨通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸
如粟大以帛撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸

人參仁

錢代補石

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌

桃仁

草龍膽

右咬咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方

白殭蚕槐花爲末酒調服一方加酒大黃

附方

消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂角刺 金銀花 防風 當歸

大黃 甘草節 瓜蒌仁 等分

右咬咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮

立効

機要內托復煎散 癰疽托裏健胃

地骨皮 黃芩 茯苓 白芍

人參 黃芪 白朮 桂

甘草 防已 當歸 各一兩 防風 三兩

右咬咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入

前十二味再煎至三四盞取清汁分三四次終
日飲之又煎蒼朮粗爲湯去粗依前又煎前十
二味粗分飲之

內踈黃連湯 治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便閉脉
洪實者

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草

各一兩連翹

大黃

二兩

右咬咀每服一兩入姜煎

疔瘰八十六

○疔癰用針刀鏃破頭上以蟾酥敷之後用菜豆野菊莎末酒調飲醉睡覺卽定痛熱除不必去疔自愈也 治一切疔瘡用紫梗菊花根莖葉皆可研碎取汁滴口中飲之○瘰癧 血氣痰熱 以牡礪煨過爲末玄參搗膏爲丸○桑椹黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者晒乾爲末湯調服○師云大田螺連肉燒灰存性爲末入麝香少許濕則乾敷乾則油調敷 夏枯草大能散結氣而有補養血脉之功能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効