

加批
詳評
景岳全書

卷三十九

人集婦人下

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨眉庵訂

產育類

(三) 滑胎

妊娠滑胎之法。惟欲其坐草之期。易而且速。而難易之由。則在血之盈虛。不在藥之滑利。蓋血多則潤。而產必易。血虧則澀。而產必難。故於未產之前。但宜以培養氣血為主。而預為之地。如四物湯。滑胎煎。五福飲。小營煎。八珍湯之類。即皆滑胎之要藥。（案）胎不必滑。養血補藥。反能凝滯。胃口不快。飲食不進。矣。惟以飲食調之。戒七情為要。若不知此。而過用滑利等物。或產期未近。無火無滯。而妄用清火行滯。沉降若寒等藥。必皆暗耗榮氣。走泄真陰。多致血虧氣陷。反為臨期大害。若果肥盛氣實者。則紫蘇飲。保生無憂散。滑胎枳殼散之類。皆可擇用。

(三) 催生

凡妊娠胎元完足。彌月而產。熟落有期。非可催也。所謂催生者。亦不過助其氣血而利導之耳。直待臨期。乃可用脫花煎。或滑胎煎。隨證加減主之。或經日久。產母困倦難生。俱宜服滑胎煎。以助其氣血。令兒速生。其有氣虛無力。艱於傳送者。必用獨參湯。隨多隨少。接濟其力。皆為催



加批
詳評
景岳全書

卷三十九

人集婦人下

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂大士評
古吳江家楨應庵訂

產育類

(三) 滑胎

妊娠滑胎之法。惟欲其坐草之期。易而且速。而難易之由。則在血之盈虛。不在藥之滑利。蓋血多則潤。而產必易。血虧則澀。而產必難。故於未產之前。但宜以培養氣血為主。而預為之地。如四物湯。滑胎煎。五福飲。小營煎。八珍湯之類。即皆滑胎之要藥。葉氏謂胎不必滑。養血補藥。反能凝滯胃口。不快飲食。不進矣。惟以飲食調。若不知此。而過用滑利等物。或產期未近。無火無滯。而妄用清火。行滯。沉降。若之戒。七情為要。寒等藥。必皆暗殘榮氣。走泄真陰。多致血虧氣陷。反為臨期大害。若果肥盛氣實者。則紫蘇飲。保生無憂散。滑胎枳壳散之類。皆可擇用。

(三) 催生

凡妊娠胎元完足。彌月而產。熟落有期。非可催也。所謂催生者。亦不過助其氣血而利導之耳。直待臨期。乃可用朮花煎。或滑胎煎。隨證加減主之。或經日久。產母困倦難生。俱宜服滑胎煎。以助其氣血。令兒速生。其有氣虛無力。艱於傳送者。必用獨參湯。隨多隨少。接濟其力。皆為催



生要法。若期未至。而妄用行氣奪血等劑。以為催生。亦是獨摘方苞之粵。握宋人之苗耳。
一臨盆將產。腹痛已甚。凡催生之藥。無如脫花煎。少用肉桂五七分。為最穩最妙。若氣虛無力者。加人參二三錢。虛甚者任意用之。（醫人參亦不必用。常見貧窮勞苦之婦。易產而無病。所以不必用藥。）○女科書惟女科經綸最好。有論無方。
不執。○一催生若水血下多。子道乾澀難出者。宜用滑利之物。如猪脂油。蜜酥油。葱白。葵子。乳滑石。榆白皮之類。以潤之。亦濟急之法也。

滑胎催生論外方

達生散婦四 生化湯婦四

加味川芎湯婦四

良方當歸湯婦五 滑胎催生

經驗滑胎散

胎乾難產 佛手散婦四

（音） 穩婆

產婦臨盆。必須聽其自然。不宜催逼。要先安其神志。勿使驚慌。直待花熟蒂圓。自當落矣。所以凡用穩婆。必先擇老成忠愿者。預先囑之。及至臨盆。務令從容鎮靜。不得用法催逼。余嘗見有穩婆。忙冗性急者。恐顧此失彼。因而免強試湯分之搖之。逼之使下。多致頭身未順。而手足先出。或橫或倒。為害不小。若未有緊陣。不可令其動手。切記切記。又或有生息不順。及雙胎未下之類。但宜穩密安慰。不可使產母聞知。恐驚則氣散。愈難生育。又嘗見有奸詭之婦。故為呼訝之聲。或輕事重報。以顯己能。以圖酬謝。因致驚疑產婦。為害尤非細故。極當慎也。
立齋醫按。載一穩婆云。止有一女。於分娩時。適當巡街御侍行牌。取我視其內室分娩。女為此

驚赫未產而死。後見侍御。更以威顏吩咐。迨視產母。胎雖順而頭偏在一邊。此時若以手入。推正。可保順生。因畏其威。不敢施手。但回稟云。此是天生天化。非人力所能。因是子母俱不能救。由此觀之。可見產時當用靜鎮。自然有一毫驚恐疑畏。切不可使混於其間者。

(三) 產要

凡孕婦臨月。忽然腹痛。或作或止。或一二日。或三五日。胎水少來。但腹痛不密者。名曰吳胎。非當產也。又有一月前。或半月前。忽然腹痛。如欲產而不產者。名曰試月。亦非產也。凡此腹痛。無論胎水來與不來。俱不妨事。但當寬心待時可也。若果欲生。則痛極連腰。乃將產也。蓋腎係於腰。胞係於腎故耳。又試揣產母手中指。本節跳動。即當產也。此時兜逼產門。穀道挺進。水血俱下。方可坐草試湯。瓜熟蒂落。此乃正產之候也。

一產婦腹痛未甚。且須寬心行動。以便兜身舒轉。如腰腹甚痛。有產之兆。即當正身仰臥。或起坐舒伸。務宜安靜從容。待兜轉身向下。其產必順。而且最易。不宜預為驚擾。入手以致產婦氣怯。胞破漿乾。使兜轉身不易。則必有難產之患。○一產婦初覺欲生。便宜惜力調養。不可用力妄施。恐致臨產之力。若兜方轉身而用力太早。則多致橫逆。須待順而臨門。一逼自下。若時候未到。用力徒然。○一臨產房中。不宜多人。喧嚷驚慌。宜閉戶靜以待生。○一將產時。宜食稠軟白粥。勿令飢渴。以乏氣力。亦不宜食硬冷難化之物。恐產時乏力。以致脾虛不能消化。則產後有傷食之病。○一產婦產室。當使溫涼得宜。若產在春夏。宜避陽邪風是也。產在秋冬。宜避陰

邪寒是也。故於盛暑之時。亦不可當風取涼。以犯外邪。又不宜熱甚。致令產母頭疼面赤。亦不宜人眾。若熱氣薰蒸。亦致前患。其或有熱極煩渴。而血暈血溢者。亦可少與涼水。暫以解之。然亦不可多用。若冬末春初。餘寒尚盛。產室不可無火。務令下體和暖。衣被亦當溫厚。庶不為寒氣所侵。可免胎寒血滯難產之患。且產後胎元既落。氣血俱去。乘虛感邪。此時極易致不可不慎。○一凡富貴之家。過於安逸者。每多氣血壅滯。常致胎元不能轉動。此於未產之前。亦須常為運動。庶使血氣流暢。胎易轉側。產亦易矣。葉氏富貴之家。每為是所當預為留意者。○一人參所誤。因氣滯也。是所當預為留意者。○一妊娠將產。不可占卜問神。如巫覡之徒。哄嚇謀利。妄言凶險。禱神祈保。產婦聞之。致生疑懼。憂慮則氣結滯而不順。多致難產。所宜戒也。○一產時胞漿未下。但只穩守無妨。若胞漿破後。一二時辰不生。即服催生等藥。如脫花煎。滑胎煎。或益母丸之類。益漿乃養兒之生。漿乾不產。必其胎元無力。愈遲則愈乾。力必愈乏。所以速宜催之。○一產婦與酒不可多而致醉。凡產前醉則乏力。而四肢不用。產後酒多。恐引入血分。四肢致後日有動。血及四肢無力。髓骨痠痛之患也。

(六) 六逆產

一橫生者。以兒方轉身。產母用力逼之太早。故致兒身未順。而先露手臂。但令母安然仰臥。穩婆以手徐推兒臂。下體令其正直。復以中指摸其肩。弗使臍帶扳係。即生。○二倒生者。因兒未及轉身。產母努力。故致兒先露足。令母正臥。以手徐推足入。良久。仍推兒身。徐俟轉正。近門即生。

葉批胞

水破而不
產未可便
為難產如
水來而血
亦來方為
難產然必
以腰痛為

○三偏生者。因兒未順生路。產母努力。逼兒頭偏一邊。雖然露頂。實額角也。亦照前法推正。即生。若兒頂後骨偏柱穀道旁。以手從外後旁輕輕托正。即生。○四礙產者。兒身雖順。門路雖正。但不能下。乃因胎轉時。臍帶絆肩而然。令產母仰臥。以手輕推兒向上。乃用中指按兩肩理順。臍帶。即生。○五坐產者。因兒將產。其母疲倦。久坐椅褥。抵其生路。而然。須用手巾一條。拴係高處。令產母以手足扳之。輕輕屈足舒伸。以開生路。兒即順生。○六盤腸產者。臨產。母腸先出。子產而腸未收。故曰盤腸產。古法以醋水各半盞。煎熱。嚙產母面背。則收。一法以草麻子四十粒。研爛。塗母頭頂。待腸收上。急洗去。俗以水嚙面背。驚之。而腸亦收。但恐驚則氣散。反致他疾。戒之。○一方。治橫逆難產。令產母仰臥。以小針刺兒手腳心三五次。用鹽擦之。手腳即縮上。轉身即生。○一方。治盤腸產。以半夏為末。用少許搐鼻中。則腸自上。○又方。用大紙燃以麻油潤。滲。點著吹滅。以烟薰產婦鼻中。腸即上。○又方。腸出盛以潔淨漆器。濃煎黃芪湯浸之。腸即上。

(三) 胞破難產

凡產婦胎未順。而胞先破者。其因有二。蓋一有母質薄弱。胞衣不固。因而轉動。隨觸而破者。此氣血之虛也。一有兒身未轉。坐草太早。用力太過。而胞先破者。此舉動之傷也。而胞破已久。若水血乾。產路澀。則兒難下。宜急用大料四物湯。或五物煎。脫花煎。滑胎煎。五福飲。當歸湯之類。助其氣血。并濃煎葱湯。薰洗產戶。使其暖而氣達。則自當順下。若持久力乏。血已耗固。則危甚矣。當用八珍湯料一斤。益母草四兩。水數碗。煎熟。不時飲之。亦有得生者。或以黃芪芎歸數斤。

正產者無腹痛腰痛而竟有水來此胞外之水不必驚惶聽其自然有停數日而產者亦無難意此余所歷過昔劉翔千夫人曾有此即有血水併來而難產者亦不必服藥安心靜養切勿驚惶以駭產婦亦

以大養煎藥氣血滿室使產母口鼻俱受其氣亦良法也○大抵產難之證多患於鬱悶安胎富貴之家治法雖云胎前清氣產後補血然不可拘泥若胃脾不健氣血不充必當預為調補不然臨產必多患難

一產難經日不下別無危證者宜用脫花煎催之極妥極妙○一醫宿客店治店婦臨產數日不生下體俱冷用藥甚窘令取椒橙葉菜莢共煎湯一盆令產婦以小凳坐盆內薰洗良久小腹皆暖氣溫血行遂產○一方以紫蘇煎湯薰洗大抵遇嚴寒時月產久傷冷氣血必凝此重洗之法亦要法也外以淋湯內以羊肉湯必效○一方令產婦以自己髮梢含於口內令其安心作嘔即下亦治胞衣不出

(三) 胞衣不出

胞衣不出有以氣血疲弱不能轉送而停閣不出者其證但見無力而別無痛脹治當補氣助血宜速用決津煎或滑胎煎保生無憂散局方黑神散之類主之○有以惡露流入胞中脹滯不出者蓋既脫胞帶必下墜故胞在腹中形如仰葉仰則盛聚血水而脹碍難出惟老成穩婆多有識者但以手指頂其胞底以使血散或以指摸上口扳開一角使惡露傾瀉則腹空自落矣○又一法以本婦頭髮攪入喉中使之作嘔則氣升血散腹軟亦自落矣法最妙凡胎胞不出者多死授以此法甚效○若血滲胞中停蓄既久而為脹為痛或喘或急則非逐血破血不可也宜速用奪命丹或用失笑散以熱酒調服使血散脹消其衣自下若氣血兼虛者亦

不必用力
竟說產時
未到以安
其心有遲
四五日而
產者余亦
歷過多婦

惟決津為善。○一方用單麻子仁一兩。碾爛貼母右足心。衣下。速洗去。穢則腸易出。如腸不收。即以此膏塗腦頂。則腸自入。○一方用紅花一兩。酒煮汁服。○一法用產婦鞋底。去熟熨小腹。上下即出。○一方用兒角刺燒為末。每服一錢。溫酒調服。

胞衣論外方

牛膝散

婦四九
胎衣不下腹脹

(元) 氣脫血暈

產時胎胞既下。氣血俱去。忽爾眼黑頭眩。神昏口噤。昏不知人。古人多云。惡露乘虛上攻。故致血暈。不知此證有二。曰血暈。曰氣脫也。若以氣脫作血暈。而用辛香逐血化痰等劑。則立刻斃矣。葉氏謂當歸補血湯亦可。如有汗黃芪建中湯亦妙。此血脫益氣之法也。不可不慎也。○一氣脫證。產時血既大行。則血去氣微之甚。是即氣脫證也。速用人參一二兩。急煎濃湯。徐徐灌之。但得下咽。即可救活。若少遲延。則無及矣。余嘗救此數人。無不隨手而愈。此最要法也。又嘗見有藥參而斃者。云新產後不可用參。用參則補住惡血。必致為害。即勸之亦不肯用。直待斃而後悔者。亦數人矣。又有云。產後必過七日。方可用參。此等愚昧訛傳。不知始自何人。誤人不淺。萬萬不可信也。○一血暈之證。本由氣虛。所以一時昏暈。然血壅痰盛者。亦或有之。如果形氣脈氣俱有餘。胸腹脹痛上衝。此血逆證也。宜失笑散。若痰盛氣粗。宜二陳湯。如無脹痛氣粗之類。悉屬氣虛。宜大劑芍歸湯。八



珍湯之類主之。

紫評氣虛非考歸所能治即血脫亦當補氣氣為衛外衛固營血自生。

○一卒時昏暈。藥有未及。宜燒秤錘令赤。用器盛至床前。以醋沃之。或以醋塗口鼻。令鼻聞酸氣。收神即醒。或以破舊漆器。或用乾漆燒烟薰之。使鼻受其氣。皆可。但此法雖輕。而暴暈者所宜。若氣虛之甚。而昏厥者。非用大補之劑。終無益也。

(早)

兒初生

初誕法詳小兒門

凡嬰兒初生。當隨手包裹。切不可為風寒所侵。蓋兒在腹中。遮護最密。及其初脫胎。肌膚嫩極。易感邪。若在夏令。自無所慮。但覺稍寒。即須慎之。嘗見兒生未久。多有驚風發熱抽搐等病者。率由乎此。○一。小兒初生。天氣微涼。即大忌洗沐。恐腠理不密。元氣發泄。而外邪乘之也。○凡產母分娩艱難。勞傷胎氣。多有兒雖脫胞。而乏力垂危。或已死者。切不可便斷臍帶。當急用大紙蘸醪香油。於臍帶上往來燒斷之。取其陽氣以續胎元。俄頃兒得啼聲。即已活矣。且可免胃寒泄瀉之病。凡見此者。若以刀斷臍帶。則子母皆多難保。此出立齋醫按。○一。凡燒臍帶之法。惟素多陽虛。及產時氣脫者。最宜用之。以助陽氣。若母氣陽強。或兒聲洪亮者。皆不宜用。恐火從臍入。日後致生熱毒。則反為害不小。

(四)

子死腹中

凡子死腹中者。多以觸傷。或犯禁忌。或以胎氣薄弱。不成而殞。或以胞破血乾。持久困敗。但察產母腹脹舌黑者。其子已死。若非產期。而覺腹中陰冷重墜。或為嘔惡。或穢氣上衝。而舌見青

黑者皆子死之證。宜連用下死胎方下之。下後察其盛實。隨加調補自愈。若唇舌面赤俱青。則母子皆危之兆也。

補遺方 治胎死腹中。用紅花以酒煮汁。飲二三碗即下。

新法下胎方 用當歸二兩。厚朴三錢。陳皮二錢。入酒水各一碗。煎至一碗。加朴硝三五錢。再煎十餘沸。去滓熱服。死胎自下。○或止用脫花煎更妙。葉詳末必妙

死胎論外方

回生丹 婦六

下死胎方 婦五

桂香散 婦五

琥珀丸 婦一三四

(四) 產門不開不閉子宮不收

交骨不開。產門不開。無非陰氣不足。陰不足則氣不達。所以不開。不開則產必艱難。宜加味芍歸湯補而開之。大有奇效。或十全大補湯亦可。

產門不開。由陰氣大虛。不能收攝。或由陰火下流而然。故或為陰挺突出。或為腫脹。或為淋瀝不禁。○若氣血俱虛者。宜十全大補湯。加五味子補而斂之。○或痛而覺熱者。宜加味道遙散。

○若憂思傷脾血熱者。加味歸脾湯。葉詳血熱者宜加涼血清火非竟用歸脾

○若暴怒傷肝動火。龍胆瀉肝湯。子宮不收而外墜者。宜補中益氣湯。加醋炒芍藥。飲而舉之。或外以黃芪煎湯薰洗亦妙。或以

硫黃散敷之。○一方 治產後子宮不斂。用荊芥藿香椿根白皮煎湯薰神效。○一方 產後子

腸不收。外用枳壳訶子五倍子白礬煎湯薰洗。若不收。再灸頂心百會穴數壯。即收上。○一方



子宮脫出。用萆麻仁二十四個。研爛塗頂心。入即洗去。○一方。治產後陰脫。用絹袋盛炒熟蛇床子。熨之。亦治陰痛。○又法用蛇床子五兩。烏梅十四個。煎水日洗五六次。

(三) 小產

小產之證。有輕重。有遠近。有稟賦。有人事。由稟賦者。多以虛弱。由人事者。多以損傷。凡產者。出於熟落之自然。小產者。由於損折之勉強。此小產之所以不可忽也。若其年力已衰。產育已多。欲其再振且固。自所難能。凡見此者。但得保其母氣。則為善矣。若少年不慎。以致小產。此則最宜調理。否則下次臨期。仍然復墜。以至二次三次。終難子嗣。係不小矣。凡此安之之法。見前數墜胎條中。既產調理之法。亦與大產相似。詳後產後條中。俱當按而用之。

一凡婦人年及中衰。胎元無力。則常有胎不能長。及多小產昏暈之患。此氣血衰敗而然。血氣既衰。則凡於小產之後。多有胎既落而復有下墜。如更有一胎欲產者。此非產也。乃因氣虛而胞宮隨胎下陷也。產母不知。必至驚慌。此無足慮。但以壽脾煎。或八珍。十全大補。芎歸補中湯之類主之。則自安矣。○又凡小產有遠近。其在二月三月為之近。五月六月為之遠。新受而產者。其勢輕。懷久而產者。其勢重。此皆人之所知也。至若猶有近者。則隨孕隨產矣。凡今艱嗣之家。犯此者。十居五六。其為故也。總由縱欲而然。第自來人所不知。人所不信。茲謹以筆代燈。用指迷者。倘濟後人。實深願也。請詳言之。蓋胎元始肇。一月如珠露。二月如桃花。三月四月而後。血脈形體具。五月六月而後。筋骨毛髮生。方其初受。亦不過一滴之玄津耳。此其橐籥正無依。

根莖尚無地。鞏之則固。決之則流。故凡受胎之後。極宜節慾。以防泛溢。而少年縱情。罔知忌憚。雖胎固。慾輕者。保全亦多。其兼人之勇者。或恃強而不敗。或既敗而復戰。當此時也。主方欲靜。客不肯休。無奈狂徒。敲門撞戶。顧彼水性熱腸。有不啟扉而從隨流而逝者乎。斯時也。落花與粉蝶齊飛。火棗共交梨並逸。合污同流。已莫知其昨日孕而今日產矣。胡日孕而望日產矣。隨孕隨產。本無形迹。蓋明產者。胎已成形。小產者。必覺暗產者。胎仍似水。直溜何知。故凡今之術院家。多無大產。以小產之多也。娶娼妓者。多少子息。以其子宮滑而慣於小產也。今常見艱難求方者。問其陽事。則曰能戰。問其功夫。則曰儘通。問其意況。則怨嘆曰。人皆有子。我獨無。亦豈知人之明產。而爾之暗產耶。此外如受胎三月五月。而每有墜者。雖衰薄之婦。常有之。然必有縱慾不節。致傷母氣而墜者。為尤多也。故而凡恃強過勇者。多無子。以強弱之自相殘也。縱慾不節者。多不育。以盜損胎元之氣也。豈悉由婦人之罪哉。欲求我方者。當以此篇先讀之。則傳方之思。已過半矣。

小產論外方

人參黃芪湯

婦四八
小產氣虛血不止

當歸川芎湯

婦四三
小產瘀血痛

毀胞煎

新因十
小產後腹痛

下胎斷產

下胎斷產。本非仁者之事。然有婦人臨產艱危。或病甚不勝產育者。則下胎斷產之法。有不得已。亦不可廢者也。至若水銀。蠹蟲。水蛭。斑蝥。之屬。不惟傷胎。且傷母矣。
葉評絕胎莫如用者。不
用滋精藥丸服

可造次

下胎方

千金去胎方婦六

下胎小品方婦五

扶羸小品方婦五

廣濟下胎方婦五

良方桂心散婦五

一方 不拘生胎死胎。用蓖麻仁二個。巴豆一個。麝香一分。研末貼臍中。并足心。即下。
粒溫酒吞下。又方 下生胎。用蓖麻子一個。

斷產方

斷產小品方婦六

千金斷產方婦六

丹溪斷子法婦六

斷產灸法婦六

(四) 產育類論列總方

四物湯補八

八珍湯補十

十全大補湯補二

五福飲新補六

五物煎新因三

補中益氣

湯補三

當歸湯婦五

小營煎新補十五

羊肉湯婦七

保生無憂散婦四

脫花煎新因十一

壽脾煎新熟十六

加味逍遙散補九

決津煎新因二

滑胎煎新因九

益母丸婦六

加味歸脾

湯補三

紫蘇飲婦二

奪命丹婦五

滑胎枳殼散婦二

加味芳歸湯婦四

失笑散婦百

芳歸湯婦四

芳歸補中湯婦六

疏黃湯婦三二

龍胆瀉肝湯寒六

局方黑神散婦十

產後類

(四)

論產後當大補氣血



產後病治。嘗見丹溪云。產後當大補氣血。即有雜證。以未治之。一切病多是血虛。皆不可發表。此其意謂血氣隨胎而去。必屬大虛。故無論諸證。皆當以大補為先。其他皆屬奇緩。余於初年。誠然佩服。及執而用之。則每為所困。葉氏景岳看書尚未詳細。丹溪云。產後氣血大虛。雖有因產後氣血大虛。雖有他症。以未着治之。非謂不治他症。竟講大補血虛發表。猶恐重云。津液故忌之。局方發揮云。初產之婦。好血未必虧。汚血未必積。臟腑未必寒。何以藥為。飲食起居。加調護。何病之有。或有他病。當求病起。何因。因病在何經。氣病治氣。血病治血。寒者溫之。熱者清之。之疑者。行之。虛者補之。血多者止之。觀其用藥。治病之圓活。絕無執法。景岳議大補氣血。將丹溪局方發揮之言。辨之。經者數次。始悟其言雖有理。而未免言之過也。即今產科所錄。無非此法。余目睹其誤。及親為解救者。益不少矣。故敢剖析於後。實有所見。不得不言。非存心自銜。故毀先賢。若然。則徒為笑罵之招耳。竇雖至愚。必不為也。觀者其深察此意也。

凡產後氣血俱去。誠多虛證。然有虛者。有不虛者。有全實者。凡此三者。但當隨證隨人。辨其虛實。以常法治療。不得執有成心。概行大補。以致助邪。此辨之不可不真也。

一產後虛證。無非隨人元氣。必素弱之人多有之。或於產後。血氣俱去。而更弱者亦有之。此當因人察脈。因脈察證。若脈氣形氣病氣俱不足。此當以全虛治之。若形氣不足。病氣有餘。或兼火外兩邪。或以飲食停滯。是亦虛中有實。不得不詳審而治之。此中委曲。未能盡言。惟明者悟之。一產後不虛證。蓋或其素日無病。或以當年少時。或以素耐辛苦。貧勞之質。此輩本無不足。及其一旦受孕。乃於無病腹中。參入此物。故致血氣壅塞。為脹為嘔。是皆添設有餘之病。及其既產。始見通快。所留得去。仍復故吾。常人之產。此類極多。果何虛之有。然或以內傷。或以外感。產

後之病難保必無。倘有所犯去之即愈。若概行大補。果能堪否。即臨盆去血氣。未免暫見耗損。然以壅滯之餘去者。不過皆護胎隨從之物。生者旋生。不出數日。必以來復。此生化自然之理。何至是產皆虛也。凡治此類。但當因證用治。若執云產後必當大補氣血。則實實之病。必所不免。而輕者必甚。甚者必危矣。由此觀之。則立言者固不易。而用言者又豈易哉。一產後全實證。有如外感風寒。頭痛身熱。便實中滿。脈緊數洪。有力此表邪之實證也。○又火之盛者。必熱渴躁煩。或便結腹脹。口鼻舌焦。黑酷喜冷飲。眼眦尿管痛赤。脈見洪滑。此內熱之實證也。○又鬱怒動肝。胸脇脹痛。大便不利。脈弦而滑。此氣逆之證也。○又惡露未盡。瘀血上衝。心腹脹滿。癥痛拒按。大便難而小便利。此血逆之實證也。○又凡富貴之家。保護太過。或過用人參芪朮。以致氣壅。或用糖酒炭火。以致內熱。或產本不虛。而妄用大補之藥。以致增病。此調攝之實證也。○又或因產過食。恐其勞困。固令勉強。以致停蓄不散。此內傷之實證也。○以上諸證。姑舉要者。以見大概。然既有表邪。則不得不解。既有火邪。則不得不清。既有內傷停滯。則不得不開通消導。且人有強弱。產有虛實。病有真假。治有逆從。固不可以同日語也。觀六元正紀大論曰。婦人重身毒之何如。曰。有故無殞。亦無殞也。此自經常不易之大法。亦何用贅辨之。若此。第因丹溪之言。人多偏執。故不得不詳盡其說。以解後人之惑也。詳評局方發揮諸虛實治法。詳具後條。

(四) 論產後三禁

觀病機機要云。治胎產之病。當從厥陰證論之。宜無犯胃氣。及上下二焦。是為三禁。謂不可下。不可利。小便。葉註因產後氣血俱虛故有三禁發其汗。則同傷寒下早之證。利大便。則脈數而傷脾。利小便。則內無津液。胃中枯燥。但使不犯三禁。則榮衛自和。而寒熱自止矣。凡用治之法。如發渴。則白虎氣弱。則黃芪血痛。則當歸腹痛。則芍藥。大抵產病天行。從加減柴胡。雜證從增損四物。宜察脈證而用之。詳此說。雖為產育之大法。然病變不同。倘有是證。則不得不用是藥。所謂有病則病受之也。第此經常之法。固不可不知。而應變之權。亦不可執一也。

（四）產後腹痛

產後腹痛。最當辨察虛實。血有留瘀而痛者。實痛也。無血而痛者。虛痛也。大抵痛而且脹。或上衝胸脇。或拒按而手不可近者。皆實痛也。宜行之散之。若無脹滿。或喜揉按。或喜熱熨。或得食稍緩者。皆屬虛痛。不可妄用推逐等劑。凡新產之後。多有死枕腹痛者。摸之亦有塊。按之亦微拒手。故古法謂之死枕。皆指為胞中之宿血。此大不然。夫胎胞俱去。血亦豈能獨留。蓋子宮蓄子既久。忽爾相離。血海陡虛。所以作痛。胞門受傷。必致壅腫。所以亦若有塊。而實非真塊。腫既未消。所以亦頗拒按。治此者。但宜安養其臟。不久即愈。惟殿胞煎為最妙。其次則四神散五物煎。皆極佳者。若誤認為瘀。而妄用桃仁紅花玄胡青皮之類。反損臟氣。必增虛病。葉註死枕痛議非瘀然血海陡虛而痛此說未可全信往往用理氣消痰之藥而愈者多矣但去血過多不可消痰仍五物煎即四物加肉桂初產用之胸膈滿悶不寬飲食不進矣丹溪以不服藥為妙若用藥行則痛自止矣一有母體本虛而血少者。即於產時亦無多血。此等尤非血滯。若有疼痛。

只宜治以前法。或以大小營煎黃雌雞湯主之。

〔葉〕此俱覺疑。帶非痛所宜。

一凡新產之後。其有陽虛弱。

而寒從中生。

〔葉〕此不雅。

或寒由外入。以致心腹作痛。嘔吐不食。四肢厥冷者。宜九寶煎大最發。

湯。或理陰煎主之。

〔葉〕嘔吐不食。歸地不相宜。

一產當寒月。以致寒氣入腹。臍下脹痛。手足可近者。宜

羊肉湯主之。若氣實寒甚者。宜蟠葱散。一產後惡露不盡。留滯作痛者。亦常有之。然此與虛

痛者不同。必其由漸而甚。或大小便不行。或小腹鞭實作脹。痛極不可近手。

〔葉〕此腹痛有微。仍由大小便利。

小腹痛。或自上下衝心腹。或痛極牙關緊急。有此實證。當其血近上者。宜失笑散。近下者。宜通

瘀煎奪命丹。回生丹。如未效者。當用決津煎為善。一產後有脾虛腎虛而為腹痛者。此不由

產而由臟氣之不足。若脾氣虛寒。為嘔吐為食少。而兼腹痛者。宜五君子煎。六君子湯。溫胃

飲之。類主之。若腎氣虛寒。為瀉為利。而兼腹痛者。宜胃關煎。理陰煎之類主之。

〔葉〕此瀉利。非理陰煎。

血藥。一產後有飲食停滯。及氣逆作痛。亦當因其類而消去之。如排氣飲。大和中飲之類。皆

可酌用。

〔葉〕此兩方。尚可加減。

仲景曰。產後腹中疝痛者。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。

立齋曰。前證若因氣滯。用延胡索散。若因外寒。用五積散。若因怒氣。用四物加木香。柴胡。

○若因血虛。用四物加參朮炮薑。若因陽氣虛弱。用四君子當歸炮薑。若因脾虛血弱。用

六君子當歸炮薑。

（兄）

產後發熱