

醫門初學

2



太醫院增補醫方捷徑卷七

太醫院

羅必煒

山曉星樵人斫

閻書林

楊能儒

梓行

診雜病生死歌候

止猶亡脈來

五十不止身無病數內有

五十動而不克止

止皆知定四十一止一

者無病也臟欠動

臟絕四年之後多亡命

三十一止即三年二十

一止二年應十動一止

一年殂已下有止看暴

病暴病卒
暴之病

咳嗽類

咳者氣動也陽也嗽者兼血也陰也

肺為華蓋居上膈

只喜清虛嫌滯塞

七情四氣有時觸

發而為喘而為咯

肺氣風寒嗽痰清

其聲清亮無他說

肺實風熱痰白稠

其聲乾燥多咽嗑

蘇沈九寶治風寒

人參敗毒治風熱

肺痿咯血甘桔湯

加上黃連真祕訣

蘇沈九寶湯治老人小兒素有喘急遇寒暄不



診暴病歌

兩動一止三四日三四動

止應六七五六一止七八

朝次第推之自無失

形証相反歌

健人脈病號行尸病人脈

健亦如之長短瘦肥並

如此細心診候有依稀

診四時病五行相剋歌訣

春得秋脈定知死死在庚

申辛酉金夏得冬脈亦如

常發則連綿不已咳嗽哮喘夜不眠

紫蘇 麻黃 杏仁 甘草 桑白皮

官桂 薄荷 陳皮 大腹皮

右用水鍾半薑三片烏梅半個煎至六分溫服

人參敗毒散治傷風發熱咳嗽頭疼

方見傷寒門

參蘇飲治上焦有熱咳嗽聲重

人參 茯苓 甘草 桔梗 枳殼 半夏

前胡 陳皮 葛根 蘇葉 木香

氣盛者勿用

右用水一盞半薑七片棗一枚煎至六分熱服

不拘時候

金沸草散治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕

此還於壬癸爲期耳嚴冬

診得四季脈戊己辰戌遂

是短秋得夏脈亦同前爲

因丙丁相刑剋季月季夏

得春脈剋在甲寅病應極

直達乙卯亦非良此是五

行相鬼賊春得冬脈只是

虛更兼補腎病自除若得

夏脈緣心實還應瀉子病

無虞夏秋冬脈皆如是在

前爲實後爲虛春中若得

吐稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花 甘草 麻黃 前胡 荆芥

赤芍藥 半夏 薑三片棗二枚煎服

甘桔湯治風痰上壅咽喉腫痛

方見傷寒明

如有咯血加黃連

霍亂類

霍亂吐瀉爲何因 上吐下瀉腳轉筋

只緣胃氣承虛弱 飲食不調原是根

日間受熱夜受寒 邪氣正氣渾不分

所以發而爲吐瀉 治療隨時要酌斟

藿香正氣春冬用 五積嚴冬可救人



四季脈不治多應病自除

傷寒次死生脈歌

熱病診得浮脈洪細小徒

費用神功汗後脈靜當

便瘧喘熱脈亂應終凶

論陽毒陰毒二證

池氏曰叔和獨取仲景傷

寒二毒之說何也二毒

本然危急誠恐後學不

辨陰陽二證陰證誤投

陽證之藥陽證誤投陰

夏月藿苓為要領 六和秋月有神靈

夏秋之間暄熱入腠理感風溼暑之氣而作此

證多有陰陽虛實不同脈來浮洪者可治微

而遲氣少不調者為難治

藿香正氣散治霍亂吐瀉腹疼冬月宜服

藿香 白芷 茯苓 紫蘇 大腹皮

厚朴 陳皮 甘草 桔梗 半夏麴

右用水一盞薑三片棗二枚煎服

五積散治渾身麻木兼治損疼方見傷寒門

需苓湯五苓散一法加木瓜方見暑門

發熱加竹葉麥門冬

證之藥而致天亡乃引藿香正氣散合香薷名藿薷湯

素問陰陽太論而作歌

陽毒歌

陽毒健亂四肢煩面赤生

花作點斑狂言妄語

神鬼下痢頻多喉不安

陽毒尸咽如炙齧口舌開

張命欲翻有藥不辜但

與服能過七日漸能安

陰毒歌

陰毒傷寒身體重背強眼

六和湯方見暑門

水腫類

水腫之病出乎脾

腎水脾土兩要固

泛濫逆流四肢去

風腫氣腫并血腫

風腫走注脾麻木

血腫之病如何識

陽水身熱陰水冷

木香流氣除三腫

時醫不識亂猜疑

脾土一虧水無圍

使人浮腫黃光輝

陰水陽水也要知

氣腫隨氣消長之

皮間赤縷血痕兒

利水和脾總治之

甚者當先通利宜



中醫藥大學圖書館藏

痛不堪任小腸刺痛口

青黑毒氣冲心轉不禁

四肢厥冷惟思吐咽喉

不利脈細沈若能速灸

刺輪下六日看過見喜

深

諸雜病生死歌

腹脹浮大是出厄虛心命

殂須努力下痢微小卻

爲生脈見浮洪無燒日

恍惚之病定顛狂其脈

陽水身熱八正散 陰水身涼胃苓奇

水腫通用牛黃散 香平附子世開稀

木香流氣飲治陰水不煩大小便清利

木香 厚朴 青皮 甘草 香附子

陳皮 肉桂 枳榔 草菓 大腹皮

丁皮 蘇葉 蓬朮 藿香 麥冬

木通 人參 白朮 木瓜 赤茯苓

菖蒲 白芷 半夏 薑汁炒

右用水二盞薑三片棗一枚煎至七分溫服

八正散利小便去浮腫

瞿麥 扁蓄 滑石 大黃 梔子仁



實牢保安吉寸關尺部

木通 甘草 車前子

沈細時如此未聞人救

右用水一盞入燈心草同煎食前服

得消渴脈數大者滑虛

胃苓散

方見痢門

細病深厄難脫水氣浮

牛黃飲

大得延生沈細應當是

黑牽牛

大黃末

三兩

陳米飯鍋燂

一兩

死別霍亂之後脈微遲

右爲末麴糊爲丸如梧桐大常服四五十丸

氣少不語大難醫二部

淡薑湯送下欲通利加至百丸

洪浮必救得古今課定

香平散治水腫氣腫血腫

更無疑鼻衄吐血沈細

香附子

黑牽牛

京三稜

蓬莪朮

乾生薑

宜忽然浮大即傾危病

右爲末各等分共二斤入好平胃散末一斤合

人脈健不用治健人脈

和每服二錢半白湯醋湯薑湯皆可調服用



病名行屍心腹痛脈沈

老米醋爲丸亦可

細宜浮大弦長命必殂

宿食類

頭痛如澀應須死浮滑

宿食緣何不剋消

只因體弱胃脾弱

風痰必易除中風口禁

卻怕過食生冷食

或成積滯不停調

遲浮吉急實大數三魂

吞酸嘔惡并噎噎

胸滿氣膈或熱潮

孤魚口氣粗難得痊面

或瀉或利無比對

或有頭痛等樣驕

赤如粧不叉居中風髮

醫治之法甚容易

審其虛實用藥高

直口吐沫噴藥悶亂起

輕者三稜紅丸子

重者麻黃等件交

復蘇咽喉拽鋸水雞响

虛寒脾積并感應

實熱神芎黑丸調

搖頭上竄氣長嘯病人

但能依此數件藥

不必他方把心操

頭面青黑暗汗透毛端

三稜丸散氣寬中消積滯除膨脹

恰似珠眼目小瞪不須

京三稜

半斤細剉為末
酒三斤煮成膏

杏仁

去皮尖炒

蘿蔔子

炒

治冷汗如油不可蘇內

乾漆

炒青皮

神麴

炒各二斤

實腹脹痛滿盈心下勞

右為末三稜膏丸如梧桐子大每服

三十九米湯送下

強乾嘔頻手足煩熱脈

紅丸子消食化氣兼治食積去積下熱

沈細大小便澀死多真

雄黃

研川鬱金

各一兩

巴豆

十四個去油

外寒內熱吐相連下清

右為末醋煮麵糊為丸如麻子大每服五丸加

溼穀轉難安忽然脘得

至七丸熱茶清下裏實用此喉閉

以熱茶清調下

脈法大莫廢神功定下

脾積丸治臟中一切寒食積

痊內外俱虛身冷寒汗

丁香 生木香 巴豆肉

良薑

醋煮各半兩

出如珠微嘔寒忽然手

蓬朮

二兩

三稜

一兩

皂莢

三大個燒灰存性

青皮

足脈厥逆體不安甯必

右為末入百草霜三匙麵糊丸如麻子大每服



死判上氣喘急候何甯

手足溫煖淨滑生反得

寒澀脈厥遲必知歸死

命須傾咳而尿血羸瘦

形其疾脈大命難存唾

血之脈沈弱吉忽然實

大死來侵上氣浮腫肩

息頻浮滑之脈即相成

忽然微細應難救神功

用盡也無生中惡腹脹

緊細生若得浮大命遂

十丸至二十九丸脾積陳皮湯下吐酸水淡薑

湯下嘔吐霍香甘草湯下小腸氣炒茴香酒

下婦人血氣刺痛淡薑湯下小兒疳氣四君

子湯下

感應丸治停積宿物不能剋化有傷脾胃

百草霜

兩

杏仁

去皮

一百

四十個

丁香

一兩

五錢

木香

一兩

五錢

木香

一兩

一兩

肉豆蔻

去皮

二

川

乾薑

兩

三

巴豆

七十

個

去

油

研

為

霜

皮心膜去油研為霜

右除巴豆百草霜杏仁外餘四味為末與前藥

三味同拌研細先將黃蠟六兩溶化以重綿

濾滓更與好酒一升於器內煮蠟溶滾數沸

巡金鎗血盛虛細活急

實大數必危身凡脈尺

寸緊數形又似釵直吐

轉增此患蟲毒急須救

速來神藥命難停中毒

洪大命應生細微之脈

必危傾吐血但出不能

止命應難還沒瘡平大

凡要看生死門太衝脈

在卽爲憑若動應神魂

魄在止便干休命不停

傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟稱用春夏

用油一兩秋冬用油一兩半熬令香熱次下

蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前藥成

錠油紙包收旋丸每服三十丸薑湯送下

神芎丸治上焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或有

瘡癰咽膈不利大小便祕澀一切風熱亦能

磨酒食諸滯尤宜服之

大黃 黃芩各三兩 牽牛 滑石各四兩 黃連

川芎 薄荷葉

右爲末滴水丸如梧桐子大每服五十丸用溫

水送下

察色觀病生死歌

欲愈之病目皆黃眼胞忽

陷定知亡耳目口鼻黑

色起入口十死七難當

面黃目青手亂頻邪風

在胃喪其身面黑目白

命門敗困極八日死來

侵面色忽然望之青進

之如黑卒難當面青目

白憂喘氣待過十日定

存亡黃黑白色起八日

黑子丸治中脘有宿食不消吞酸惡心口吐清

水或心腹脹滿

百草霜

分杏仁

去壳尖研

巴豆

去壳

半夏

丸

砂仁

個三七

如痢疾加烏梅

七個

右爲末麴糊丸如黍米大每服二十九或三十

丸薑湯送下

木香分氣丸寬中順氣消導積滯

甘草

炙六兩

木香

不見火

甘松

各一兩

香附子

一斤

蓬莪朮

八兩

右爲末麴糊丸如梧桐子大每服三十九薑湯

橘皮湯送下



更兼口鼻有災殃面青

目黃申時死餘候須看

兩目強目無精光齒齲

黑面白目黑亦災殃口

如魚口不能合氣出不

還命飛揚肩息直視及

神焦面腫瘡黑也難逃

妄言錯亂及不語尸臭

元知壽不高人中盡滿

兼背青三日須知命必

傾兩頰顙赤心病久口

婦人類

婦人一科有專功

餘病皆與男子同

獨有胎前并產後

血崩經後滯難通

常使烏陳和氣飲

逍遙散復最多功

四物湯中加減用

懷胎涼燥莫交逢

婦人有病加減與男子同孕婦忌用南星半夏

乾薑肉桂滑石硝黃大寒大熱燥性之藥

烏陳湯治產後諸疾尋常亦可服

烏藥 陳皮 川芎 甘草 當歸 香附

芍藥 水一盞煎午前服

和氣散治胎前產後諸疾尋常亦可服

張氣直命難停足跌此

紫蘇

川芎

陳皮

甘草

白茯苓

彈膝如斗十日須知難

厚朴

荊芥

保守項筋舒直定知殃

右用水一盞半煎服有熱加黃芩

掌內無紋也不久脣青

逍遙散治發熱經候不調勞熱咳嗽並服

膝冷及遺尿背面飲食

當歸

芍藥

白朮

甘草

赤茯苓

四日期手足指甲皆青

柴胡

薄荷

黑更過八日定難醫脊

右用水一盞半煎服不拘時候

痛腰重反復難此是骨

四物湯治虛損月水不調常服調益榮衛血氣

絕音看體黃溺赤時不

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

酒蒸

止肉絕六日便高判手

右用白水煎空心服

甲青黑呼罵多筋絕九

妊娠胎前產後調經及月事多少前後愆期



口定難過髮直如麻半

日死尋衣語死十知磨

五臟察色候訣

肝臟歌

面腫蒼黑舌卷青四肢力

乏眼如官泣出不止是

肝絕八日應當命必傾

心臟歌

面黛局息直視看又兼掌

腫沒紋斑狂言妄語身

悶熱二日之內到冥間

胎後不安產後血塊不散或亡血過多或惡

露不下並宜服之

右已具元戎加味四物湯

經候不通腹脹或痛本方對調胃承氣湯名

玉燭散經候不調心芎

歸散二味名曰君臣散室女經不下腹中桂心

蓬朮各五分

嚴氏方六合湯

婦人赤白帶下脈微沈腹痛或陰中痛本方可

用若血多加白附子炒五錢

右咬咀每服六錢水煎食前服名元戎六和湯

二陳湯

脾臟歌

足跌腫滿面浮黃泄痢不

覺汚衣裳肌肉粗澀兼

唇反一十二日內灾殃

肺臟歌

口鼻氣出不復回唇反無

紋黑似煤皮毛焦乾爪

枯折程途三日定知灾

腎臟歌

而黑齒痛目如盲自汗如

水腰折頻皮肉濡結髮

半夏 桔梗 陳皮

甘草 白茯苓

右用生薑烏梅煎服

越鞠丸治血鬱

桃仁 紅花 撫芎

香附子 青黛

右爲末飲湯糊丸 每服五十丸食前服

小兒類

小兒醫方另有科

一時要用不知何

驚風發熱并痰嗽

保命丹吞不可差

急慢二驚紫金錠

未出痘疹神異磨

吐瀉腹疼宜助胃

唇口生瘡化毒和

潮熱抱龍惺惺散

嘔吐燒針丸用多