


經史證類大觀本草

經史證類大全本草卷第九

○草部中品

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部蠶瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一

名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令

見風

陶隱居云擣葉以灸百病亦止傷血汁又殺蛇虫苦酒煎

唐本注云別錄云艾生寒熱熟主下血衄血

膿血痢水煮及丸散任用臣禹錫等謹按藥性論云艾葉使能止

崩血安胎止腹痛醋煎作煎治癰止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉

主吐血實主明目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒

艾作餛飩吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉

擣汁飲又擣末和乾薑末為丸一服三十丸飯壓日再服治一切

冷氣鬼邪毒氣最去惡氣孟說云艾實與乾薑為末蜜丸消一切

冷氣田野人尤與相當日華子云止霍亂轉筋治心痛暈吐并帶

下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實暖無毒

壯陽助水藏腰膝及暖子宮

圖經曰

艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以復

而葉背白以苗短者為佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久

方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方亦用熟艾搗金

瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉團之內瓦甑中並下

塞諸孔獨留一目以痛處著甑目下燒艾一時久知矣又治癩取



乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差近世亦有單用艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云

乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採為乾餅子入生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚治冷

若患冷氣取熟艾麴裹作餅飽可大如彈子許又治百惡氣取其子和乾薑搗作末蜜丸如梧子大空心三十九服以飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田野之人與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩懷煎湯一服便止妙

外臺祕要

治霍亂吐下不止艾一把水三升煮取一升頓服

又方

治諸骨硬生艾蒿數升水

酒共一斗煮取四升稍稍飲之良

肘後方

鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀脊脇腹內病刺切痛不可抑按或

即吐血鼻中出血下血一名鬼掛以熟艾如雞子三枚水五升煎取二升頓服之

又方

治卒心痛白熟艾成熟者一升

以水三升煮取一升去滓頓服若為客氣所中者當吐虫物

又方

治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛乾艾葉三升以

水一斗煮取一升去滓頓服取汗

又方

治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻

其上不以為意下部生虫食其肉爛見五藏便死燒艾於管中熏下部令煙入更入少雄黃良

葛氏方

治蛇虫

刺口吐清水搗生艾取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先喫令虫聞香然後即飲一升當下蛇

又方

治蛇虫

安或但腰痛或胎轉捨心或下血不止艾葉一
雞子大以酒四升煮取二升分爲二服良驗 **經驗方** 治喉痺

辛葉一握用醋搗傳痺上若 **又方** 王峽州傳野雞痔病方用槐
冬月取乾艾亦得李亞傳 柳湯洗便以艾灸其上七壯

以知爲度王及郎中充四川安撫判官乘驟入洛谷數日而痔病
因是大作如胡貳貫於腸頭其熱如燔煨火至一驛僵仆無計有

主郵者云須灸即差及命所使爲槐柳湯熱洗底上因用艾灸三
五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚

痛瀉後遂失 **孫真人** 糞後有血膿前艾 **斗門方** 治火眼用艾
胡荽所在 葉生薑汁三合服 燒令煙起以

碗蓋之候煙上碗成煤取下用溫水 **又方** 治癩瘡用艾於陰囊
調化洗火眼即差更入黃連甚妙 下穀道正門當中間

隨年歲 **勝金方** 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內
灸之 四面以麪密封塞不透風一頭以艾灸之七壯

患右灸右耳 **初虞世** 治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠
痛亦灸得 炒爲末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先

煮艾薑至二盞半入膠消洋 **兵部手集** 治發背頭未成瘡及諸
溫分二服空腹服一日盡 熱腫以濕紙塌上先乾


處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之 **錢相公醫中方** 治誤吞錢取
如先疼痛灸即不痛即以扁爲度 艾蒿一把細

剉用水五升煎取 **傷寒類要** 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱亦
一升頓服便下 斑變爲黑斑弱血用艾葉如雞子

大酒三升煮取一 **又方** 蠶虫蛭下部以泥作甕以竹筒如指大
升半分爲二服 一頭坐甕缸中一頭內下部孔中以雞



蜀州惡實



子大艾一團燒之以泥作甕口吹之
 常令艾煙熏下部強人可益久良
 大以頭醋四升煎又方治倒產子死腹中艾葉半
 取二升分溫服又方斤酒四升煮取一升服又方小兒
 瘡燒艾葉荆楚歲時記端午四民踏百草採艾以爲人懸之
 灰傳上取艾葉如雞子
 午日雞未鳴時採似
 人者縛著用灸有驗

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗
出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平

澤陶隱居云方藥不復用唐本注云魯山在鄧州東北其草葉大如羊子殼似栗狀實細長如茺蔚子根主牙齒疼痛勞瘡脚緩

弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕積血主諸風癰瘕冷氣吞一枚出癰疽頭別錄名牛蒡一名鼠黏草今按陳藏器本草云惡實根

蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴鼠味苦主風毒腫諸癰根可作茹食之葉亦搗傅枝瘡不膿辟

風臣禹錫等謹按藥性論云牛蒡亦可單用味甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十一經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身

輕子研末投酒中浸三日每日服三三盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚又食前吞二枚熟接下散諸結節筋骨煩

熱毒又根細切如豆麪拌作飲食之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如虫行風洗了避風少時又能搗

一切腫毒用根葉入少許鹽花擣

圖經曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如羊子而長實似葡萄核而褐色外殼如櫟核小而多刺鼠過之

則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少鹽花以搗腫

毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了搗絞取汁



一大升和灼然好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽因食一頓熱肉便中暴風外生盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭燂火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

雷公云

凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉用

食療云

根作脯食之良熱毒腫搗根及葉封之枝瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癰瘻及丹石風毒石熱發毒明耳目

利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩蓋隨性多少欲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟接吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麪作飯煮食尤良又皮毛間習習如虫行黃根汁浴之夏浴避風却入其子炒過末之如茶煎三七通利

聖惠方

治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根搗絞取汁不計時候服一小盞效

秘要

治喉痺牛蒡子六分馬薤子八分搗為散每空心煖水服方寸匕漸加至一匕半日再服

熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟拌為末熱酒調下一錢匕立差

孫真人食忌

主天行

勞根搗取汁五大合空腹分為兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一升煮取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝

食醫

心鏡

治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分爲三服良

斗門方

治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸著痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研

酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛滅

王氏


博濟

治瘡疔將出以牛蒡子炒令熟杵爲末每服一錢入荊芥二德水一盞同煎至七分放溫服如瘡癰已出更服亦妙

初虞世

治皮膚風熱遍身生癰瘡牛蒡子浮萍等分以蔓荷湯調下二錢日二服

萍水



水萍

味辛

酸寒無毒

主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮

止消渴

下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名

水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是

今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也唐本注云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇

菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名荇菜暴

乾與括樓等分以人乳為丸主消渴搗絞汁飲主蛇咬毒入腹亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者未傳面野搗汁服之主水腫利小

便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長髮本經云水萍應是小小者

江東謂之漂陸機毛詩義疏云其龜大者謂之蘋小者曰萍春季春始生可慘蒸為茹又可苦酒淹以就酒日華子云治熱毒風熱疾

熱狂脇腫毒湯火瘡風痧

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中


謂之萍其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍大者謂之蘋春季春始生可慘蒸以為茹又可用苦酒淹以援酒

三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗

醫用治時行熱病亦堪發汗其有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮製去臍皮各半兩四物擣細篩

每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾偏身瘡者取水中小浮萍濃煮汁漬浴半日

瓜王州均



多效此方甚奇也

合聖惠方

治少年面上起細皰接浮萍

又方

發背初得

毒腫煩熱赤爛擣和雞子清貼之良

千金方

治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差

千

金翼

治小便不利膀胱水氣流滯以浮萍日乾末服方寸匕日三服良

孫真人食忌

五月取浮萍陰

乾燒煙去蚊子又主消渴以浮萍汁服之

子母祕錄

熱毒浮萍擣汁傳之令遍

高供奉

採萍時日歌不

在山不在岸採我之時七月半選其難風與瘕風些些
小風都不算豆淋酒內下三九鐵僕頭上也出汗

王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益

氣愈驚療諸邪氣熱結鼠瘦散癰腫留血婦人帶下不

通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺

人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間二月

採根陰乾陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃掘取不甚入大方正單

行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菰萁殊為謬矣唐本注云此物蔓生葉似枯樓圓無義缺子如梔子生青熟赤但

無稜爾根似葛細而多糝北間者累累相連大如棗皮黃肉白苗

子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也今按陳藏器本草

云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并瘞取根及葉搗絞汁服苗吐下

宜少進之有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鉤萐姑釋云鉤一

名萐姑郭云鉤萐也一名王瓜實如灼瓜正赤味苦藥性論云土

瓜根使平一名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁日華子云王瓜

子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用又云土

瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘞排膿熱勞

治撲損消瘀血破癥瘕落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處有之月

令四月王瓜生即此也葉似枯樓圓無義缺有刺如毛

五月開黃花，花下結子如彈丸，生青熟赤，根似葛細而多糝，謂之土瓜根。北間者其實累累相連，大如棗，皮黃，肉白，苗葉都相似，但根狀不同耳。二月採根，陰乾，均房間人呼為老鴉瓜，亦曰菟瓜。謹按爾雅曰：黃羊善切菟瓜。郭璞注云：似土瓜而土瓜自謂之葵，與葵同。菟與葵同，又名鉤菟，蓋菟瓜別是一種也。又云：易音物非，亦謂之土瓜，自別是一物。詩所謂採葑採菲者，非此土瓜也。大凡物有異類同名者，甚多不可不辨也。葛氏療面上瘰癧子，用之仍得光潤，皮急以土瓜根搗篩漿水勻和入夜先漿水洗面，傳藥曰復洗之。百日光華射人。小兒四歲發黃，生搗絞汁三合，與飲，不過三飲已。

聖惠方

治黑疸多死，宜急治。用土瓜根一斤，搗絞汁六

外臺

祕要

治蠱土瓜根大如母指，長三寸，切以酒半升漬一宿，一服當吐下。

肘後方

治黃疸變成黑疸，醫所不能治。土瓜根汁頓服一小升，平旦服。

能治土瓜根汁頓服一小升，平旦服。又方：治小便不通及關格，食後須病汗當小便，出愈不爾再服。

又方

治小便不通及關格，食後須病汗當小便，出愈不爾再服。

以少水解之，筒中吹下部取通。


產書

下乳汁，土瓜根為末，酒服一錢，一日三次。

榆地州衡



江寧府地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痼痛七傷帶下病
 止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸癰惡瘡熱瘡消酒
 除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句
 山谷二月八月採根暴乾

得髮良惡麥門冬陶隱居云近道
 處處有葉似榆而長初生布地而

花子紫黑色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作
灰能爛石也之客時用葉作飲亦好今按別本注云今人止冷熱
痢及疳痢熱極效臣禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產
後餘瘀疼痛七傷治金瘡止血痢蝕膿蕭炳云今方用共檣皮同
療赤白痢日華子云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前產後諸
血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風但是平原川澤皆有獨莖花紫

七八月採

圖經曰

地榆生桐柏及兔句山谷今處處有之宿根三月內生
苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細

長作鋸齒狀青色七月開花如榵子紫黑色根外黑裏紅似柳根
二月八月採暴乾葉不用山人之客時採此葉作飲亦好古斷下
方多用之葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各三兩
水二升煮半頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈
小兒疳痢亦單煮汁如飴糖與服便已又毒蛇螫人搗新根取汁
飲兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升
煮取一升半去滓再煎如稠
錫絞濾空腹服三合日再

唐本注云


主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多
白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰多

子門辟七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮
冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用葉作飲代茶甚解熱

聖惠方

治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細
剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合亦治吐

冀州小薊根



血千金翼

伐指逆腫單煮地榆
作湯漬之半日愈

肘後方

療狗犬咬人地榆根
未服方寸匕日一二

亦傳瘡生
搗更佳

葛氏

毒蛇螫人搗地榆根
絞取汁飲兼以漬瘡

梅師方

治狗犬咬人煮
地榆飲之兼末

傳瘡上服方寸匕日三服忌酒若治
瘡已差者搗生葉汁飲之一二升

齊民要術

治風痺補腦
地榆汁釀酒

三洞要錄

地榆草剉一升稻米一升白玉屑一升三物取白露
汁二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名曰

玉液以藥內杯美醴
中所謂神玉漿也