

本草彙言

四



本草綱目卷之五

本草綱目卷之五目錄

草部

大黃

商陸

狼毒

山慈姑

蚤休

大戟

甘遂

續隨子

蓖麻子

煙草

常山

藜蘆

天麻

草烏頭

白附子

玉簪花

半夏

羊躑躅

射干

鳳仙花

堇花

岩花




南京中醫藥大學圖書館版權所有


大戟



狼毒



大黄



芍药




芍药



芍药



南京中医药大学图书馆藏书



附子



烏頭


剛子



天雄



草烏



白附子




常山



藜蘆




遂甘



續隨子

正 鑽



蓖麻子



烟草



半夏



鬼臼



羊躑躅



玉簪花



射干





南京中医药大学图书馆藏书

本草彙言卷之五目錄

草部 毒草類

大黃

商陸

狼毒

狼牙

山慈姑

蚤休

大戟

澤漆

甘遂

菊蕚

續隨子

蓖麻子

葉博落廻

烟草

常山

藜蘆

附子

烏頭側子

天雄漏藍子

草烏頭

白附子

天南星

玉簪花

半夏

羊躑躅

鬼臼

射干

鳳仙花

堇花

芫花

海芋

透山根

鉤吻



本草言卷之五

錢塘

倪朱謨純字甫集選

男倪洙龍冲之氏

沈瑄西輿甫校正

草部

毒草類

黃味苦。氣大寒。性微毒。氣味俱厚。沉而降。陰也。入手足陽明太陰厥陰六經。血分之藥。生用性烈。酒醋薑汁製。其性稍緩。各因其用也。

陶隱居曰。出河西山谷。及隴西者為勝。益州北部。汶山西山者。次之。二月卷生。黃赤。放葉時。四四相當。酷似羊蹄葉。粗長而厚。莖高三尺許。味酸而脆。三月花黃。五月實黑。八月采根。大者如盤。小者如拳。長二尺許。切片陰乾。文理如錦。質色深紫。修治。切作薄片。以文如穀紋緊厚者佳。剉細。又以水潤透。蒸之。晒乾。再潤。再蒸。再晒。片七遍。色如烏膏者為度。



北京中醫藥大學圖書館版權所有

○大黃華張元素蕩滌腸胃。通利閉結。攻鑿積聚。破散瘀血。催逐留飲。并宿痰宿食之藥也。味大苦真素藏氣大寒。其性沉而不浮。走而不守。凡病在五藏腸胃之間。痰血食飲有形之物。及天行君火之邪。銷鑠津液。壅閉藏府。或傷寒溫病熱病實熱裏熱熱結中下二焦。二便不通諸證。咸宜用之。按經曰。實則瀉之。大黃氣味大苦大寒。性稟直遂。長于下通峻利猛烈。橫驅直搗。一往不返。特有將軍之號。故凡腸胃積聚。由于脾虛中氣不運。而由于食飲停滯者。閉結由于血少腸燥。而由于熱結不通者。瘀血由于胃虛脾弱。而由于蓄滯停留者。留飲由于胃陽真氣不充而生。而由于陰寒水濕成者。宿食由于脾弱

不磨而不由于邪熱內結者。女人腹痛。由于厥陰血虛。而不由于經阻不行者。痢疾。由于風客胃腸。尚有表證。未清。而不由于裏實有積滯者。吐衄失血。由于陰虛火起于下。炎燦乎上。熱血妄行。溢出上竅。而不由于血分實熱者。腰痛脚氣。由于下元先虛。濕熱下流。而不由于風濕外侵。瘀血內閉者。癰疽腫毒。由于心氣不舒。肝氣鬱逆。以致營氣不從。逆于肉裏。乃生癰腫。而不由于膏粱厚味。醇酒炙煇。血分積熱成者。咸宜忌之。以其損傷胃氣故也。故傷寒方。調胃承氣湯中。用甘草以和之。正謂是也。輕發誤投。多致危殆。戒之慎之。

方龍潭先生曰。凡蘊熱之證。藏府堅澹。直腸火燥。而大

便結癰腫初發毒熱熾盛而大便結肥甘過度胃火盛而大便結縱飲太甚脾火盛而大便結必用苦寒以大黃可也至若跌撲損傷血有所瘀閉而不行用桃仁紅花之劑必加酒炒大黃又有陽明胃火痰涎壅盛喉閉乳蛾腮頰腫痛及連口齒用清痰降火之劑必加薑製大黃若光明科以之治目在時眼初時以之瀉火可也瘡腫科以之散熱拔毒在紅腫時每可也如產後去血過多血虛閉而便不行常用養血潤腸之劑必禁大黃爲要又若老人氣虛血閉常用麻仁丸肥人痰閉常用半硫丸大黃亦所必戒治者不可畏而不用亦不可忽而輕用若元虛不足者不可用恐正氣耗而亡陽

也風寒表證未解不可用恐裏氣一虛表邪內陷也裏證當下脉勢無力不可用恐熱邪去而正氣脫也故陽證當下誤下早而表邪內陷成結胸裏證當下誤下早而餘邪留結成痞氣是用大黃之悞也要訣曰氣血者有形無形之分也如熱在氣分無形之邪也熱在血分有形之邪也有形之邪當用大黃蕩滌之若無形之邪而用大黃是謂誅伐無過悞之甚矣然張仲景立大陷胸湯丸皆用大黃實瀉胸胃血分之邪若結胸在氣分則用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯如是則氣分血分之別若冰炭之不同矣可忽乎哉又按仲景治心氣不足吐血衄血用瀉心湯以大黃黃連黃芩或

曰。心氣既不足而不補心。更瀉心。何也。曰。若心氣獨不足。則不當吐衄血矣。惟有邪熱客之。因而不足。故令吐衄血也。今者以苦泄其熱。以苦清其心。蓋一舉而兩得之也。朱丹溪又云。瀉心湯者。因本經之陽火亢甚。以致陰血妄行飛越。故用大黃瀉去亢甚之火。使之和平。且心之陰不足。則肺與肝各受火邪而病作。故用黃芩救肺。黃連救肝。又肺者。陰之主。肝者。火之母。肝肺之火既退。則陰血歸其原矣。何吐血衄血之有耶。沈則施先生曰。凡病在氣分。及胃寒血虛。并妊娠產後。及久病年高之人。並勿輕用大黃。其性氣苦寒。能傷元氣。耗陰血也。

○集方治腸胃中一切壅滯

或痰血隱癖內伏之疾用大

黃四兩黑牽牛末二兩用酒共煮一日以酒乾頻添之

搗膏爲丸如梧桐子大每早服三十丸白湯下○治久

患積聚用大黃二兩酒煮一日晒乾爲末和白芍藥末

二兩煉蜜丸棗豆大每早晚各服百丸白湯下○治跌

撲傷損瘀血或從高墜下或木石壓傷及一切傷損瘀

血凝滯痛不可忍用大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒

二味俱研細酒一大盞煎六分五更時服至曉取下瘀

血卽愈○治杖打腫痛或作潮熱者用大黃末薑汁調

敷一夜黑者紫二夜紫者白也○治實熱濕痰留飲爲

病以錦紋大黃酒蒸八兩入前胡八兩橘紅四兩外另

以青礞石二兩。同焰硝二兩。入砂罐固濟煨紅。研末二兩。右各取末。以水發爲丸。梧子大。每常服一二十丸。少病五六十丸。緩病七八十九丸。急病一百二十九丸。溫水吞下。卽臥勿動。候藥逐上焦痰滯。次日先下糟粕。次下痰涎。未下再服。惟妊娠水泄忌之。○治宿食停滯腹中脹滿。用大黃八兩。酒浸九日。蒸一次。晒一次。計蒸晒共九次。如乾燥。添酒蒸晒。九次畢。爲末。紅麴打糊。丸如菉豆大。每服一錢。空心白湯送下。○治傷寒^{仲景方}熱病邪結中焦。用大黃枳實厚朴爲小承氣湯。○治傷寒^{同前}病發于陰而反下之。心下滿而不痛。按之濡。此爲痞也。以大黃黃連瀉心湯主之。用大黃二兩。黃連一兩。水二升。煎半升服。

○治腸胃實熱閉結不通用大黃八兩酒煮三時

方脈正

爲末配杏仁霜薤仁霜各一兩紅麴打糊丸如黍米大

每早服六分白湯下

○治婦人經脉吐滯不通腹中痛用大黃四兩酒煮三時晒乾爲末配玄胡索桃仁三

稜蓬莪術俱酒炒各五錢爲末共爲丸每早服一錢酒

下○治痢下赤白腹中脹滿閉澁不通快用大黃二兩

酒煮配枳殼檳榔當歸甘草滑石白芍藥各五錢分作

四劑水三大碗煎七分空心徐徐服或作丸每早服二

錢是迎奪之法也然不可過劑恐傷胃氣○治吐

血衄血由于胃實火升者用大黃黃芩黃連各一兩水

五升煎取一升熱服取微利爲度○治腰痛而重坐臥

不寧用大黃四兩酒煮三時晒乾爲末配玄胡索桃仁三

稜蓬莪術俱酒炒各五錢爲末共爲丸每早服一錢酒

痛愈甚行則痛止。此內有瘀血也。用大黃一兩酒煮桃

仁二兩去皮。紅花五錢。分作五劑。每劑用水二碗煎半

碗。食前服。○治脚氣紅腫痛重難履。方同腰痛。○治膏

梁厚味酒食燔炙積熱日深發為癰腫。用生大黃研末

醋調塗之。燥即易。不過數易即退。○治跌撲損傷瘀血

內閉。用大黃桃仁紅花各五錢。酒水各半煎服。○治陽

明胃火痰涎壅盛及喉閉乳蛾或腮頰腫痛或齒牙攻

痛。用大黃三錢薑水製礪砂二錢山豆根川貝母各五

錢或煎湯服或作散服。○治暴赤時眼腫痛大便閉結

者。用大黃三錢酒製防風柴胡乾葛甘菊花各一錢蔓

荊子荊芥各二錢水煎服。○治小兒無辜疳癖面乾黃