

二

豫醫雙璧

傷寒補亡論二

二冊



傷寒總病論卷第五

太陽經証下九十

仲景曰傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調

者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯雍曰此謂太陽証誤下之者趙以偽醫曰

反以下之至清谷不止以四逆湯救裏裏氣和津液生清便調其表証身疼痛者尚未調

則以桂枝湯救表觀此可見清谷雖止小便未調猶未可以救表也何也疼痛者未調

則津液未生津液未生則裏氣未和為谷氣之虛寒下利清谷不止而身疼痛者未可

以強發汗也發汗則亡陽之証作矣下後裏氣虛寒下利清谷不止而身疼痛者未可

津液而骨屬不利也故當救裏用四逆湯以復陽而收陰下後身疼痛而小便清大

便調者裏氣和而營衛不和也故當救表用桂枝湯以因衛而和營此太陽誤下之

後表裏虛實不同兩兩開說非謂先裏而後表也

又曰病發熱頭痛脉反深若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯雍曰此太陽病而

得少陰脉故急當救裏發熱頭痛為內虛寒甚也急當以四逆湯救其裏寒

又曰太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈

所以然者汗出表和故也得裏未和後之得表然後復下之常氏曰和表用小柴胡

和表合用桂枝湯小建中湯若用小柴胡是和解非和表也



人身惟虛處
客邪亦惟虛
處易出

湯復下用調胃承氣湯雍曰汗出表和則不必復下

冒者蒙也邪蒙瞶而外蔽也先下之不愈而復發汗治之不諱

徒虛其表裏而邪無從出其人因致冒冒固作汗之兆也汗出則邪散而表和矣裏以二便言或前或後得一未和之候而後可以施其治

又曰太陽病未解脉陰陽俱停

一作微

必先振慄汗出而解但陽脉微者當汗出而解

但陰脉微者

脉一有而尺四字

下之而解若欲下之宜調胃承氣湯一宜大柴胡湯

太陽病久未得

解脉陰陽俱停三部皆微也正氣虛而邪欲解必振慄汗出者所謂戰汗而解也是邪從表解也若從裏解其必振慄自下利可知矣惟其三部皆微故或從表或從裏

未可定也若但陽脉微知必戰汗而解若但陰脉微知必振慄自下利而解若不自下而欲下之亦惟調胃承氣和之而已無事於大攻也

又曰太陽病發熱汗出者此為營弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯雍曰邪

風在衛之風也

太陽中風風並於衛而強營無邪助而弱營弱衛強故使汗出亦即陽浮陰弱之義而申明之耳邪風即風邪無鑿看

又曰傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而

不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴外有微熱或欬者小

柴胡湯主之

傷寒中風五六日傳至少陽証治俱同也邪在表則寒在裏則熱在半表半裏則往來寒熱少陽也脉循胸絡脇邪湊其經伏飲搏聚則胸脇

苦滿胸脇既滿谷難消化則嘿嘿不需飲食邪熱挾飲湧而上逆則心煩喜嘔邪之出入不常各因人之氣體則有或然諸証胸中煩而不嘔熱雖聚而氣不逆也渴者

熱耗其津液也腹中痛者中有寒也脇下鞭滿邪引肝之分也心下悸小便不利隨
停而下行也不渴者裏無熱也外有微熱者表有邪也要以小柴胡和解為主治隨
證加減之耳柴胡人胆經能通表裏祛三陽不退之邪用之為君黃芩能泄三陽之
熱清心降火用之為臣人參甘棗三者性平坐鎮中焦助正祛邪者也半夏生薑能之
散能消用以為佐使各顯其長上通天庭下徹地戶至為靈應非智謀之士孰能變化而通其機乎

又曰血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作
有時嘿嘿不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也一云藏府相連其痛必脇膈中痛

柴胡湯主之跟上傷寒中風條說服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之常器之云亦與小柴

胡湯得其便堅方可用調胃承氣湯前條傷寒中風五六日往來寒熱從太陽傳變而來此條劈頭便說血弱氣盡腠理開邪氣因

入當是婦人產後或經水初淨湊理開疎之際邪氣因虛直入遂得與正氣分爭往來寒熱也邪在膽經而痛引肝之分是熱入血室也以藏府相連之故治法但與小

柴胡以解經邪而牽連之藏邪亦解矣

又曰得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫此正小柴胡証邪在醫二三下之不能

食而脇下滿痛面目及身黃頸項強表仍未解小便難者內亡津液與小柴胡湯後必下重謂後

大便本渴飲水而嘔者先渴後嘔為水停心下此屬飲家柴胡湯不中與也食谷者噦與少陽之常乾嘔不同

此五苓証不可餘藥



氏云可五苓散小半夏橘皮湯維日出千金十八卷痰飲門若証象陽旦小便難者

桂枝加附子湯見前卷

本是柴胡証以醫屢下之使胃虛而不能食邪鬱而身目黃

與小柴胡也小便秘者裏虛而氣不能達若與柴胡湯又走津液必下重也嘔噦亦似柴胡証特以水停而嘔食聚而噦則又不中與也

又曰傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

傷日寒邪四

傳少陽之時身熱惡風項強表未解也脇下滿而渴手足溫邪已在半表半裏矣與小柴胡湯以和解表裏之邪

又曰傷寒陽脉潛陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者小柴胡湯主之

少此

陽之邪下陷于肝經是以陰脈弦而腹中急痛所謂藏府相連其痛必下者也若作裏有虛寒治不差也以小柴胡升降其邪斯為正治矣

又曰傷寒中風有柴胡証但見一証便是

此少陽用藥凡例也

不必悉具凡柴胡湯病証而下

之若柴胡証不能者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解也

本柴胡湯病証而誤以他藥下

之邪氣內陷則寒熱不作矣若柴胡証有不罷者復與柴胡湯升降之使邪還于表必蒸蒸而振却發熱汗出而解也若使柴胡証全罷誰復知其潛藏隱伏之病而藥

之耶大抵少陽下陷之邪不入于肝即入于脾蓋土為木所制肝疾則胆所連也則有腹痛腰痛下利痞結等變遷延日久投藥無一當幸則留為痼疾是在所智能之士

審其致變之由得其所犯之逆而施拔本塞源之治要無出於復與小柴胡一法而加減出入與病情委蛇相就則庶乎其可矣然則仲景當日立法示禁其可犯乎

又曰傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

二三日邪未傳裏也氣虛而心中悸血虛則心中煩其人本是肉虛

也與小建中湯先建立其中氣而後施傷寒之治則不至有汗漏亡陽之患矣

又曰太陽病過經十餘日反二三下之后四五日柴胡症仍在者先與柴胡湯嘔止

小安若嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈雍曰嘔止小

安者勿服大柴胡也

太陽病以日數多而累下之不知其表邪猶有未罷故云反也後四五日柴胡証仍在則其下時原有裏証不甚致變也本當

行大柴胡兩解表裏但其人屢經誤下表邪下陷于裏先與小柴胡提其邪出半表

急鬱鬱微煩則少陽之腑熱未解也然後以大柴胡兩解之斯為合法矣

又曰傷寒十三日不解者胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡証下之

而不得利今反利者知醫以丸藥下之而非其治也潮熱者實也先宜服柴胡湯以

解其外後以柴胡加芒硝湯主之

傷寒雖已十三日而邪猶在半表半裏此為柴胡証當時若下柴胡湯則更無潮熱自利醫反以丸

藥下之虛其腸胃邪氣乘虛入腑日晡所發潮熱已而利也潮熱雖為熱實然胸脇之邪未已故先與小柴胡以解外後與柴胡加芒硝以下胃熱成氏曰于柴胡湯

內加芒硝一味

此營衛俱傷而並營分也

又曰傷寒十三日過經讖語者以內有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利其脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此為內寔也調胃承氣湯主之

過經不解而譫語者當以大柴胡湯通表裏而下其治也若小便利者大便當鞭而反下利以其脉之

和知非裏寒乃醫以丸藥下之為非其治耳若裏寒自利脉當微厥今脉反和明是為丸藥所誤邪熱乘胃而為協熱利也故與調胃承氣下其胃熱

又曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但小腹痛急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

雍曰不解者未可攻先解

其外千金用桂枝湯

太陽者膀胱經也膀胱屬寒水水得熱邪沸騰而上侮心火不狂而為熱結膀胱也

有似乎狂此下焦熱與血搏之象也其血為熱迫而自下者則熱隨血出而自愈若其血蓄而不行勢必攻之然外不解者尚未可攻當先解外外解已但小腹痛急結者乃可攻之而攻之法用桃仁入承氣以達血所加桂枝以分解外邪尚恐外邪或有未解其血得以留戀不行耳此本湯隨經入腑之輕劑也

又曰傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍

骨牡蠣湯主之

傷寒雖至八九日而表熱未解尚未可下下之而熱客胸中神不守則胸滿煩驚裏虛津液不行則小便利熱氣乘胃則譫語陽氣

內行不營於表則身重而不能轉側與柴胡湯以除胸滿而煩加龍骨牡蠣鉛丹收斂神氣而鎮驚加茯苓以行津液利小便加大黃以逐胃熱止譫語加桂枝以行陽

氣而解身重錯雜之邪斯悉愈矣

又曰傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門 傷寒發熱尚盛

惡寒 肺病大渴欲飲水其腹必滿 肝氣勝肝行乘自汗出小便利其病欲解此肝乘肺

也名曰橫刺期門 病初起便腹滿譫語非太陽之尺寸俱浮也乃知腹滿譫語為肝邪盛而乘

脾胃木行制土為直故名曰縱期門者肝之募刺之以寫肝經盛邪○發熱惡寒太陽表証也此却為肺病者肺主皮毛邪在手太陰肺經亦然也大渴引飲陽明胃熱

証也此却為肝氣勝者若胃熱則消水腹必不滿滿以肝來侮肺肺受則渴飲而不消腹必滿也金行制木木反乘金為不直故曰橫刺期門使脾肺氣平外作自汗出不

內為小便利則水散而解

此火邪欲解之候惟腰以下不得汗故不能解用五苓以和營利水飲邪從水道而散最當若白虎承氣救逆等湯咸非所宜

又曰太陽病二日反躁反熨其背而大汗出火氣入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者此為欲解也 后不可火証中曰振而反汗出為欲解故其汗從腰已下不得汗欲

小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便堅小便當數而反不數及多大便已頭卓然

而痛其人足心必熱谷氣下流故也常云可與白虎加人參湯五苓散調胃承氣湯

二日邪在表不當發躁而反躁者熱氣入裏也火熨逼汗則火邪入胃胃中水竭躁煩必發譫語遷延十餘日振慄自下利者陰氣得復火邪得泄方為欲解所以然者



見頭汗鼻衄
犀角地黃湯
腹滿小便難
梔子澀皮湯
識語發黃不
大便調胃承
氣可也

邪從外散則易從下走則難逾十餘日以來病情惟在腰以下不得汗故欲解而不
能即解其欲小便不得者陽邪閉竅也反嘔者邪欲上越也欲失溲者邪欲從前陰
出也足下惡風大便鞭小便利當數而反不數陰氣得升則頭卓然而痛身半以上之陽氣得
氣盡從大便泄出然後身半以下之陰氣得升則頭卓然而痛身半以上之陽氣得
降則谷氣下流而足心必熱欲愈之狀
且如病狀亦可見火邪為虐之甚也
雍曰常氏之意謂火氣入胃胃中枯燥故用

白虎加參湯解之然須無表証渴飲水者可服有表証者不可服以白虎解裏熱故
也小便不利者固當用五苓散然渴飲水者宜服其大便鞭者用調胃承氣湯亦小
便不利則可服小便利者反不可服振慄反汗出者若自下利皆不宜服若無上諸
証而大便鞭或不通譫語仍在者然後可服此一論証多宜審之若欲解諸症未生
時必須先去火邪宜救逆湯

又曰太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼
火與

其身發黃熱發于外陽盛則欲衄熱搏經絡迫血上行陰虛則小便難熱搏於內陰虛內熱陰陽俱虛竭熱消血氣

不能榮於身體身體則枯燥但頭汗出頸頸而還熱氣炎上搏陽而不搏於陰也腹滿微喘熱氣內鬱口乾咽爛

上火熱或不大便久則譫語熱氣入胃消耗津液甚者至噦病深者其都噦手足躁擾循衣摸

床火熱太甚則小便利者津液未竭其人可治猶為可治常氏云可桂枝去芍藥加龍骨牡蠣

救逆湯五苓散大承氣湯雍曰救逆則可陰陽俱虛身體枯燥大承氣不敢用小便

不利與五苓散發黃者茵陳蒿湯此舉火劫發汗之弊以示非傷寒之正治其致變

証之可治不可治全在津液之存否耳邪風被火熱至失其常度函盖全

又曰傷寒脉浮腎以迫劫之亡陽必驚狂臥起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍

骨救逆湯主之無論中風傷寒火劫非法也非火熱傷陰如上條即逼汗亡陽而驚

枝解未盡之表邪芍藥益陰非亡陽所宜故去之加蜀漆之辛以散火邪龍骨牡蠣之澁以固陽氣否則奔豚發矣

又曰形作傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語弱者發熱脉浮解之當

汗出愈常氏云可救逆湯形作傷寒發熱也脉不弦緊而弱弱者發熱也脉弱而發

弱者發熱而倘得脉浮則邪還于表當以辛涼解散使汗出愈

又曰太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圜血名為火逆陰虛被火不

出其人必發躁到經不解必常氏曰可依前救逆湯黃芩芍藥湯

可與犀角地黃湯

未被火者補中益氣湯被火后救逆湯



又曰脉浮熱甚而反灸之此爲實實以虛治因火而動必咽燥唾血常云可依前救

逆湯

脉浮熱甚此爲表實反灸之是實以虛治也血咽火動可必其咽燥唾血此火邪迫血上行也

又曰微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻

有力焦骨傷筋血難復也常氏曰可依前救逆湯欲其有汗宜柴胡桂枝湯

微數慎之

不可灸也因火爲邪則爲煩逆灸以追虛而乃以逐熱熱則傷血加以火氣使血散中不能濡潤筋骨故曰火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

又曰脉浮宜以汗解火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也

火性炎上腰以下陰氣獨治故重而痺

欲自解者必當先煩煩乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知

汗出解也雍曰宜少與救逆湯

欲自解而先煩汗之兆也脉浮故知汗出解也若脉不浮則煩爲入裏矣火邪諸條亦有在表入裏之不

同○活人第十方

又曰燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上

各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩

燒針發汗損陰血而驚動心氣針處被寒氣聚而成核心氣虛而腎氣乘之必發奔豚氣從小

恆上衝心是也先救核上以散寒次與桂枝加桂湯以泄奔豚之氣

又曰火逆下之因火針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

用灸以取汗不得汗而致火逆當以辛涼解之

反以下除之而邪加龍骨牡蠣者以非騰之性從潛藏之性而同歸海底則逆桂枝散

而躁乃靜矣

又曰太陽傷寒者加溫針必驚也常氏曰可依前救逆湯

火先入心心主血而火藏神血如水也神如魚也火熱

湯沸則魚驚躍不安矣腎氣乘之其將作奔豚乎

又曰太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脉細數者以醫吐之過也

一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以

醫吐之所致也此為小逆

太陽表証有解飢之法全不傷動胃氣舍此而妄用吐法吐中有發散之義故不惡寒發熱然已傷動胃氣矣關上

脉脾胃之部位也細則為虛數則為熱所以知其誤吐也一二日表邪尚寒吐之則表寒乘虛入胃故腹中飢而不能食三四日表邪成熱吐之則表熱乘虛入胃故不

喜糜粥欲食冷食朝食暮吐者食晨入于胃以胃虛不能剋化至暮胃氣行裏與邪氣相搏則胃氣反逆而食吐出矣病變由于誤治而要未為大逆當靜調以俟餘邪

之自去胃氣之自復

可與厚朴生
姜甘草半夏
人參湯

又曰太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也常氏

可與理中湯

可與半夏湯
心湯治未經
吐下者

表証仍在何
不先解其外
攻藥中何不
兼用桂枝以
脈微而沈反
不結胸知邪
不在上焦也
抵者至也水
蛭蠱蟲攻堅
而破瘀桃仁
大黃潤滯而
推熱太陽隨
經瘀熱之重

曰可與竹葉石膏湯

此亦誤吐之變太陽本惡寒今反不惡寒不欲近衣邪熱乘虛入胃外不顯熱而熱在裏故為內煩

又曰病人脈數數為熱當消谷引食而反吐者此醫發其汗令陽氣微隔氣虛脈乃

數也數為客熱不能消谷以胃中虛冷故吐也常氏云可與小半夏湯小溫中湯

熱本

而脈數則能消谷引食陽受氣于胸中今以發汗令陽氣微隔氣虛則為客熱而脈數也客氣不能消谷故脈數而反吐也

又曰太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澀腹微滿鬱鬱微煩先

此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微澀者此非柴

胡証以嘔故知極吐下也

心下溫溫欲吐鬱鬱微煩胸中痛當責邪熱客于胸中大便反澀腹微滿則邪熱已下於胃也日數雖多未經吐下

邪傳表裏之間未可下當於柴胡湯以除上中二焦之邪若其先曾極吐下者邪氣乘虛入胃為實宜與調胃承氣以下胃熱若使不由吐下則不可與也但此之欲嘔

等証實由吐下而來而非柴胡証也何以知之

又曰太陽病六七日表証仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹

當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在表故也抵當湯主之

表者經也下焦與胃皆指膀胱也俱在太陽故雖瘀熱在裏而表証仍在所謂隨經者也以脈微而沉知其裏以小腹滿而小便利知為血証若小腹滿而小便不利

劑至當不易之寔法也

無血者宜茵

陳蒿湯恐五

苓散不能散

小腹鞅黃脉

沈結之証也

則又屬膀胱之氣分爲五苓証而非血証矣

又曰太陽病身黃脉沉結少腹鞭小便不利者爲無血也小便自利其人如狂血証

諦也抵黃湯主之常氏云小便不利無血者與五苓散言身黃脉沉結少腹滿三與本爲下焦蓄血之候然向者

發黃之証相鄰必如前條之小便自利其人如狂者而後血証始諦也蓋胃中瘀熱與膀胱瘀血俱有身黃脉俱沉結小腹俱滿但以小便不利爲分別耳

又曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘葯宜抵當

丸膀胱瘀熱小便不利則小腹滿爲無形之氣病必膀胱之氣化而小腹滿者允爲有形之蓄血此二條反覆辨証見血証爲重証抵當爲重葯恐人辨認不清故重

其義如此

又曰太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也常氏曰可茯苓

桂枝甘草生薑湯猪苓湯小便少應用猪苓湯太陽病小便不利者以飲水多必心下悸心爲火藏受制於水也飲水多而

小便少者必苦裏急水停不行故苦裏急也

仲景問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名結胸也成氏曰結

胸者邪結在胸藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結爲結胸以陽受氣於胸中故爾與陰相結爲藏結以陰受之則入五藏故

此上寒下熱之症宜乾姜王芩王連人參湯

爾○尚論曰藏結一証難于辨識借結胸以詳其脈証而明外邪盛者為難治其外邪由寸浮關沉與結胸無異而藏之結關沉更加小細緊者以關居上下二焦之界脈邪由此下結內邪由此上干實往來之要衝所以病在下而反困于中也

又曰何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸口脈浮關脈小細沉緊名曰

藏結舌上白胎滑者難治常氏曰可刺關元穴此証全以外受之邪定輕重舌上有白胎滑則所感深重其互結之勢上方

熾單表單裏與表裏兩解之法俱不可用故曰難治然溫中散邪俾陰氣漸下而內消客邪漸上而外散則良工之為其所難乎

又曰藏結無陽症不往來寒熱一云寒其人反靜舌上胎滑者不可攻也常氏曰可

刺關元穴雍曰宜矣言當藏結之時表已罷除故無陽証痞雖在脇下乃素常所有非少陽傳邪故不往來其熱其人反靜無陽明之譫妄也既無

表裏之証而舌上仍有胎滑此為何故則以外感之陽邪挾痞氣反在下素痞之陰寒挾熱勢而反在上所謂丹田有熱胸中有寒熱反在陰寒反在陽陰陽悖逆故不

可攻是則調其陰陽使之相入胎滑退而後攻之則數幾乎

又曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之一作汗因作痞也

所以成結胸者以下之太早故也風為陽邪寒為陰邪中風在表而反下之則陽邪乘虛陷入而作痞二者皆是熱入皆以下早而成痞發于陰而下早亦有結胸病機變幻

乘虛陷入而作痞二者皆是熱入皆以下早而成痞發于陰而下早亦有結胸病機變幻不及痞皆省文也然發于陽而下早未嘗無痞發于陰而下早亦有結胸病機變幻

良由人之氣體不同是故君子道其常而善學者貴通其變也

又曰結胸証項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胸丸

結胸者至項亦強証之劇仰者也蓋其心下邪結緊實能劇仰者

而不能俛項勢常昂狀如柔痙非真痙也借以形其胸邪十分緊迫耳是故大黃芒硝甘遂湯則然矣而又加葶藶之逐飲杏仁之下氣白蜜之甘而且潤導滯故最良

而連滓服之名雖曰丸實則散耳譬之料敵兵之妙算真為因病制勝之良規

又曰結胸証其脉浮大者不可下下之則死常氏曰可與增損理中丸並蜜丸服如

未効用黃連七寸巴豆七粒二味搗如泥封臍上灼艾灸熱微効

此言結胸証關脉不沉者未全結也

不可以陷胸湯丸下之下則向虛之裏氣必脫未盡之表邪皆陷禍可立至如此死者謂非醫咎而何

又曰結胸証悉具煩躁者亦死

悉具者下証悉具也不下不可煩躁者津液竭也下之不可所謂邪實正虛醫者不能措手故主死也

又曰太陽症脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜

汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛

一云頭痛則胃中空虛眩千金方同

客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則為結胸大陷胸湯主之若不

結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便利身必發黃也常氏云發黃者與茵陳

當與桂枝人參湯只實理中湯選用

膏湯煎茵陳濃汁調五苓散亦可

太陽之脉本浮動數者風熱盛也而數又主虛有故邪持日久自初至今頭痛發熱未罷太陽本有

汗而曰盜本惡寒而曰反稽久而云然也醫不知其邪持太陽表仍未解而反誤邪下之因而動數變遲邪陷也浮獨不改以邪乘陽分脈不得沉也邪氣入膈而氣與邪下氣格鬪而為拒痛胃中懊憹也于是邪氣內陷而致空虛不能衝開外邪而客反衝胸動其所以短氣躁煩心中懊憹也于是邪氣內陷而致空虛不能衝開外邪而客反衝胸動其

芒硝之鹹以軟堅甘遂之甘以達飲所然必用大黃將軍之才始能成二物之功

能用

也若邪陷而不結於胸則為變之輕者矣倘邪氣入胃而通身汗出則熱越而功

發黃今但頭汗出陽不通于陰而頸以下無汗小便不利化不行而

濕停滲土鬱而蒸熱發黃于身為可必也不出其治另有其條耳

又曰傷寒六七日結胸熱實浮沉而緊心下痛按之如石硬者大陷胸湯主之

此熱實傳

裏而成結胸故不云下後而云六七日也況為在裏緊為裏實以心下痛按之硬竟謂之結胸而主之以大陷胸湯也

又曰傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水

結胸無大熱者此為水

結胸膈也但頭微汗出者大陷胸湯主之

十餘日熱結在裏下証也復往來寒熱者

但結胸裏無大熱既非下早又非熱寔乃水結在胸脇也水停胸脇而不得外泄故但頭微汗出活人云水結胸小半夏加茯苓小柴胡加牡蠣皆主之

又曰太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴者日晡所小有潮熱

云一

日晡所發

心下大煩從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

不大便五六日燥渴潮熱則似胃熱而當