

吳氏醫學述第二種本草從新目錄

卷三上

木部 香木類

柏子仁 側柏葉

松脂 松節

松花 杉材

杉材

白杉
交趾桂

紫思桂

安南桂

東京桂

肉桂
姚桂

淳桂

紫荆桂

洋桂

南桂
桂心

木犀

花桂

雲桂

桂枝
姚桂

桂葉

辛夷

黃沉

南桂
桂心

鵝掌柴

丁香

毋丁

黃熟桂

雞舌

白檀香

黃蠟沉

降真香
藤

烏藥

乳香

沒藥膏

紫金

骨香

沉香

黃沉

安息香

蘇食香

龍腦香

血竭海毋

香胎
未

打僞香

楓

樟

腦

阿魏

胡蒜

畫眉

胡桐淚

石淚

木淚



南京中医药大学图书馆版权所有

吳氏醫學述第三種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆菴培同較
杜雋望

本草從新

木部

香木類

柏子仁

辛甘而平氣香能透心脾

凡補脾藥多燥唯此香能

舒脾而偏潤助脾
藥中兼用最妙

性潤能滋肝腎

好古曰肝經氣分藥益

智寧神聰耳明目
明

香通

養血止汗

心生血汗爲心夜除

風濕愈驚癇澤皮膚辟鬼魅

多油而滑作爲

者禁興多痰亦忌

蒸晒炒研去油油透者勿

人藥畏菊花

積德堂方治黃水濕瘡真極油香油各二兩熬稠搽之如神

金之氣

西向得燥

側柏葉

味苦微微寒性濶而燥

金之氣

最清血

分濕熱止吐衄崩淋腸風尿血血痢

一切血證

去風濕諸痺歷節風痛

般節大痛善靜夜劇名

亦風寒濕

所致塗湯火傷

烏爛水調塗

生肌殺蟲炙奄凍瘡汁烏

鬚髮

丹溪以爲補陰要藥然終屬苦寒燥潛

之品唯血分有濕熱者以此清之爲宜若真陰

涼血清血分濕熱

虛者非所宜也。柏有數種，唯根上發枝數莖。

蒙茸茂密，名千頭柏。又名佛手柏，者爲真，或以

或生用桂牡蠣爲使，惡菊花宣酒。

一名松香
一名瀝青

苦甘溫燥祛風去濕化毒，生肌

止痛，熬膏而貼，崩中惡癥，牙疼研末而嘗。

齲齒
有孔

松脂
即從齒出

感太陽之氣而生燥，可去濕，且

能除熱。故外科取用極多。性溫而燥，血虛者勿

服。

水煮百沸，白滑方可用。

聖惠方治小兒緊
脣松脂炙化貼之

松節 苦溫而燥，治骨節間之風濕。

丹溪曰：能
燥血中之

祛風毒

潤益氣祛

松毛

苦溫可生毛髮宜敷凍瘡及風濕諸

忌同松脂

切細用

簡便方治陰囊濕疹
痒松毛煎湯頻洗

松花

甘溫潤心肺益氣止血除風亦可釀酒

須及時取用不堪久停令人和白沙糖印爲糕餅頗佳

善繆諸痘瘡傷損

并濕爛不癥

多食發上焦熱病

宣散腫脹

杉材

卽杉木

辛溫開發除心腹脹滿脚氣腫痛

子柳

厚纂救死方云得腳氣半夜痞絕脇塊如石昏

困且死鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下塊散

氣通方用杉木節一升橘葉一升無葉以皮代

大踰模榔七枚連子搗碎童便三升煮分三服

中醫藥大學圖書館藏書

若一服得快

利停後服

散風毒去惡氣洗毒瘡瘍

稍

挾虛著忌用

其未不生白蟻燒灰最發水

天燥補命

門火平肝

通血脉引
火歸元

肉桂 辛甘大熱有小毒氣厚純陽入肝腎而分

補命門相火之不足

兩腎中間先天祖氣力直

則無以蒸糟粕而化精微

火也人若無此真陽之火

脾胃衰敗氣盡而亡矣

益陽消陰治痼冷沉

寒下焦腹痛奔豚疝瘕疏通百脉宣道百藥又

能抑肝風

木得桂而格削桂

而扶脾土

肝木盛則剋土

辛平肝木

甘益脾土

療虛寒惡食濕盛泄瀉

土爲木冠不能防水古行

水方中多用之

如五苓散之類引無根之火降而歸元從治歟

逆結氣目赤腫痛格陽喉痺上熱下寒等證以

攻熱名曰從治若肺熱氣不下行每上

見熱證下見足冷設誤用之禍不旋踵而

生墮胎

辛熱能動血

交趾桂最佳

體鬆皮赤起花紫肉黑油味甜

多辣少

今難得

其次蒙思桂可用

以上三宗體畧鬆皮直有花紫

東京桂亦可用

肉黃油多黑油少味甜少辣多

姚桂潯桂紫荆桂

俱體重皮不直有花皆做

上味甚辣畧甜

能治病洋桂雲南桂

體皆急重切開肉內有白

稠膩甚至癲癇

皆大有害萬不可用

去粗皮其毒不在皮不

見火須臨用切碎羣藥煎好

方入煎一二沸即服

得人參甘草麥冬

見火

須臨用切碎羣藥煎好

方入煎一二沸即服

得人參甘草麥冬

良鳥生葱石脂

足籠筋急桂末和白酒塗之外腎偏腫桂末水調方十七塗之

大燥補陽

活血

桂心

入心脾血分能引血化汗化膿內托癰疽

痘瘡

同丁香治痘瘡疾渴消瘀生肌補虛寒宣氣血利

汗

節治風痺癥瘕噎膈腹滿心腹諸痛

輕解肌調營衛

桂枝

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脈發汗解肌

能利肺氣經目

治傷風

頭痛

無汗能發

傷寒自汗

有汗能止桂枝爲君芍藥

營實表調和營衛使邪從汗出而汗自止

湯能和

古曰

或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆

用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝

王好

甘草湯此又能閉汗也二義相通否乎曰仲尼云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強陰虛陽必奏之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能營衛則邪從汗解而汗自止非桂枝能閉汗孔開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和汗爲主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃以桂枝湯中有芍藥故也亦治手足痛風腸風

痛風有風痰風濕痰瘀血氣虛血虛之異桂枝用作引經腸風屬肝桂枝能平肝東垣曰桂枝橫行手臂以其爲枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則發熱內桂下行而補腎李上林曰肉桂乃近根之最厚者桂心卽在中之次厚者桂枝卽頂上細枝肉桂在下主治下焦桂心在中主治中焦桂枝在上主治上焦此本乎天者親上本乎地者親下之道也

今蘇郡市
醫慣用全
無氣味之
桂枝不殊
屬可笑

甘草湯此又能閉汗也二義相通否乎曰仲景
云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強陰虛陽
必奏之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛
氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能
開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之潤和

營衛則邪從汗解而汗自止非桂枝能閉汗孔
也○亦惟有汗者宜之若傷寒無汗則當以藥
汗爲主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服

桂枝有汗不得服麻黃以

亦治手足痛風腸風

桂枝湯中有芍藥故也
痛風有風痰風濕濕瘀瘀血氣虛血虛之異桂
枝用作引經腸風屬肝桂枝能平肝東垣曰桂
枝橫行手臂以其爲枝也又曰氣薄則發泄桂
枝土行而解表氣厚則發熱內桂下行而補腎
李上林曰肉桂乃近根之最厚者桂心卽在中
之次厚者桂枝卽頂上細枝肉桂在下主治下
焦桂心在中主治中焦桂枝在上主治上焦
桂枝木殊此本乎天者親上木平地者親下之道也

桂性偏陽陰虛之人。一切血證最能動血。不可誤投

木犀花辛溫同百藥煎孩兒茶作膏餅噙生

津辟臭化瘀治風蟲牙痛同麻油蒸熟潤髮及

作面脂 桂葉搗碎浸水洗髮去垢除風

辛夷

一名木筆花
一名迎春花

辛溫輕浮大肺胃氣分能助

胃中清陽上行通於頭腦溫中解飢通九竅利

關節主治鼻淵鼻塞

肺主鼻膽移熱於腦則鼻多濁涕而淵風寒客於腦

則鼻塞經目脳滲爲涕王水曰膽液不澄則爲濁涕如泉不白故曰鼻淵

及頭痛面

黑斑可作面脂

目眩齒痛九竅風熱之病 辛香走

宣散止
風熱

宣虛人偶感風寒而鼻塞者禁之。頭痛屬血虛。

火熾者服之轉甚。

李時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脉環鼻上行腦爲元神之府。鼻爲命門之竅。人之中氣不足。清陽不升。則

頭爲之傾。九竅爲之不利。○人之記性皆在腦中。小兒善忘者。腦未滿也。老人健忘者。腦潮空也。

凡人外見一形。必有一形畱於腦中。今人每

記憶往事。必閉目上瞪而思。索之。此卽凝神於腦之意也。

去外皮毛

毛射肺合

欬微焙。苦鶴爲使。惡石脂畏菖蒲。石膏黃黃

連

鼻淵。鼻鼽。鼻窒。鼻瘡。及痘後鼻瘡。並用辛夷研末入麝香少許。葱白蘸入數次。甚良。

沉香

辛苦性溫。諸木皆浮而沉香獨沉。故能下氣而降痰涎。

怒則氣上。能平肝下氣。

能降亦能升。故能理。

諸氣而調中

東垣曰上至天。下至泉。用與使最相宜。

其色黑體陽

故入右腎命門。煖精助陽。行氣溫中。治心腹病。

痛噤口毒痢癰癬邪惡冷風癥氣病氣淋病。

膚水腫大腸虛閉。氣虛下陷陰虧火旺者。切勿沾唇。

色黑沉水油熟者良。香甜者性平。辛。

辣者性熱。

鵝鴨斑者名黃沉。如牛角黑者名角。

熟沉咀之軟削之卷者名黃蠟沉。甚難

得半沉者爲煎香棧。香勿用鵝骨香雖。

沉而心空。竝不堪用。不沉者爲黃熟香。

沉而心空。竝不堪用。不沉者爲黃熟香。

入湯。

劑磨汁冲服。入丸散紙裹置懷中。待燥研之忌。

火

吳球活人心丸。治胃冷久呃。沉香紫蘋白豆蔻仁各一錢爲末。每柿蒂湯服五七分效。

燥煖胃溫

丁香

辛溫

純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽

火

火

火

火

火

火

陰戶治胃冷壅脹嘔噦呃逆

呃逆有痰阻氣帶食塞不得升降者

有火鬱下焦者有傷寒汗吐下後中氣大虛者
有陽明內熱失下者有痢疾大下胃虛而陰火上
冲者丹溪曰人之陰氣依胃爲養土傷則水
挾相火直冲清道而下古人以爲胃寒用丁香
柿蒂不能清痰利氣唯助火而已時珍曰當視
虛實陰陽或泄熱或降氣或溫或補或吐或下
可也古方單用柿蒂取其苦溫降氣濟生加丁
香生薑以取其開鬱散痰亦嘗收效朱氏但執
以寒治熱矯枉之過矣

痃癖奔豚腹痛口臭

丹溪曰脾有鬱火溢入肺

中燭氣上行發爲口氣治以丁香足揚湯止沸耳。唯香薷最捷。月瘕齒齧痘瘡

灰白不發

辛熱而燥非屬虛寒案勿施用

雄者顆小爲丁香雌者顆大爲母丁香卽雞舌

香異鬱金忌火

證治要訣治食蟹致傷
丁香木薑湯服五分

少靈氣

白檀香

辛溫調脾胃利胸膈療噎膈之吐

腹之疼辟鬼殺蟲開胃進食

能引胃氣上升

重乳血

紫檀香

鹹平血分之藥和營氣消腫毒敷金瘡

止血定痛

諸香動火耗氣夏月囊查辟臭尚

謂其散真氣而開毛孔况服之乎癰疽潰後諸

瘡膿多及陰虛火盛俱不宜用

宣辟惡止

血生肌一降真香 辛溫辟惡氣怪異療傷折金瘡止血定