

醫學新書序

證候有虛實寒熱。脈息有浮沉遲數。方藥有君臣佐使。醫者即
浮沉遲數。而辨虛實寒熱。配君臣佐使。用古方。療今病。不執成
心。妙參活法。此增減所以隨時應變也。然方書雖傳於古人。治
法宜酌以今病。因病求方。對症服藥。同一頭痛發熱也。外感宜
發散。而內傷則宜峻補。更有霍亂痧證。腳氣傷食。羊毛疔之殊。
同一寒熱。瘧疾也。胃熱屬陽明。脾熱則屬太陰。且有單寒單熱。
嘔吐食積。三陰之別。同一腹痛也。而寒熱虛實外。爰有痞塊濕
痰。腸癰。疝氣之分科。同一痢疾也。而赤白氣血外。又有傷肝傷
脾。噤口。休息之異治。至若疫氣時行。沿門合戶。舉平日所學方

書至此而為之一變。凡一切辛熱溫補諸藥。刪除務盡。辨之如何。口渴為時疫。不渴為感冒。一言括之矣。故此書辨證。惟時疫為較詳。然疫氣有盛衰。盛行之年。兒童皆知為疫。若夫疫氣輕微。常年不斷。四時皆有。病人微有頭痛身痛。午後稍有潮熱。飲食不甚減。力可徒步。脉微數。但食後或覺脹滿。或覺惡心。此感受疫邪之稍輕者。往往誤用補中益氣。便成痼疾。或婦科產後誤用地黃丸。四物湯。邪氣反膠固矣。或病人向有宿疾。偶逢微疫。醫家病家。誤認為原病加重。仍用前藥加減。沒世不知其誤。悔無及矣。或病者七情勞鬱。醫者誤認為心火。或誤作肝火。誤用寒涼。冀其直折。豈知疫邪不去。痰熱難清。或誤用補劑。延至

骨立而斃。雖父母妻子。不過以此數端治之。甚至白首終不究心。可慨也。夫雖然治微疫最難。治疫亦不易。同一潮熱。謔語也。時疫用達原飲。而婦科則用小柴胡。內熱煩渴用大承氣。而謔語不止。則用清燥養榮。同一夜熱也。胃實失下。則用承氣。瘀血未行。則用桃仁承氣。而癰瘡與熱入血室。則不可下。而況症有相反而互見者。自汗勿用黃耆。而飲食驚動之自汗。則當重用。症有相似而附見者。胃實發狂則用瀉。而坐臥不安。或煩躁稍定。則忌再下。茲集參觀互訂。剖析無遺。理其緒則抽繭絲。別其類則鑑毫髮。醫學細心參究。思過半矣。

光緒丁未年荷月上浣吳甯韋佩寬自序於兩崑山房

醫學新編疑似辨證凡例

一臨證治病軀命攸關此醫師所以稱司命也茲編就相類相似標出同症異治防錯誤也

一時疫與痧症大忌熱藥補劑應用諸方務須刪除溫補諸品如五苓除桂朮敗毒除參姜之例免致藥誤

一受風痰嗽皆作本症治如治之不效宜細心辨認作時疫與痧症治若仍執古方反掌生殺不可救藥

近年來每多慢痧心中昏悶並不腹痛如不知治痧毒
滯內先壞臟腑往往有飲食如常而臭不可近肺肝已
爛也速用蒺藜茜草辛蘭青陳十日內猶可治

近來有一種疫瘧投以瘧藥轉見危殆但看舌苔黃黑
以生軍荆芥黑梔枳實連翹酒芩治之立愈

近年夏秋間痧痢甚多偶飲熱湯便成重症用生蒲黃

青皮赤芍檳歸樸薄陳藿棧菴大效

近來有腹痛手足冷痧症宜查翹藿薄枳實元胡香附
水煎冷服大忌附子理中湯詳林藥樵痧書

有上吐下瀉手足厥冷用牙皂辛硃雄藿芷防桔陳薄
夏木香藥冷食每味五分立效大忌熱藥見霍亂論

余嘗謂時疫與痧證大忌補藥熱藥閱者疑信參半後
覽粵東鼠疫編實獲我心始信前哲遺書非虛語也
鼻血或便血俱因痧毒而發宜當歸續斷丹參青皮紅

花赤芍茜草連翹加童便尤效

頭痛咳嗽痧腿酸自汗用荆防辛枳陳桑皮大忌表汗
身重不能轉動肝經痧用寄奴白蒺桃仁青獨活歸尾
加蘇木立痊

足不能屈伸半身痛痧牛膝元胡澤蘭細辛枳實青皮
黑梔連翹赤芍蒲黃良效

半身不遂痧丹參查陳山甲角刺元胡赤芍姜黃甚驗

靈樞經曰冬至之日風從南方來爲虛風賊傷人者也
立春之日風從西方來萬民又皆中於虛風素問云土
位之下風氣承之風位之下金氣承之此五運六氣司
天地之門戶醫書所謂賊風口偏賊風腫痺百病皆起
於風也能知病所從起妙達精微矣

一時疫重症人所易知惟輕微時疫飲食不甚減力可
徒步脈微數此受疫最輕尤宜細辨

一時疫宜汗吐下人盡知之矣惟不標明宜汗宜下勿汗勿下看去似欠顯爽茲集悉爲標明一覽便知治法

一時氣胸滿腹脹爲裏症用承氣湯頭痛身熱爲表症用達原飲自汗而渴白虎湯胸膈痞悶淡豆豉吐之

身熱發斑舉斑湯汗不止小柴胡去參惟下後反嘔

半夏藿香湯更有數症互見者如疫愈體腫爲氣復而水氣水腫疫腫卽附注於下便查閱也

一醫書汗牛充棟記憶不易緝閱頗難此書簡之又簡
因類查核庶不致誤

一此集方書凡見於湯頭歌訣者只標明某方某湯不
註藥品從簡便也

一黃疸取仲景傷暑采李時珍傷寒用捷訣舌苔摘梁
玉瑜眼科節錄傅仁宇咽喉採張氏五味辨五臟取
龔雲林鼠疫參羅芝園疔瘡抄五經辨腳氣兼用謝

仁山時疫取吳又可痧症取林藥樵霍亂取王夢隱
瘍科取王洪緒中風取皇甫規女科參小蓬萊山館
嘔吐錄反胃各種方水腫錄十種水氣帶下取傅青
主兼收並錄節取衆長不敢掠美也

一編輯成書間參愚見如熱甚陽明瘡用法夏熟石膏
雙單蛾用青皮引入膽經生棗仁瀉胆火背後膏育
穴痛用羌活蘼葉血風瘡用陳石灰百草霜敷上四

項俱隨手奏功千慮一得亦擇善服膺之義也

一白帶屬氣與痰赤帶屬血既辨明矣妊娠門又復申說前就無孕而言後就有胎而論也

一小兒傷寒有夾驚夾食之分小兒吐痢有乳積氣積之異急慢驚風諸書多混括殊不知急驚實熱宜用

導赤瀉青慢驚虛寒宜用溫補此又不可不辨也

一傷暑卽中暑傷寒又見傷寒時疫痧症腹痛痘科及

身何辨言
五
三
頭痛目症痘黃均前後互見詳略俱呈緣此書本爲
辨證而輯故時疫與痧證屢見不嫌繁複閱者諒之
宣統庚戌荷夏天貺節

吳甯後學栗齋韋佩寬謹輯

疑似辨證目錄

症候虛實寒熱辨一

腹痛火灸針刺 寒痧 五

傷暑寒熱 貧富異治

吐瀉寒熱 口渴不渴

傷寒格 陽陰 六經現證 二

痛瀉勿作傷食 六

陽厥陰厥 二 小便赤白 三

頭痛身熱 痧症脚氣

陽黃陰黃 虛勞受驚

赤目數種 五臟現症 七

外感內傷 房勞大補 四

傷風咳嗽 痧嗽忌表 八

痘科虛實

痘疫忌補

類中風

一切眩暈

十五

痧症各種

大忌

補藥九
熱湯

大風瘡

蟲癬痧症
蝟毒

十六

腹痛各種

陰毒腸癰

十

傷寒時疫達元飲
三消飲

十七

瘧疾分經

疫瘧宜瀉

十一

疫起勿汗下

附大頭瘟

痢疾各色

痧痢忌

溫十二
補

輕疫勿作虛治

忌補

十八

泄瀉寒熱

受風水瀉

十三

中風瘡毒暑症

四時
用藥

風中臟腑

半身不遂

十四

前後虛實

內府仙方

十九

風寒時疫

二聖丸

疫瘧先後

勿作瘧治

時疫汗下

附傷寒二十
痧症

妊娠宜瀉

忌用參朮廿三

脈息沉浮

感冒暴寒

小兒時疫

勿作驚風

時疫忌補

中寒中暑
痰厥氣厥 廿一

當瀉勿瀉

虛人勿下

頭身痛宜下

汗氣汗解

瀉血發黃

失血過多廿四

譫語勿下

退熱良方廿二

自汗先後

小柴胡湯

欲吐不吐

結胸姜熨

時疫痞脹

忌破氣藥廿五

瘦弱人熱

勿用補藥

時疫夜熱

熱不退

鼠疫輕重

一日十帖

時疫發狂數種辨

三十

時疫發熱

附治濕溫

四肢冷忌熱藥

痧厥手足冷
霍亂軟脚瘟

廿七

時疫脈伏

痧痛脈伏

虛弱人勿瀉

三十一

嘔蛔宜下

附蛔結痧

疫氣九傳發熱不退

三二
三三

時疫呃逆

霍亂吐呃

表裏分傳勿汗足痿

三四

潮熱妄語

忌用滋陰藥

時疫下後身熱宜汗辨

三五