

長樂陳修園原著
吳縣潘偉如增輯

醫西學易通

上海中華新教育社印行



南京中医药大学图书馆版权所有

醫學易通卷五

長樂陳念祖原本
吳縣潘 霽增輯

熱證

傷寒

傷寒。頭痛項強。發熱惡寒。身疼痛而喘。無汗而煩躁。用大青龍湯。溫病發熱。不惡寒而口渴。用麻杏甘石湯。四時感冒。時法用九味羌活湯。表熱也。陽明經身熱自汗而渴。或服桂枝湯後大渴飲水。用白虎人參湯。中熱也。不惡寒。但惡熱。潮熱譫語。便閉。用三承氣湯。裏實而熱也。發斑譫語。時法用三黃解毒湯。犀角地黃湯。裏熱也。頭痛惡寒發熱而譫語。小便短赤。大便閉者。用防風通聖散。表裏俱實俱熱也。法詳傷寒門不贅。

○傷寒表熱詩

太陽煩躁

無汗者用

大青龍

湯

麻杏石甘

湯

溫病宗

九味

羌活湯

沖和

易老

製



南京中醫藥大學圖書館版權所有

能令表熱自肌鬆

○傷寒中熱裏熱詩

汗渴心煩白虎湯陽明經熱救中方三黃

解毒散

犀角熱歸裏結實未成

此法良

○傷寒熱入於裏而實及表裏熱實詩

晡潮便結語言狂熱結陽明承氣湯無汗不便表裏實防風通聖散

兼長

大青龍湯

麻黃

參錢去節桂枝

去皮

炙草

各壹錢

杏仁

拾枚去尖

生薑

壹錢伍分

大棗

貳枚

石膏

貳錢伍分

水煮麻黃去沫內諸藥同煎溫服取微汗

麻杏甘石湯

麻黃

貳錢去節

杏仁

柒枚去尖

炙草

壹錢

石膏

肆錢

水煎同上

白虎湯

見瘧

承氣湯

見結



九味羌活湯

羌活

陽入太

蒼朮

陰入太

防風

各壹錢五分

白芷

入陽

川芎

入陰

黃芩

入陽

生地黃

養液以

細辛

入少陽

甘草

各壹錢

加生薑

伍片

葱頭

貳根

如傷風

加

自汗去葱頭

加白朮

倍防風

胸滿

去地黃

加枳殼

桔梗

喘加杏仁

夏加

石膏

知母

汗下兼行

加大黃

按生地黃

黃芩

雖能退熱

然初起

不可遽用

苦寒

不如用

姜豉

桑潤

以

養汗源

且能助正氣

而驅風邪

○歌曰

通

沖和湯

內用防風

羌活

辛蒼草

與芎

汗本於陰

芩地妙

三陽解表

一方

三黃解毒湯

一名黃連解毒湯

黃柏

黃芩

黃連

梔子

各貳錢

甘草

壹錢

水煎服

○歌曰

黃連解毒君

黃連

黃檗

梔子

並水煎

主治太陽邪外束

陽明溼盛熱初

醫學易簡

卷二

熱

傷寒

一



傳

犀角地黃湯

生地

叁錢

犀

貳錢

丹皮

貳錢

芍藥

貳錢

水煎服

柯韻伯曰氣為陽血為陰陽密乃固陽盛則傷陰矣陰平陽秘陰虛者陽必湊之矣故氣有餘即是火火入血室血不榮經即隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便有在經在府之分要皆心肝受熱所致也心為營血之主心火旺則血不安故用生犀生地酸鹹甘寒之味以清君火肝為藏血之室肝火旺則血不守故用丹皮芍藥辛苦微寒之品以平相火此方雖曰清火而實滋陰之劑蓋失血則陰虛陰虛則無氣故陰不足者當補之以味勿得反傷其氣也若用芩連膽草梔柏以瀉其氣則陽之劇者苦從火化陽已衰者氣從苦發燎原而飛越矣

○歌曰

犀角地黃芍藥丹血升胃熱火邪干斑黃陽毒皆堪治或益柴苓總伐

肝

防風通聖散見中

附三黃湯治三焦實熱一切有餘大證大便結者

黃芩 大黃 黃連 水煎服

二黃湯治上焦火旺頭面大腫目赤腫痛心胃咽喉口舌耳鼻熱盛及生瘡毒者

黃芩 黃連 甘草 水煎食後服

○歌曰

三黃湯泄三焦熱。並用芩連與大黃。若祇上焦邪火旺。芩連甘草二黃

湯

三黃石膏湯治傷寒陽證表裏大熱而不得汗。或已經汗下過經不解。發疹發斑諸證。凡表實無汗。赤鼻乾舌燥大渴煩燥不眠。譫語鼻衄發黃。

而未入裏成實者。均宜主之。

石膏 參錢 黃芩 梔子 黃連 黃柏 麻黃 各壹錢 淡豆豉 貳錢 加

葱壹根水煎熱服

○歌曰

熱口糜齩爛喉痺



南京中醫藥大學圖書館藏

三黃倍用石膏煎麻豉梔芩與檉連有汗減麻添用桂便澹去石葛根先

口糜齕爛喉痺雙蛾單

口糜齕爛出血心肺胃之火盛也宜甘露飲主之俗名雙單蛾即方書所謂喉痺也雙蛾易治單蛾難治由心腎之火乘肺也宜刺手大指出血又以導赤散加桔梗貝母射干治之是為反治法二證若服涼藥不愈宜用附子片以白蜜蒸熟含嚥其汁又以通脈四逆湯加猪膽汁人尿與服又以桂枝八味湯加黃連少許水浸冷服是為從治法此證不可純用涼藥恐上熱未除中寒復起毒氣乘虛入腹上喘下泄手足厥冷爪甲青口如魚口者死

口糜齕爛詩

口糜齕爛火之炎只盼慈雲甘露飲需喉痺生蛾導赤散從治以熱攻熱謂之

從治四逆通脈四逆湯加桔梗繼鍼砭

甘露飲亦見食



通脈四逆湯見暑證

腎氣丸見痰飲

導赤散

生地叁錢木通 甘草各貳錢竹葉貳拾片水煎

○歌曰

導赤原來地與通。草梢竹葉四般攻。口糜莖痛兼淋瀝。泄火功歸補水中。

涼膈散治心火上升、中焦燥實、口渴、目赤、頭眩、口瘡、唇裂、吐血、衄、大便秘、諸風、痰、胃熱、發斑、發狂、及小兒驚急、痘瘡、黑陷

連翹肆兩大黃酒浸黃芩酒炒甘草兩各貳梔子炒薄荷兩各壹芒硝伍錢

研末每服叁錢竹葉生蜜煎

○歌曰

涼膈硝黃梔子翹。黃芩甘草薄荷饒。再加竹葉調蜂蜜。膈上如焚一眼消。

消

清胃散治胃經溼熱、齒齦腫痛、或牽引頭腦、或面發熱



升麻 甘草 生地黄 丹皮 當歸 黃連 各等 研末水煎服

○歌曰

清胃散君生地黄歸連甘草用為良佐以丹皮疏血滯升麻直達味辛涼

血證

吐血咯血瘀血鼻衄齒衄舌衄大便血血淋血崩等證皆為血不循經之病經者常也血所常行之路也血生於中焦半隨衝任而行於經絡半散於脈中而充肌腠皮毛若外有所感內有所傷則血不循經道而行從上而溢則為吐血瘀血咯血鼻衄齒衄舌衄等證從下而洩則為大便血溺血血淋婦人血崩等證不必有五藏六府之分也且五藏有血六府無血觀剖諸獸腹心下夾脊包絡中多血肝內多血心脾肺腎中各有血六府無血近時以吐血多者謂吐胃血妄甚凡吐五藏血即死若吐衄崩下諸證皆是經絡散行之血也謂因五藏六府之病而致血則可謂血從五藏六府之中而出則不可也余讀本草經內經金匱及千金等書別有所悟



新刮青竹茹一捻隨宜佐以寒熱補泄之品一服即效所以然者人身之脈絡不和則膚充熱肉澹滲皮毛之血不循行其常道則上吐衄而下崩中今得竹茹以和之是以竹之脈絡通人之脈絡而為治也若從風寒得者麻黃湯加味可用若從酷暑得者竹葉石膏湯白虎湯六一散可用若從秋燥得者瀉白散可用諸經之火熾甚者四生丸可用六味地黃湯亦可偶服皆治標之劑也若固元湯之平補理中湯之溫補甘草乾薑湯之補其上黃土湯之益其中下與褚氏遺書所言血雖陰類運之者其陽和二句均得各大家不言之秘余於此證各方俱加鮮竹茹叁肆錢為效甚速或另以大黄桃仁行血破滯之劑折其銳氣滑伯云血既妄行遺失故道不去血行瘀則以妄為常曷以禦之且去者自去生者自生何虛之有尤在涇曰去者自去生者自生人易知也瘀者未去則新者不守人未易知也細心體驗自見此證不專屬於熱因內經有不遠熱則熱至血淫血泄之病生句故列於熱證

○血證詩

血隨氣布四字要循經失其度奔騰苦迅靈寒冬則麻黃湯加減蓋以

行於經絡精細皮毛環轉流行不息斯不致上溢下溢之患矣李東溫

垣麻黃人參芍藥湯暗合此意張隱菴用紫蘇梗時賢用荆芥亦同溫

春桂去秋宜瀉白散夏膏靈湯皆以石膏為主白虎四生丸妙在鮮荷

六味湯功歸澤瀉解到理中湯黃土湯外導行脈絡竹皮青

○下血久不止用斷紅丸詩任脈衝脈血海督脈司權專取奇經得祕傳續斷參錢同側柏鹿茸壹

具斷紅丸側柏葉炒香續斷酒炒各叁錢鹿茸壹具酥炙醋煮阿膠為

血久不止證督而布護也此為下

○血證窮極用當歸補血湯詩血雖陰類運陽和內經及漢唐運藉黃耆黃耆質輕而行用倍多少佐

當歸陰得主陰以常則所為主不得妄笑他門外怪云何甲子歲余治某下漢

以黃耆作脹阻之另服止血套藥愈後變證百出

瀉白散
桑白皮叁錢地骨皮貳錢黃芩甘草各壹加粳米貳錢水煎服

○歌曰

瀉白甘桑地骨皮。再加粳米四般宜。秋傷燥令成痰嗽。火氣乘金此法奇。

竹葉石膏湯

石膏

捌錢

麥冬

肆錢

半夏

叁錢

人參

貳錢

炙草

壹錢

鮮竹葉

捌錢

粳米

壹錢

叁錢

水

叁杯半

煎貳杯

入粳米

煎至米熟

量捌分服

○歌曰

炙草人參半夏冬。石膏竹葉水叁鍾。再將粳米叁錢入。米熟湯成勿太

濃。

固元湯

人參

炙草

當歸

各貳錢

大棗

貳枚

炙耆

肆錢

煨薑

壹錢

水煎服

○歌曰

固元湯首用參耆。炙草歸薑大棗施。專治氣虛難攝血。深培根本力能

支。



六味丸

證見厥

白虎湯

證見瘧

麻黃湯

證見傷寒表

四生丸

生地黄

生艾葉

生側柏

生荷葉

各等

搗為丸如雞子大每服壹

丸以沸湯沖服

○歌曰

地黃側柏艾荷生。四味專除血妄行。妙在行瘀兼止血。治標用此配丸

精

理中湯

證見暑

當歸補血湯

證見頭痛

黃土湯

竈心黃土

捌錢原方肆錢

生地

黃芩

白朮

阿膠

炙草

附子

炮各錢伍分壹

水煎服余每用去附子加炮薑捌分



南京中醫藥大學圖書館版權所有

○歌曰

竈心黃土伏龍肝。朮地膠芩附草安。或用炮薑須去附。便崩吐衄總宜餐。

甘草乾薑湯傷寒論

乾薑貳錢炮紫生甘草肆錢水煎服

斷紅丸

側柏葉炒續斷酒炒各錢

鹿茸壹具酥炙醋煮阿膠為丸每服肆伍丸烏梅湯

米湯隨意下

○歌曰

下血難禁用斷紅。叁錢側續壹酥茸。阿膠醋煮和丸服。米飲梅湯任意供。

聖愈湯治一切失血過多煩熱作渴睡卧不安等證即四物湯加人參黃耆

按黃氏論血證云肝主疏泄肺主收斂肝氣不達則血瘀肺氣不斂則血脫肝血下陷則遺泄於便溺肺血上流則吐衄於口鼻血盛於肝脾



醫學易通 卷五 熱 血證

卷五

而虛於肺胃。其脫於便溺。則由肝脾之寒。其脫於口鼻。或緣肺胃之熱。而總緣於陽衰土溼。中氣頹敗。其上宜清。而下宜溫。溫則木生。清則火長。近世庸工。誤認陰虛。專用清潤。滋陰生寒。致中氣堙寒。君相失根。失

枉人命。百不一救也。黃氏治血證。妙在升脾降胃。暖水達木。應用不爽。調劑陰陽。實為回天。

破瘀湯。治全載諸友。黑男婦血瘀等證。目皆青。

茯苓丹皮。桂枝。丹參。桃仁去皮。乾薑。首烏蒸各參錢。甘草貳錢。

水煎溫服。

○歌曰


破瘀桃仁與桂枝。丹參薑草牡丹皮。首烏滋潤乾薑燥。瘀血消除男婦

宜。

仙露湯。主治血。

麥冬。半夏。柏葉。白芍。杏仁各錢。五味壹錢。貝母。甘草各貳錢。

水煎溫服。衄血之證。火泄金刑。氣傷血沸。宜清金斂肺。以回逆流。而



必並降胃氣。降胃必用半夏。近世誤以血證為陰虛。半夏性燥不宜血家。非通人之論也。若上熱非盛而衄。證時作則全因中下溼寒。當加乾薑茯苓溫燥之藥。若大衄之後氣泄陽亡厥逆寒冷。宜加參耑薑附以續微陽。清潤之藥切不可用。

○歌曰

仙露湯中味貝冬。夏甘芍柏杏仁同。溼寒加入薑苓品。厥逆參耑桂附功。

靈雨湯

治大吐血者

甘草

人參

錢各貳

茯苓

半夏

乾薑

柏葉

丹皮

錢各叁

水煎溫服

吐血之證

中下溼寒凝瘀上湧。用人參甘草補中培土。茯苓乾薑去濕。

溫寒。柏葉清金。欬血。丹皮疏木。行瘀。自是不易之法。尤當重用半夏以

降胃逆。瘀血既吐。鮮血自不再來。若下寒甚者。蜀椒附子亦當大用。其

零星咯吐。紅鮮不凝者。雖有上熱亦非實火。稍加麥冬貝母。略清肺熱。

總以泄溼培土為主。不可過用苦寒也。



○歌曰

靈雨參苓柏草薑。丹皮半夏用惟良。下寒須記添椒附。上熱微加貝麥嘗。

白茅湯 治零星吐血者

人參 甘草 錢各貳 茯苓 半夏 麥冬 去心 茅根 白芍 錢各叁 五味子

壹錢 水煎溫服 血之寒吐紅鮮者。雖緣土溼胃逆而肺家不無上熱。

泄溼降逆之中。自宜加清肺之藥。若相火極旺。則加黃芩而倍白芍。仲

景三黃泄心湯。是治相火之極旺者。但此等頗少。未易輕用。若上熱不

敵下寒之劇。當大溫水土。清潤諸法。切不可用也。

○歌曰

茅根用治吐零紅。芍夏參苓草味冬。火旺加芩須謹慎。下寒清潤勿輕

庸。

桂枝黃土湯 治便血兼治痔漏脫肛等證。即前黃土湯加桂枝。

寧波湯 治血