

補陣

景岳全書

卷五十三



景岳全書卷之五十三圖集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

山陰 余士仁元德氏訂

補陣

四君子湯一 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦面黃  
或胸膈虛痞吞酸痰嗽或脾胃虛弱善患瘧痢等證

人參

白朮

茯苓各二錢 炙甘草一錢

加薑水煎服或加粳米百粒

加味四君湯二 治痔漏下血面色痿黃怔忡耳鳴脚軟氣弱

及一切脾胃氣虛口淡食不知味又治氣虛不能下血以致

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

黃芪炙

白扁豆炒

右水煎服或為末每服三錢滾湯調服

生附四君湯三方在小兒四三

治脾胃虛寒吐瀉

五味異功散四

治脾胃虛寒飲食少思嘔吐或久患咳嗽虛

浮氣逆腹滿等證

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

陳皮各二錢

此即四君子湯加陳皮也



北京中医药大学图书馆版权所有

右加薑水煎服

六君子湯五

治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢或食飲難

化或嘔吐吞酸或咳嗽喘促若虛火等證須加炮薑其功速

即前四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

加味六君湯六

治一切脾胃虛弱泄瀉及傷寒病後米穀不

化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒脾疳瀉痢

人參

白朮

黃芪

山藥

甘草

白茯苓

各一兩

砂仁

厚朴

肉豆蔻

麝香煨各七錢

右每服一兩用水煎服或為細末用米湯調服二錢不拘時

香砂六君子湯七

治過服涼藥以致食少作

嘔或中氣虛滯  
惡心脹滿等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮各一錢  
砂仁炒

藿香各八分  
炙甘草六分

右薑水煎服

局四物湯八

治血虛營弱一切血病當以此為主

熟地黃

當歸各三錢  
川芎一錢

芍藥二錢

水二鐘煎服

薛加味四物湯九

即前方加山梔柴胡丹皮

正加味四物湯十

治血熱陰虛諸痿四肢軟弱不能舉動

當歸一錢

五味子九粒  
熟地三錢

麥冬



黃柏

蒼朮

各一錢

白芍藥

川芎

各七分

人參

黃連

各五分

杜仲七分

牛膝

足不更者

知母各三分

水二鐘煎一鐘空心溫服酒糊丸服亦可

更加減四物湯十一

方在寒陣九九

治腸風下血

命柴胡四物湯十二

治日久虛勞微有寒熱脈滑而數者

當歸

熟地

芍藥

川芎

各錢半

柴胡八分

人參

黃芩

半夏

甘草各三錢

加生薑三片水煎服

氏柴胡四物湯十三

方在痘疹一四三

治疹後餘熱

奇效四物湯十四

方在婦人百十一

治肝經虛熱血崩

增損四物湯十五

方在婦人百十

治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯十六

方在攻陣二六

治血虛臟結

良加減四物湯十七

方在婦人百十二

治婦人血積

四物二連湯十八

方在婦人百十三

治婦人陰虛內熱

局八珍湯十九

治氣血兩虛調和陰陽

即前四君子四物湯相合也○本方加黃柏知母即名補陰八珍湯方見外科三二

十全大補湯二十

治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗肢體困

倦眩暈驚悸肺熱作渴遺精白濁二便見血小便短少便泄閉結喘欬下墜等證



即前八珍湯加黃芪肉桂各一錢

局人參養榮湯二一 治脾肺俱虛惡寒發熱肢體困倦食少

作瀉口乾心悸自汗等證

人參

黃芪

當歸

白木

炙甘草

桂心

陳皮各一錢 熟地

五味

茯苓各七分 芍藥錢半

遠志五分

加薑棗水煎服

金小建中湯二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥等證

炙甘草

桂枝

生薑各三兩 大棗十二枚

芍藥六兩

膠飴一升



右六味以水七升煮取三升去查內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可建中湯以甜故也

按此卽桂枝湯加膠飴也今方俱改而爲錢而以阿膠代膠飴殊失本方之妙矣

金匱大建中湯二三 治胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝上下疼痛不可觸近

人參二兩 蜀椒二合炒 乾薑四兩 膠飴

右三味以水四升煮取一升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分二次溫服如一炊頃可食溫粥覆之

局十四味大建中湯二四 治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛



及榮衛失調積勞虛損形體羸瘠短氣嗜臥漸成勞瘵者

人參

白朮

茯苓

甘草

川芎

當歸

白芍

熟地

黃芪

肉桂

附子炮

麥冬

半夏

肉蓯蓉

酒浸各等分

右咀每服五錢水二鐘薑三井蜜二枚煎八分空心溫服

八味大建中湯二五

治中氣不足手足厥冷小腹攣急或腹

滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩寃四體痠痛

及無根失守之火出於肌表而為疹為班厥逆嘔吐等證

人參

甘草

錢炙各一黃芪炙

當歸



白芍 酒炒

桂心 各二錢 半夏

附子 製各二錢半

人參建中湯二六

治虛勞自汗

卽前小建中湯加人參二兩煎法同

黃芪建中湯二七

治諸虛羸瘠百病

卽前小建中湯加黃芪一兩五錢煎法同

當歸建中湯二八

治婦人血虛自汗

卽前小建中湯加當歸二兩煎法同

三味建中湯二九

治表虛自汗

芍藥二錢

甘草一錢

官桂五分

薑三片 棗一枚 水煎服



北京中医药大学图书馆版权所有

東垣補中益氣湯三一

治勞倦傷脾中氣不足清陽不升外感

不解體倦食少寒熱瘧痢氣虛不能攝血等證

人參

黃芪炒

白朮炒

甘草炙各錢半

當歸一錢

陳皮五分

升麻

柴胡各三分

右加薑棗水煎空心午前服

東垣調中益氣湯三二

治溫熱所傷體重煩悶口失滋味或嘔

嗽稠粘寒熱不調體倦少食等證

黃芪一錢

人參

炙甘草

蒼朮各五分

橘紅

木香

柴胡

升麻各二分

水煎空心服○一方有白芍三分五味十五粒

歸脾湯三三 治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡

驚悸盜汗嗜臥少食或大便不調心脾疼痛瘡痢鬱結或因

病用藥失宜尅伐傷脾以致變證者最宜用之

人參

黃芪

白朮

茯苓

炙甘草

各二錢遠志

當歸各一錢

木香

炙甘草各五分

水二鍾加圓眼肉七枚煎七分食遠服

愚按此湯之用木香特因鬱結疼痛者設如無痛鬱等證必  
須除去木香以避香燥豈不於氣虛血動者為尤善乎又遠  
志味辛氣升而散凡多汗而躁熱者亦宜酌用

加味歸脾湯三四

治脾經血虛發熱等證



即前方加柴胡山梔各一錢

人參湯三五 治吐血咯血後宜服并治吐血不止

人參一兩爲細末

五更時用雞蛋清調如稀糊每用二錢茶匙抄服服訖却臥

參盡則效○愚意此方固佳其或有惡腥者但以真牛乳稀

調頓熟或溫飲之凡無火及微火者豈不更妙○一方治吐

衄咯血不止用人參爲末以雞子清投新汲水攪勻

調服一錢

獨參湯三六

治諸氣虛氣脫及反胃嘔吐喘促粥湯入胃即

吐凡諸虛證垂危者

用人參二兩水一升煮取四合乘熱頓服日再進之兼以人

參煮粥食之尤妙

奪命散三七

治傷寒瘧疾陰陽不明或誤用藥致病愈困煩

躁發渴及婦人胎前產後受熱瘧疾

上黨人參七錢

水二鐘煎一鐘去渣連確浸新汲水中取冷

一服而盡若鼻上有汗滴尤妙

<sup>嚴</sup>氏參附湯三八

治真陽不足上氣喘急呃逆自利臍腹疼痛

手足厥冷嘔惡不食自汗盜汗氣短頭暈等證

人參

製附子

用須參倍於附或等分不拘五

錢或一兩酌宜用薑水煎服

○良方有丁香十五粒

名加減參附湯

參歸湯二九

此卽團參散見小兒門十亦名人參湯見婦人

門七七○治心虛盜汗

人參

當歸等分

右先用猪心一枚破作數片煎湯澄取清汁煎藥服

參朮膏四十

治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗散元

氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參

白朮等分

用水煎膏化服之○一方用白朮一斤人參四兩切片以流水十五碗浸一宿桑柴文武火煎取濃汁再用重湯熬膏入真白蜜收之每以白湯點服

參朮湯四一

治氣虛顫掉泄瀉嘔吐等證



南京中医药大学图书馆版权所有

人參

白朮

黃芪各二錢白茯苓

陳皮

炙甘草各一錢

甚者加製附子一錢

水二鐘煎八分食遠服

仲景白朮附湯四二

一名白朮附子湯○治中寒中氣不足四肢

逆冷口噤牙關緊急痰盛脈弱風虛頭眩頭重苦極不知飲食

白朮二兩

炙甘草一兩附子一兩半炮去皮

每用五六錢姜五片棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服或

用此化蘇合丸連進三服效

白朮附湯四三

治寒濕腰痛重冷小便自利

白朮炒

製附子各一兩杜仲炒半兩