

傷寒雜病論卷第十二

漢長沙太守南陽張機仲景述

辨霍亂脈證并治

問曰。病有霍亂者何。答曰。嘔吐而利。此名

霍亂。

師曰。霍亂屬太陰。霍亂必吐利。吐利不必



傷寒雜病論卷第十二

漢長沙太守南陽張機仲景述

辨霍亂脈證并治

問曰。病有霍亂者何。答曰。嘔吐而利。此名

霍亂。

師曰。霍亂屬太陰。霍亂必吐利。吐利不必



盡霍亂。霍亂由寒熱雜合。混亂於中。熱氣上逆。故吐。寒氣下注。故利。故曰霍亂。有飲食不節。擁亂於中。令消化失力。消化失力。則升降不利。濁應降而上升。故吐。清應升而下降。故利。名曰宿食霍亂。乃有霍亂兼少陽少陰暑氣疫氣者。若胃寒脾濕。亦令

吐利。非霍亂也。

本通行佚

問曰。病發熱。頭痛身疼。惡寒吐利者。此屬

何病。答曰。此非

誤通行本

霍亂。霍亂自吐下。

今惡寒身疼。

通行本缺此一字。有又利止三字。

復更發熱。

故知非霍亂

通行本缺此五字。

也。

霍亂吐嘔下利。無寒熱。脈濡弱者。理中湯

主之。

本通行
佚行

人參

白朮

甘草

乾薑

各三
兩

右四味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服

一升。日三服。

霍亂先吐後利。腹中滿痛。無寒熱。此傷於

食。名曰宿食霍亂。脈濡弱而塞者。白朮後



苓半夏枳實湯主之。

通行本伏

白朮

三兩

茯苓

四兩

半夏

一升

枳實

半兩

右四味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫

三服。吐多者。頻服。少少與之。

霍亂。胸中滿。欲吐不吐。下利時疏。無寒熱。

腹中絞痛。脈俱弱。寸口結者。此食停於上。

宜燒鹽湯吐之。令穀氣空虛自愈。

通行
佚本

霍亂。往來寒熱。脇下痛。下利吐膽汁。此為

兼少陽。脈弱而弦者。小柴胡加白朮茯苓

主之。

通行
佚本

柴胡

半斤

黃芩

三兩

人參

三兩

白朮

三兩

茯苓

四兩

甘草

炙三兩

半夏

洗半升

生薑

三兩

大棗

十二枚擘

右九味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫

三服。餘如小柴胡加減法。

霍亂吐嘔下利清穀。手足厥冷。此為蕪少

陰。脈沉而遲者。宜四逆湯主之。

通行本佚

人參

二兩

乾薑

半兩

甘草

炙二兩

附子

皮一枚生用去
破八片

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。

分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三

兩。

霍亂吐下發熱。必其人脾濕胃燥。此為兼

陽明。脈濡弱而大者。宜白朮石膏半夏乾

薑湯主之。

通行本佚

白朮

三兩

石膏

半斤

半夏

半升

乾薑

二兩

右四味。以水六升。煮取二升。去滓。溫服

六合。日三服。

三兩
去皮

霍亂吐甚。虵出。下利時密。時疏。身微熱。手

足厥冷。面色青。此為蕪厥陰。脈沉弦而緊

者。宜四逆湯加吳茱萸黃連主之。若唇青

目內陷。或如瘕狀者。皆不可治。通行本佚

附子一枚 乾薑一兩半 甘草二兩炙

人參二兩 吳茱萸半升湯洗七遍 黃連一兩

右六味。以水六升。煮取二升。去滓。溫服

一升。日再服。

霍亂吐利口渴。汗出短氣。此為蕪暑氣。脈

弱而濡者。宜白朮茯苓半夏澤瀉括萎根

湯主之。通行本佚

白朮三兩茯苓四兩半夏半升

澤瀉一兩六銖括萎根三兩

右五味。以水六升。煮取三升。去滓。分溫



三服。短氣甚者。加人參二兩。

霍亂兼疫氣。必霍亂。死後則尸氣流傳。相

染為病。當按法治之。但劑中宜香氣之品

以逐之。沉香丁香香蒲入湯佳。

通行
本佚

飲水即吐。食穀則利。此為胃寒。非霍亂也。

脈遲而弱。人參乾薑半夏生薑湯主之。

通行

佚本

人參二兩 乾薑三兩 半夏半升

生薑二兩

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。溫服

一升。下多者。加朮二兩。

腹中脹滿而痛。時時上下。痛氣上則吐。痛

氣下則利。此為脾濕。非霍亂也。脈濡弱而滑。茯苓白朮澤瀉乾薑厚朴湯主之。通行本佚

茯苓

四兩

白朮

三兩

澤瀉

二兩

乾薑

二兩

厚朴

一兩六銖

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

霍亂證有虛實。因其人本有虛實。證隨本

轉。虛者脈濡弱。實者脈急促。虛者宜理中

湯。實者宜黃連黃芩乾薑半夏湯主之。通行

本佚

或四和。以米五升。煮取三升。去滓。服。

理中湯方

見前

黃連黃芩乾薑半夏湯方

黃連六兩。黃芩六兩。乾薑六兩。半夏六兩。以水一斗。煮取六升。分三服。熱多飲。

黃連一兩
黃芩一兩
乾薑六兩
六銖兩

半夏半升

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服

一升。隨時消息與之。吐利止。停後服。

霍亂轉筋。必先其時風濕邪注於筋。脈當

濡弱。時一弦急。宜桂枝茯苓細辛白朮防

