

東醫四象新編

朝鮮李濟馬先生著



這一本「東醫四象新編」是朝鮮著名漢醫李濟馬先生遺著之一。今年四月朝鮮平壤醫科大學神經科漢醫金光一大夫來我校學習，出此書以交流。今年又是李濟馬先生誕生一百二十週年紀念。李先生精研漢醫學，功力湛深，他的「四象」醫學，乃是從整體出發，由我國內經靈樞通天篇進一步發展起來的。現在黨和政府大力發揚祖國醫學，我們可以從李先生著述中得到很大啟發和幫助，爰為翻印。

江蘇省中醫藥學校

一九五七年六月



東醫四象新編序

咸北東武李公濟馬四千年後醫學中興之神乎本草素問蓋出於神農黃帝之手而文字澆漓不可盡信周秦漢以來扁鵲有名而張仲景得成家著書南北朝隋唐宋間朱肱最著活人書出至元李杲王好古朱震亨危亦林繼之於明有李梴龔信備得之我朝許浚著寶鑑其勤勞功業可謂善且美矣然以太陽太陰少陽少陰論病證發明而太陽太陰少陽少陰人之臟腑性情要藥不之詳矣惟李公所著東醫壽世保元以四象辨別其人之要藥而經試之廣濟之術發前人所未發非精入神者不能與也曰元成菴德必甫得其經驗方選其壽世語分為內外篇名之曰東醫四象新編將刊行於世囑予以弁首予亦有意焉而莫能因不敢辭為之語曰醫學不若東武所學非醫學也劑方不出東武所方非劑方也云爾

歲戊辰菊月秋甲午肅丹山人張鳳永書

東醫四象新編凡例

一此編架作三統上統係太陰人方藥中統係少陰人方藥下統係陽人方藥各以所係橫看而不可豎看

一太陽人病證與要藥另附于三統前以備考看以其象人方藥疏畧

一病名則三統并蒙上豎看而不可橫看如中風症太陰人用調胃續命少陰人用川芎桂枝八物君子少陽人用獨活地黃荊防地黃皆倣此

東醫四象新編目錄

內篇

四象辨論

四象經驗

通四象臟腑所在圖

通四象全體所屬圖

四象人要藥

外篇

用藥彙分

太陽人用藥

四象劑方

經驗方

附海松子論

葛茸論

血餘論



東醫四象新編內篇

四象辨論

東武曰靈樞書中有太少陰陽五行人論而略得外形未得臟理

少陰陽人早有古昔之見而未盡精究也

又曰張仲景所論太陽病少陽病陽明病太陰病少陰病厥陰病以病證名目而論之予所論太陽人少陽人太陰人少陰人以人物名目而論之

✓太少陰陽人以今時目見一縣萬人數之大畧論之則太陰人五千人少陽人三千人少陰人二千人太陽人絕少一縣或三四人十餘人而已

太陽人腦顙之起勢盛壯而腰圍之立勢孤弱性質長於疏通材幹能於交遇形貌則方圓有果斷氣臟腑則肺大肝小性情則有暴怒深哀欲進而不欲退龍之性病證則外感腰脊病內觸小腸病

太陰人腰圍之立勢盛壯而腦顙之起勢孤弱性質長於成就材幹能於居處形貌則肌肉堅實修整正太臟腑則肺小肝大性情則有浪樂深喜欲靜而不欲動牛之性病證則胃脘受寒表寒肺受熱裏熱



少陰人膀胱之坐勢盛壯而胸襟之色勢孤弱性質長於端重材幹能
於党與形貌則肌肉浮軟簡易小巧臟腑則脾小腎大性情則有
喜深樂欲處而不欲出驢之性病證則腎受熱表熱胃受寒裏寒
少陽人胸襟之色勢盛壯而膀胱之坐勢孤弱性質長於剛武材幹能
於事務形貌則唇頰淺薄上盛下虛有剽銳之氣臟腑則脾大腎少
性情則有暴哀深怒欲舉而不欲措馬之性病證則脾受寒表寒胃
受熱裏熱

太陽人體形元不難辨而人數稀罕故最為難辨其病噎膈反胃解衣
亦自易辨而未至重險完若無病壯健人

太陽女體形壯實而肝小腸穿子宮不足故鮮能生產少陽人或育短
小靜雅恰似少陰人觀其病勢寒熱仔細執證不可誤作少陰人治

太陰少陰人體形畧相彷彿而觀其病證則必無不辨

太陰人虛汗則完實少陰人虛汗則大病

太陰人陽剛堅密則大病少陰人陽剛堅密則完實

太陰人有怔忡胸膈證少陰人有手足挽亂證
太陰人有目眚上引證又有目睛內疼證少陰人無此證

少陰人平時呼吸平均而間有一太息呼吸太陰人無此證

太陰人癰疾惡寒中能飲冷水少陰人不飲冷水

太陰人體形長大而亦或有矮短少陰人體形矮短而亦多有長大者

太陰人恒有恹心恹心至怕心而怔忡怔忡太陰人病之重證也少陽

人恒有懼心懼心至恐心而健忘健忘少陽人病之險證也

太陽人恒有急迫之心少陰人恒有不安定之心

少陰人有咽喉證其病太重而為緩病也太陽人有八九日大便不通

非殆證也小便旺多則完實而無病

太陰人汗液通暢則無病少陽人大便善通則無病少陰人飲食善化

則無病

太陽人噎膈則胃脘之上焦散豁如風太陰人痢疾則小腸之中焦窒

塞如霧

少陽人大便不通則胸膈必如烈火少陰人泄瀉不止則臍下必如水

冷

太陰人恒戒樂心喜心少陰人恒戒喜心樂心

太陽人恒戒怒心哀心少陽人恒戒哀心怒心



太陽人有解你病解你者上體完健而下體解你筋疲不能行去之謂也

太陽人大便宜滑小便宜多面色宜白不宜黑肌肉宜瘦不宜肥鵠尾下不宜有塊塊小易治塊大難治

人物形容仔細商量再三推移如有迷惑則參互病證明見無疑然後可以用藥最不可輕忽而重病險證一貼藥必殺人

○四象經驗

太陽人內觸小腸病用獼猴藤植腸湯外感腰脊病用五加皮壯脊湯

太陰人傷寒背頰表病用麻黃發表湯

太陰人寒厥四日而無汗者重證也五日而無汗者險證也用熊膽散或寒多熱少湯加蟾蜍五七介大便秘滑者用乾栗薏苡仁大便秘燥者

用葛根大黃等屬

太陰人素有怔忡無汗氣短者泄瀉數十日不止用太陰調胃湯加枳根一錢日再服十日泄瀉方止

太陰人瘟病粥食全不入口以太陰調胃湯加升麻黃芩各一錢連用十日汗流滿面疫氣少減而二日大便秘不通用葛根承氣湯五日而

病解

有一太陰人素病咽嗑乾燥而面色青白表寒或泄蓋乾燥者肝熱也
或泄者胃脘寒也初用寒多熱少湯病解後用調理肺元湯四十日獲

生

太陰人三陽病變為陽毒面赤眼紅身發斑黃或下痢黃赤六脉洪大
用葛根解肌湯黑奴丸

太陰人瘟疫其證增寒壯熱頭面煩項赤腫咽喉腫痛昏憤二聖救苦
丸一服即汗一汗即愈

太陰人肝熱素患眼病者得瘟疫始發用熱多寒少湯至五日大便或
滑或泄至六日有不通用葛根承氣湯連六日病解復用熱多寒少
湯大便燥加大黃一錢滑泄太多則去大黃如此調理二十日完健
太陰人十歲兒得裏熱粥食不入口有時飲冷水至十一日大便不通
已四日矣用葛根承氣湯十七日而愈

太陰人癰瘡遍滿全體大如大錢小如小錢已為三年以熱多寒少湯
加蘗本二錢大黃一錢二十八貼用之大便始滑又秘燥又用二十
貼其病快效



太陰人年五十近衰者燥熱引飲小便多大便秘用熱多寒少湯加藥

本二錢大黃一錢二十貼得效年少者燥熱用此方三百貼得效

一週年不免死凡太陰人秘燥小便多而引飲者不可不早治

太陰人陰血耗渴耳聾目暗脚弱腰痛則拱辰黑元丹鹿茸大補湯

調胃升清湯

太陰人泄瀉表寒證用太陰調胃湯表熱證泄瀉用葛根蘆卜子湯

太陰人咳嗽用太陰調胃湯鹿茸大補湯拱辰黑元丹

太陰人哮喘重證也用麻黃定喘湯

太陰人胸腹痛危證也用麻黃定痛湯

太陰人小兒泄瀉十餘次無度必發慢驚風用補肺元湯豫備慢驚

太陰人腹脹浮腫用乾栗蠐螬湯此病極危險十生九死之證也

太陰人卒中風急用清心元而遠志石菖蒲各一錢灌口皂角末三分

吹鼻傍人執病人足腕屈伸兩脚若少陽人大忌撓動少陰人起坐

則可也不可撓動兩肩

太陰人中毒吐瀉用麝香



少陰人傷風發熱惡寒即腎受熱表熱病也無汗者用桂枝湯川芎桂枝湯香蘇散芎歸香蘇散藿香正氣散有汗者用黃芪桂枝湯補中益氣湯升湯益氣湯三日連服而汗不止用桂枝附子湯升陽益氣附子湯

少陰人如狂者腎陽困熱也小腸硬滿者大腸怕寒也腎熱用川芎桂枝湯黃芪桂枝湯八物君子湯升補之怕寒者用藿香正氣散香砂養胃湯和解之

少陰人陽明病口燥嗽水不欲嚥用藿香正氣散香砂養胃湯八物君子湯

少陰人大便秘燥者巴豆下之

少陰人胃家實發狂證先用巴豆全粒後用獨參八物君子湯以壓之少陰人十一歲汗多亡陽是危證也黃芪桂枝附子湯連服二貼前後

一月餘用附子凡八兩矣

少陰人無腹痛下利等證而六七日猝然厥手足遂冷用人參吳茱萸湯獨參八物湯

少陰人外感病六七日不得汗解而死者皆死於厥陰也四五日觀其

病勢用黃芪桂枝湯八物君子湯四五貼

少陰人傷寒吐蛔急用理中湯加陳皮官桂白何烏

少陰人重病危證藥不三四服藥力不壯也又不連日服則病加於愈也

少陰人腹痛自利不渴用何首烏附子理中湯

少陰人下利清穀者用藿香正氣散香砂養胃湯薑朮寬中湯官桂附子理中湯

少陰人四肢厥冷吐利不渴頭疼頭汗眼痛面唇指甲青黑身如被杖用人蔘桂枝湯人蔘附子理中湯

少陰人直中陰經乾霍亂格時屬中伏節候用巴豆如意丹

少陰人下利數次全腹浮腫用桂附藿陳理中湯加人蔘官桂二錢日四服

少陰人小兒下利清水面色青黯氣陷如睡用獨蔘湯加生薑二錢陳皮砂仁各一錢日三服

少陰人下利腹脹身體疼用官桂附子理中湯

少陰人下利清水舌乾口燥四肢厥冷指甲清黑用官桂附子理中湯

少陰人十歲免下利清水不止用白何烏理中湯六貼不止急用附子
理中湯六貼變清為黑又二貼黑泄亦愈

少陰人計窮力屈而心煩燥傷寒欲吐不吐但寐者用參萸湯四逆湯
官桂附子理中湯吳茱萸附子理中湯

少陰人陰盛隔陽危如一髮用官桂附子理中湯或加吳茱萸

少陰人傷寒七八日身黃如梔子色腹滿發黃用茵陳橘皮湯瘴疸丸
或巴豆丹

少陰人結胸無熱證用半夏桂枝生薑湯赤白何烏寬中湯三物白散
或巴豆丹

少陰人陰黃證用茵陳橘皮湯茵陳四逆湯欲利小使用乾薑良薑陳
皮青皮香附子益智仁

少陰人病有二吉證人中汗一也能飲水一也有二急證發熱汗多一
也下利清水一也

少陰人吐血用獨參八物湯咽喉用獨參官桂理中湯
少陰人食消即浮腫之屬而危證用芎歸葱蘇理中湯

少陰人浮腫瘰癧肝一部脰服連用五部其病即效少陽人虛勞服一部

吐血而死

少陰人浮腫服海鹽自然汁日半匙四五日大減一月完健

少陰人咽喉痛經年不愈服金蛇酒即效

少陰人痢疾大蒜三顆清蜜半匙同煎三日服即效

少陰人滿身瘡人參末塗傅即效

少陰人背癰宜早以火刀裂瘡

少陰人半身不遂服鉄液水即效

少陰人小兒腹癰用川芎桂枝湯二三貼

少陽人發熱惡寒身痛不汗煩燥即脾受寒表寒病也用荊防敗毒散

少陽人口苦咽乾目眩耳聾胸脇滿用荊防敗毒散荊防導赤散荊防

瀉白散

少陽人病無論表裏病手足掌心有汗則病解手足掌心不汗則全體

皆汗而病不解

少陽人結胸證連用白虎湯

少陽人表病用甘遂裏病用石膏

少陽人身熱頭痛泄瀉用豬苓車前子湯荊防瀉白湯身寒腹痛泄瀉

則用滑石苦參湯荆防地黃湯

少陽人忽然有吐用荆防敗毒散身熱頭痛泄瀉用石膏身寒則用黃

連苦參

少陽人小兒一吐後泄瀉身熱頭痛揚手擲足引飲用荆防瀉白散日

三貼兩日六貼泄瀉方止又用五六貼而安

少陽人身熱頭痛引飲用石膏無論泄瀉有無用荆防瀉白散加黃連

菰蔞仁各一錢地黃白虎湯

少陽人身熱頭痛非輕證而兼有泄瀉則危險也用荆防瀉白散日三

服連日

少陽人恒有腹痛用六味地黃湯六十貼而愈

少陽人十餘年腹痛用滑石苦參湯

少陽人少年恒有滯證痞滿間有腹痛腰痛用獨活地黃湯一百日內

二百貼而病愈

少陽人傷寒發狂譫語用六味湯而喘促不定更用白虎湯自未申至

亥子時凡用石膏八兩病愈後有眼病用石膏黃柏末各一錢日再

服七八日後眼病亦愈

少陽人傷寒得熱多寒少之病白虎湯連服三貼皆憤有動風之漸耳
聾譫語舌上白胎煎石膏一兩滑石一錢頓服翌日又用石膏一兩

滑石一錢五六日前後用石膏十四兩而病愈

少陽人得頭痛身熱表寒病用黃連芩薤羌活防風等屬少愈三日後
發狂譫語用地黃白虎湯連三貼翌日加石膏一兩至七八貼用後

始愈

少陽人十七歲女兒有食滯腹痛頭痛寒熱用生地黃石膏各六兩知
母三兩翌日用荊防地黃湯加石膏四錢連二貼乃安睡於是每日
用此藥四貼一朔內凡用石膏四十五兩乃愈

少陽人三陽合病頭痛面垢譫語遺尿煩渴腹痛身重用豬苓車前子
湯地黃白虎湯

少陽人裏熱大便秘不通三晝夜則危險也用地黃白虎湯三四貼翌日
又用二三貼大便秘乃通

少陽人表病有頭痛證用荊防敗毒散裏病用白虎湯

少陽人消渴證上消用涼膈散火湯中消用忍冬地骨皮湯下消用熟

地黃苦參湯

少陽人汗者陽弱也用涼膈散

少陽人上消中消下消百之一百必死也用獨活地黃湯十二味地黃湯

少陽人中風嘔吐用獨活地黃湯吐血用十二味地黃湯浮腫則用木

通大安湯荆防地黃湯加木通日再服

少陽人傷寒喘促先用靈砂一分溫水下因用荆防芩姜等藥

少陽人痢疾用黃連清腸湯

少陽人癰病有向兩日發者即勞癰也不發日用獨活地黃湯二貼發

日用荆防敗毒散二貼待惡寒發作時連二貼一月內用獨活地黃

湯四十貼荆防地黃湯二十貼

少陽人內發咽喉外腫項頰謂之纏喉風二三日內殺人最急上唇人

中穴癰人中左右逼近處一指許發腫雖微如粟粒亦危證也用涼

膈散火湯陽毒白虎湯重者用水銀熏鼻方一炷而項頰汗出則愈

或輕粉末一分五里乳香沒藥甘遂末各五分和均糊丸一服盡

少陽人小兒食多肌瘦用肥兒丸忍冬地骨皮湯

少陽人少年一脚微不仁痺風用輕粉甘遂龍虎丹二三次得効

