

濟陰綱目

卷三

卷四

三

赤白帶論

濕熱帶下

風邪帶下

虛損帶下

虛寒帶下

帶下滑脫

白濁白淫

虛勞論

虛勞平補諸方

無熱虛勞

有熱虛勞

骨蒸勞瘵

治傳尸勞

血風勞方

濟陰綱目卷之三

關中 武之望叔卿父輯著

武林

汪

灝洋子父訂正

西陵 汪 淇儋子箋釋

天都

查

望子周父參閱

○赤白帶下

○論帶下由勞傷衝任

凡巢氏所論不可稽者什九卽此言亦無徵治之法何可憑也

倍字作帶字看

三句透微

嚴氏曰巢氏病源論婦人有三十六疾者七瘕八癰九痛十二帶下也而帶下不顯其證今人唯知赤白二帶耳此由勞傷衝任風冷據於胞絡婦人平居血欲常多氣欲常少百疾不生或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交并則赤白俱下其脉右手尺浮浮爲陽陽絕者無子若足冷帶下輕則漏下甚則崩中皆爲不榮血肝不藏血

所致其脉寸口弦而大弦則爲滅大則爲乾滅乾爲虛寒乾爲虛寒虛相搏其脉爲革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治。

雖分三十六

種總是冷熱

微甚所致故

後人只以赤

白二症總之

產寶云帶下三十六疾者是十二癥九痛七害五傷三固謂之三
十六疾也十二癥者是所下之物一者如膏二者如青血三者如
紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝血九如清
血似水十如米泔十一如月浣十二如經度不應期也九痛者一
陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月來時腹痛六氣滿
來時足痛七汗出陰中如蟲蠶痛八脇下皮痛九腰痛七害者一
害食二害氣三害冷四害勞五害房六害妊七害睡五傷者一竅
孔痛二寒冷痛三小腹痛四臍不仁五子門不正引背痛三固者

胞門子戶即

子宮俗所謂

兒腸也其傳

臟有徵傳腑

無症豈二而

一與又曰病

生于帶則臍

腑大說似臍

空文蓋以帶

脉管束諸經

故總結之究

其治一也

心包絡與胞

門不同其曰

宮

門非包絡豈

胞門與包絡

同也白帶痛

風以下兩方

皆丹溪所定

月水閉塞不通其餘二者文缺不載而仲景所說三十六種疾皆由于臟冷熱勞損而夾下起於陰內也

○論帶下五色因風邪入於胞門

良方云婦人帶下其名有五因經行產後風邪入胞門傳於臟腑而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷足少陰腎經黑如衄血人有帶脉橫於腰間如束帶之狀病生於此故名爲帶李氏曰平時陰陽過多及產後亡血下虛風邪乘虛入於胞絡宜暖宮丸加薑附吳茱萸或黃耆建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸○白帶兼痛風者二陳湯加蒼柏南星牛膝川芎兼頭風鼻涕

者蒼柏辛芎散

然專主于濕
痰並無風冷

入胞之治豈
前人之言非

也亦補未備
耳

此指任帶二
脉而言其曰

熱入大小腸
之論無據當

從邪入包門
致傳臟腑結

于帶脉之說
為正

發寬結之義
以明濕熱之

端

○論帶下屬濕熱寬結不散

保命集云赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于脉
故津液涌溢是謂赤白帶下本不病結緣五經脉虛結熱屈滯于
帶故女子臍下痛陰中綿綿而下也經曰任脉為病男子內結七
疝女子帶下瘕聚王註云任脉自胞上過帶脉貫于臍上故男子
內結七疝女子帶下帶脉起於季脇章門似束帶狀今濕熱寬結
不散故為病也經曰脾傳之腎名曰疝瘕小腸寬結而痛出白一
名曰蠱所以為帶下寬結也寬屈者屈滯而病熱不散先以十棗
湯下後服苦練丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣
潔古云治帶下寬結而痛者先以十棗湯下之次服苦練丸大延
胡索散調之是先攻後補之法也

湯見雜病痰飲大延胡
素散方見產後腹痛條

脈証與胃實

熱而曰寒痰

者蓋爲敗濁

之液既聚成

痰則與本氣

不相和故痰

積之久自成

冷物曰寒痰

者因病人自

意其冷而言

狀亦有熱者

不可不明如

酢水酸水也

豈屬寒耶

腎主秘藏熱

乘之則堅凝

之性失矣故

不能秘藏而

帶下絕其上

源之法妙甚

○論帶下痰實宜吐下

子和云一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載矣命予脈之診其兩手脈俱滑大而有力得六七至常上熱口乾眩暈時嘔酢水予知其實有寒痰在胸中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈

息城李左衙之妻病白帶如水竅漏中綿綿不絕臭穢之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石硫黃薑附之藥重重燥補污水轉多戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰二三升次日下污水斗餘行三遍汗出周身至明旦病人云汚已不下

矣。次用寒涼之劑服及半載。產一男。

積痰恐不能
滲入膀胱若
言溫熱則可

丹溪云帶與漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱無人知此只宜升

提。甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加白朮蒼朮仍用丸子。

方中並無升

肥人有帶多是濕痰用海石半夏南星炒蘗青蘗蒼朮川芎○瘦

提法惟川芎

人帶病少如有多是熱用炒蘗蛤粉滑石川芎青蘗橘皮

一味爲血分

羅先生法或十棗湯或神佑丸或玉燭散皆可用之。虛者不可峻

升氣之藥

攻實者可行

丹溪治帶與

白濁同是男

潔古云治結痰白帶以小胃丹半饑半飽津液下數丸候鬱積行

却服補藥

女之濕熱一

也

○論帶下虛寒宜溫補

淋漓不已屬

虛寒然亦有

李氏曰帶下有虛寒帶腥臭者因小水淋瀝不已或崩中暴下求

藥陽虛故悲不

產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升經脈凝滯衛氣下陷精氣累滯于下焦蘊積而成白滑如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大烏鷄丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽陽氣虛極帶下腥臭多悲不樂桂附湯腹痛陰冷者四物湯加桂附常用酒煮當歸丸小烏鷄丸琥珀調經丸

飛霞醫案

韓氏曰山妻年三十餘十八胎九殯八天會先君松藩難作賤兄弟皆西奔妻驚憂過甚遂昏昏不肖人事口唇舌皆瘡或至封喉下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少醒至欲自縊自悲不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥薰

用熱還熱此
從治也非其
確見者不能
用惜不言脉

有產後下瀉
上則口舌喉
瘡醫以理中
丸用紫雪爲
衣服之兩病
皆愈亦真對
真假對假之
意

元氣是先天
真氣生氣是
後天穀氣
埋物者宿痰

也
女金丹能令
老婦娠妊方

蒸其下。則熱暈欲絕。四弟還脉之。始知爲亡陽證也。大哭曰。示嗣未立。幾誤殺吾嫂。急以鹽煮大附子九錢爲君。制以薄荷防風佐以薑桂芎歸之屬。水煎入井水冷與之。未盡劑。鼾鼻熟睡。通宵覺即能識人。時止一嗣子二女。相抱痛哭。疎戚皆悲。執友趙憲長驚曰。君何術也。弟曰。方書有之。假對真對真。爾上乃假熱。故以假冷之藥從之下。乃真冷。故以真熱之藥反之。斯上下和而病解矣。繼後主以女金丹。錯綜以二三方。不但去其疾。且調治元氣。庚午生子一。今應襲也。壬申生一子。去年又患瘧疾。十三月亦主以養元氣。調生氣。待飲食大進。然後劫以毒藥。吐下塊物甚多。投以附子湯三錢而愈。不責効。且暮間其用女金丹。卽勝金丸也。得之異人。倍加香附。而視氣血之偏者。又加薑黃條芩。倍川芎之屬。取効。

古菴藏書

甚多予念無子者往往有之。翻思予得子之難其苦何如。乃次第

錄其方。併女金丹以濟人云。

女金丹即勝金丸方見求子

○論帶久枯涸宜潤補

血生于氣故有可兼四君者

準繩云。帶下久而枯涸者。濡之。凡大補氣血皆所以濡之。如以四物湯爲末。煉蜜丸。梧子大。空心米飲下三四十九。以療年高婦人白帶。良驗。皆潤劑也。

○治帶下當以壯脾胃升陽氣爲主

薛氏曰。徐用誠先生云。帶下白。屬氣而赤。屬血。東垣先生云。血崩久則亡陽。故白滑之物下流。未必全拘于帶脉。亦有濕痰流注下焦。或腎肝陰淫之濕勝。或因驚恐而木乘上位。濁液下流。或思慕爲筋痿。戴人以六脉滑。大力用宣導之法。此瀉其實也。東垣以

王說各主一見凡診治此症當須辨別

前論五色分
屬五臟而無

治法此以五

臟之中分治

法分虛實尤

見的據

下數方為此

翁家法

肥痰癰火之

說為丹溪先

生認病總訣

何嘗教人泥

定一方也雖

不可輕治而

火濕二字終

莫能逃若以

此穩當之言

不可輕則寧

古之十棗下

脉微細沉緊或洪大而虛用補陽調經乃兼責其虛也丹溪用海

石南星椿根皮之類乃治其濕痰也竊謂前証皆當壯脾胃升陽

氣為主佐以各經見証之藥色青者屬肝用小柴胡加山梔防風

濕熱壅滯小便赤澀用龍胆瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱用六

味丸色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香

散等藥色白者屬肺用補中益氣加山梔色黃者屬脾用六君子

加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬腎用六味丸氣血俱虛八

珍湯陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃

蘗氣虛痰飲下注四七湯送六味丸不可拘肥人多痰瘦人多火

而以燥濕瀉火之藥輕治之也

一婦婦腹脹脇痛內熱補熱月經不調肢體痠痲不時吐痰或用

太無之補作
玉燭與小胃

丹之類可輕
用之與予不

敢爲丹溪後
爲欲止今之

後口耳

立齋得方處

在認症確未

到處在不言

脉惟以二十

餘年之痰症

故可用六君

以補脾治濕

用六味以治

水沅爲痰皆

治本而納氣

滯百者也但

朝夕反用又

其獨見也

清氣化痰。喉間不利。帶下青黃。腹脇膨脹。又用行氣之劑。胸膈不

利。肢體如麻。此乃鬱怒傷損肝脾。朝用歸脾湯。以解脾鬱。生脾氣。

夕用加味逍遙散。以生肝血。清肝火。百餘劑而愈。

一婦人久瘧。兼帶發熱。口乾體倦。用七味白朮散。加麥門、五味。大

劑煎與。恣飲。再發稍可。乃用補中益氣。加茯苓、半夏。十餘劑而愈。

一婦人頭暈吐痰。胸滿氣喘。得食稍緩。苦于白帶。二十餘年矣。諸

藥不應。此氣虛而痰飲也。痰飲愈而帶自愈。遂朝用六君子湯。夕

用六味地黃丸。不月而愈。

一婦人耳鳴。胸痞。內熱。口乾。喉中若有一核。吞吐不利。月經不調。

兼之帶下。予以爲肝脾鬱結。用歸脾湯。加半夏、山梔、升麻、柴胡。間

以四七湯。下白丸子而愈。

平言綱目

卷三 婦帶下

六

以上七案內
五症皆治濕
痰而兼升補
者以立齋各
盛當時非久
病必不延之
故每以升補
爲效學立齋
者須得此解
不然徒讀父
書矣

一婦人吞酸飽滿。食少便泄。月經不調。服清氣化痰丸。兩膝漸腫。寒熱往來。帶下黃白。面痿體倦。此脾胃俱虛。濕痰下注。用補中益氣。倍用參朮。加茯苓半夏炮薑而愈。

一婦人帶下。四肢無力。予曰。四肢者主也。此脾胃虛弱。濕痰下注。以補中益氣。濟生歸脾二藥治之而愈。

一婦人帶下黃白。怒則胸膈不利。飲食少思。或用消導利氣之藥。痰喘胸滿。大便下血。予曰。此因脾氣虧損。不能攝血歸源。用補中益氣。加茯苓半夏炮薑。四劑頓減。又用八珍。加柴胡山梔而痊。

○論帶久不止當補衛厚脾

李氏曰。凡崩中下帶。或用升提。如升陽調經湯。或用收澁。如伏龍肝散。白芷散。然暫止而終不止者。蓋衛司開闔而爲榮血之主。脾

不善用古方者。苟能解之。便自能用。收流劫奪。皆是奇兵。用其合宜。便是正法。此蓋重注正治。有可者。不可偏廢也。水體不伸。便能生濕。開門既能泌。別清濁則滑。濁之物。未必皆爲滲入膀胱。而從溺道出也。如絞腸病。豈由膀胱來。

胃爲血海水液之會。衛氣與胃氣俱虛。則血液無所約制。是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者。四君子湯加草果丁香木香以燥水健脾者。或用理中湯加陳皮半夏。或單半夏丸。用芎歸湯煎下。或補中益氣湯平胃散皆補衛厚脾。使氣血自循。故輒而不專于收澁以劫奪之也。

○論帶下濕熱藥用正治從治之異。

方氏曰。婦人赤白帶下。多是怒氣傷肝。夫肝屬木。脾屬土。肝邪乘脾。木氣剋土。則脾受傷而有濕。濕而生熱。熱則流通。所以滑濁之物。滲入膀胱。從小便而出也。丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者。是矣。雖然。古人曾有用辛溫治之而愈者。不知苦寒之藥。正治之法也。辛溫之藥。從治之法也。蓋濕熱怫鬱于內。肚腹疼痛。赤白帶。

耶

讀此論乃見

今古治法不

悖則丹溪之

言亦補先賢

未備之旨

元禮爲丹溪

弟子而相背

如此自是一

種翻案

下非辛溫從治而能開散之乎然濕熱未曾拂鬱但止赤白帶下

不若用苦寒正治之爲當也

○論帶下雜治法

戴氏曰赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大率下

白帶多固有下赤者並宜順氣散吞震靈丹仍佐艾附丸或米飲

調沙參末帶下不止成疰羸者四物湯加煨牡蠣粉半錢吞固腸

丸多服取效有帶疾愈後一二月或再發半年一發先血而後下

帶來不可遏停蓄未幾又復傾瀉此名漏帶最爲難治○下截之

血小腹主之有因血虛而虛熱陷入小腸致小便澀痛色如白泔

或成沙粒皆不可作淋治用冷劑宜以四物湯五苓飲各半貼和

漏帶之名始此亦或升補可愈也

燥溫合煎此

元禮獨創不

讀此便不知

用此

煎

陰中熱者一

陽初動也所

言三說識有

之

此方白芷蔡

根排膿散血

白芍生肌枯

蟬燥濕和以

密蠟此生肌

托裏之治也

脉經曰婦人

腸中有膿為

榮衛相干血

為敗濁有可

下不可下之

異宜參考之

間下血而以

半產瘀血在

○論室女帶下

產寶云未出女子有三病何也答曰女子一病者經水初下陰中

熱或當風臥或扇風二病者太衝脉盛氣盛則內熱以冷水洗之

三病者或見丹下驚怖者若三者一有所受後必有帶下之証也

方用神仙

聚寶丹

○排膿

準繩云帶下並腸有敗膿淋漏不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷

痛此蓋敗膿血所致卒無已期須以此排膿用白芷一兩單葉紅

蜀葵根二兩白芍藥白礬燒枯各半兩為末同以蠟丸如桐子大

空腹或飯前米飲下十丸或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之

○消瘀血

腹又白屬帶下然非仲景

不能若又非仲景之言不

能信如暮熱

小腹急滿為

瘀血在內則

可以掌熱煩

燥口乾而用

溫經藥則人

皆難之况此

湯有肉桂半

夏吳茱萸誰

省信服據此

宜屬寒今皆

主熱

此素問語以

症白淫之所

自筋癆有宗

筋也惟久

仲景云間煩人年五十所病下利數十日不止暮即發熱小腹裏

急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經

半產瘀血在小腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫

經湯主之方見調經門

○論白濁白淫

大全云婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不升降或

因勞傷于腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為漚便之道

胞冷腎損故有白濁白淫

李氏曰白淫蓋緣思想無窮所願不得意淫于外人房太甚發為

筋痿久為白淫謂白物淫如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥

又有日夜流津如清米泔或如黏膠者謂之白崩與白淫大同多