

名醫方論卷二

新安羅東逸先生評定

慈水柯韻伯先生參閱

小半夏湯 三方合論 一條

嘔家本渴。渴為欲解。今反不渴。心下有支飲故也。

半夏一升生薑半斤以水七升煮取一升半分溫再服

小半夏加茯苓湯

治卒嘔吐心下痞悶間有水眩悸者

半夏一升生薑半斤茯苓三兩

煎服如前

外臺茯苓飲

治心胸中有痰飲宿水自吐出水復心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 人參 白朮各三兩 枳實二兩 橘皮半兩 生薑四兩

右六味水六升煮取一升八合分三服如人行八九里再進之

趙以德曰。嘔為痰飲動中湧而出之。嘔盡本當渴。渴則可徵支飲之全去。今反不渴。是其飲尚留。去之未盡也。用半夏之辛溫生薑之辛散其欲出之飲。則所留之邪

江陰錢榮光性方重校正



自盡矣。半夏生薑皆味辛，可治膈上痰。心下堅，嘔逆目眩，然搏必心受水凌，故加茯苓以去水伐腎邪。安心神也。後方加人參枳實橘皮，此由上中二焦氣弱，水飲入胃，脾不能輸歸於肺。肺不能通調水道，以致停積為痰，為宿水吐之，則下氣因而止渴。是為虛氣滿不能食，當補益中氣。以人參白朮為君，茯苓逐宿水，枳實調諸氣為臣，開脾胃，宣揚上焦，發散凝滯，則陳皮生薑為使也。凡積飲既去，而虛氣塞滿其中，不能進食，此症最多。

瀉白散

治肺氣熱盛，咳嗽而喘，面腫身熱。

桑白皮 地骨皮 甘草 水煎服。

李楚重曰：經云：肺苦氣上逆，上逆則上焦鬱熱，氣鬱生涎，火鬱生熱，因而治節不行。壅甚為喘滿腫嗽。瀉白者，正金之令，驅氣之逆，非劫金而瀉之也。法使金清則氣肅。桑根白皮，稟西方燥金之氣，甘草能入肺而瀉氣之有餘。地骨皮涼平，調不足之陰，能清陰中之火。滋腎子以清母，甘草益土和中，且生能瀉火，補土母以食子，瀉補交致，金元自正。於以佐桑皮而行諸氣之憤鬱，鮮不達矣。較之黃芩知母，苦寒傷胃者遠也。夫火熱傷氣，救肺之治有三：傷寒邪熱侮肺，用白虎湯除煩，此治其標；內症虛

火燶陰。用生脉散益陰。此治其本。若夫正氣不傷。鬱火又甚。則瀉白散之清肺調中。標本兼治。又補二方之不及也。

地骨皮飲

治陰虛火旺。骨蒸發熱。日靜夜劇者。婦人熱入血室。胎前發熱者。

四物湯加

地骨皮

牡丹皮

水煎服。

陰虛發
熱當分
三陰

柯韻伯曰。陰虛者。陽必湊之。故熱。仲景曰。陰弱則發熱。陽氣下陷入陰中。必發熱。然當分三陰而治之。陽邪陷入太陰脾部。當補中益氣以升舉之。清陽復位而火自熄也。若陷入少陰腎部。當六味地黃丸以對待之。壯水之主而火自平也。陷入厥陰肝部。當地骨皮飲以涼補之。血有所藏而火自安也。四物湯為肝家滋陰調血之劑。加地骨皮清志中之火以安腎。補其母也。加牡丹皮清神中之火以涼心。瀉其子也。二皮涼而不潤。但清肝火不傷脾胃。與四物加知柏之濕潤而苦寒者不同矣。故逍遙散治肝火之鬱於本藏者也。木鬱達之順其性也。骨皮飲治陽邪之陷於肝臟也。客者除之勿縱寇以遺患也。二方皆肝家得力之劑。

升陽益胃湯

治脾胃虛。怠惰嗜卧。四肢不收。時值濕熱。體重節痛。口乾舌燥。飲食無味。大便不



調小便頻數。食不消。兼見肺病。涵浙惡寒。慘慘不樂。面色不和。

羌活 獨活 防風 柴胡 人參 白朮 桔芩 甘草 黃芪 白芍

黃連 澤瀉 陳皮 水煎服。

吳鶴皋曰。脾土虛弱。不能制溼。故體重節痛。不能運化精微。故口乾無味。中氣既
傳化失宜。故大便不調。小便頻數也。涵浙惡寒。肺弱表虛也。面色不樂。陽氣不伸也。
是方半夏白朮能燥溼。茯苓澤瀉滲之。二活防風柴胡能升舉清陽之氣。黃連厚朴
熱陳皮平胃氣。參芪甘草以益胃。白芍酸收用以和榮而協羌防。柴胡辛散之性。益
古人用辛散必用酸收。所以防其峻厲。猶兵家之節制也。

清脾飲

治痰積成瘧。

青皮 厚朴 草果 半夏 柴胡 白朮 甘草 桔芩 黃芩 水煎服

柯韻伯曰。瘧為少陽病。治分六經。邪留於募原。有遠近之殊。其發有虛寢先後之異。
而此湯之治瘧。寢以痰積。名之清脾者。究其因而治其本也。先哲云。無痰不成瘧。無
積不成瘧。是脾為生痰之源。而積之不磨者。亦因脾之不運也。胃主內。脾主消。而胃
為脾之表。凡欲清脾。必先平胃。青皮厚朴草果皆氣味兼厚之品。取以倒陽明之食。

正以利太陰之輸也。然宿痰留結，更有藉於茯苓半夏之淡滲辛散，是恐奇之不去，則耦之所以攻脾之寢者。半胃除痰，每相須耳。積因於寒痰，因於熱，是寒熱往來為瘧之標，而寢為痰積之本矣。必用芩柴以清之，更合於少陽之治。然此為土中濡火，不是直攻少陽，乃清脾之義也。火土平而無以善其後，則瘧之因寢而成者，未免因虛而劇。甘朮之必須，又防微杜漸法耳。

溫膽湯

治熱嘔吐苦虛煩驚悸不眠，痰氣上逆。

竹茹 枳實 半夏 甘草 陳皮 生薑 茯苓

右七味水煎服。

羅東逸曰：胆為中正之官，清靜之府，喜寧謐，惡煩擾。喜柔和，不喜壅鬱。蓋東方木德，少陽溫和之氣也。若大病後，或久病，或寒熱甫退，胸膈之餘熱未盡，必致傷少陽之和氣，以故虛煩驚悸者，中正之官以熇蒸而不寧也。熱嘔吐苦者，清靜之府以鬱炎而不謐也。痰氣上逆者，土家濕熱反乘而木不得升也。如是者，首當清熱及解利三焦。方中以竹茹清胃脘之陽，而臣以甘草生薑調胃以安其正。佐以二陳，下以枳實，除三焦之痰壅，以茯苓平滲，致中焦之清氣，且以驅邪，且以養正。三焦平而少陽平。



足正義

三焦正而少陽正。膽家有不清寧而和者乎。和即溫也。溫之者寔涼之也。若膽家真畏寒而怯。屬命門之火衰。當與乙癸同源而治矣。

導赤散

治心熱小便黃。赤莖中痛。熱急不通。

生地黃 木通 甘草梢

右三味水煎服

李楚重曰。經云。兩精相搏謂之神。是神也者。待心中之真液。腎中之真氣。以養者也。故心液下交而火自降。腎氣上承而水自生。前賢以生脈救真液。是治本不治標也。導赤散清邪火。是治標以固本也。錢氏制此方。意在制丙丁之火。必先合乙癸之治。生地黃涼而能補。直入下焦。培腎水之不足。腎水足。則心火自降。尤慮肝木妄行。能生火以助邪。能制土以盜正。佐以甘草梢。下行緩木之急。即以瀉心火之寔。且治莖中痛。更用木通盜小腸之滯。即以通心火之鬱。是一治兩得者也。瀉心湯用黃連。所以治寔邪。寔邪責木之有餘。瀉子以清母也。導赤散用地黃。所以治虛邪。虛邪責水之不足。壯水以制火也。此方涼而能補。較之用苦寒伐胃。傷其生氣者遠矣。



治滯下赤白便膿血後重諸證

芍藥二兩

當歸

黃連各五錢

檳榔

木香

甘草各二錢

桂半

黃芩一錢

大黃

每服半兩水煎服。痢不減。加大黃。

羅東逸曰。本方注云。瀉而便膿血。知氣行而血止也。行血則便膿自愈。調氣則後重自除。至今推為要言。然非知本之論也。夫滯下本太陰病。長夏令行。土潤溽暑。太陰本虛。暑溼不攘。土濕則木鬱。木鬱則傷土。太陰失健運。少陽失疏達。及飲食失節。化至秋金收令行。火用不宣。鬱蒸之久。而滯下之症作矣。是始為暑傷氣。繼為氣傷血。因而為白。為赤。為兼赤白。下迫窘急。腐穢不去。以成後重。方以芍草為君。用甲己化土法。先調脾。即於土中升木。顧濕熱必傷大腸。黃連燥濕清熱。厚腸胃。黃芩清大腸火為臣。久積必中氣逆滯。疏滯以木香。下逆以檳榔。當歸和氣血為佐。桂補命門。寔土母。反佐溫而行之。恐苓連之勝令也。斯少陽達太陰運矣。若大寔痛者。加大黃。用仲景芍藥湯加大黃法。以蕩腐穢。無留行矣。是方。允為滯下本方也。

犀角地黃湯

主治吐衄便血。婦人血崩赤淋。

生犀角 生地黃 白芍藥 牡丹皮

右四味先用三物水煎去滓入生犀汁熱服。

柯韻伯曰氣為陽血為陰陽密乃固陽盛則傷陰矣陰平陽祕陰虛者陽必凌之矣故氣有餘即是火火入血室血不營經即隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便雖有在經在府之分要皆心肝受熱所致也心為營血之主心火旺則血不寧故用生犀生地酸鹹甘寒之味以清君火肝為藏血之室肝火旺則血不守故用丹皮芍藥辛酸微寒之品以平相火此方雖曰清火而寔滋陰之劑蓋血失則陰虛陰虛則無氣故陰不足者當補之以味勿得反傷其氣也若用芩連膽草梔柏以瀉其氣則陽之劇者苦從火化陽已衰者氣從苦發燎原而飛越矣

人參清肺湯

華繩三方合論

治肺胃虛寒欬嗽喘急坐卧不安並治久年勞嗽吐血腥臭

人參 阿膠 骨皮 知母 烏梅 粟壳 茄草 杏仁 桑皮 分 束子

水煎服

人參定喘湯

準繩

治肺氣上逆喘嗽喉中有聲胸膈緊痛及感寒邪咳嗽聲重

人參 麻黃 阿膠 五味 粟壳 甘草 半夏麵各一 桑皮二錢 生姜三片

此義不可不知

水煎服。

人參瀉肺湯 金匱

治肺經積熱上喘。胸膈脹滿。痰多。大便澁。

人參 黃芩 柏子 枳壳 薄荷 甘草 連翹 杏仁 桑皮

水煎服。

王又原曰。經云邪之所湊。其氣必虛。又肺為嬌藏。其不堪破耗也明矣。自肺熱傷。種之說行。曰保肺補肺。衆共譁之。曰清肺瀉肺。藥與和之。豈知古人清肺瀉肺等湯。而必皆以人參立名。夫亦可曉然於肺氣之不可耗。而人參之在所必用也。肺體清而法天下。濟而司降令。一切渾濁不得上干者。皆氣之健能運行而不息也。若肺氣少弛。則降下失令。渾濁之氣遂逆上行。此為咳嗽。為喘急。肺葉脹舉。胸膈緊痛。移熱大腸。大便艱澁。種種顯有餘之象。寔種種為不足之徵。故不問內傷外感。為熱為寒。要以人參保定肺氣為主。或骨皮知母阿膠滋之。或烏梅五味鶯粟殼斂之。或半夏麵生薑降之。或杏仁桑皮枳殼桔梗利之。或梔子黃芩連翹涼之。或麻黃薄荷發之。大黃下之。總恃人參之大力握樞而運。已入之邪易出。而將來之邪無從入也。肺邪得諸藥以俱出。而肺氣不隨諸藥以俱出也。然則人參亦何嘗傷肺。乃畏而不敢用耶。

溫脾湯

本事方

秦艽升麻湯

主治銅冷在腸胃間。泄瀉腹痛。宜先取去。然後調治。不可畏虛以養病也。

厚朴 乾薑 甘草 桂心 附子 酒二兩 大黃四錢

右咀咬取一兩。水二鐘。煎六分。頓服。

喻嘉言曰。許叔微製此方。深合仲景以溫藥下之之法。其大黃止用四錢。更為有見。夫銅冷在腸胃而泄瀉矣。即溫藥中。寧敢用大黃之猛烈。因之半減而五之一。乃知叔微之得於仲景深也。仲景云。病人舊微溏者。梔子湯不可與服。又云太陰病。脈弱。便利。設當行大黃。芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱。易動故也。即是觀之。腸胃銅冷之泄瀉。而可恣用大黃耶。不用則溫藥必不能下。而久留之邪。非攻不去。多用則溫藥恐不能制。而洞下之勢。或至轉增。裁酌用之。真足法矣。

秦艽升麻湯

治風寒客胃。口眼喎斜。惡見風寒。四肢拘急。脉浮而緊。

升麻 萬根 秦艽 _上 白芷 _上 防風 _上 甘草 芍藥 人參 桂枝 葱白

右十味水煎服。

李士材曰。至哉坤元。為五藏之主。木勝風淫。則倉廩之官承制。脾主四肢。故痿痺也。

能解此
中用大
黃之妙

口為土之外候。眼為木之外候。故俱病也。升麻白芷皆陽明本藥。故用為直入之兵。人參桂枝固其衛氣。芍藥秦艽和其營血。防風半夏之卒。隨令而行。葱根發汗之需。無微不達。又藉甘草以和之。而邪有不散者乎。

二黃湯

治上焦火盛。頭面大腫。目赤腫痛。心胸咽喉口舌耳鼻熱盛。及生瘡毒者。

黃芩 黃連 甘草

各等分

水煎食後服。

柯韻伯曰。諸腫瘍痛。皆屬心火。必用芩連以瀉心。然傷寒熱結於內。而心下痞者。是為客邪。治客當急。故君大黃。率芩連用。麻沸湯瀆絞其汁。而速驅之。不使暫留也。此熱淫於內。而上炎頭目者。是為正邪。治之當緩。故用甘草與芩連等分同煎。漫飲以漸瀆之。不使下行也。蓋心下本虛。而火寔之。法當升瀉其子。土得其令。而火邪自退矣。芩連得大黃。不使其子令。母寔。芩連得甘草。又不使其母令。子虛。同一瀉心。而其中又有攻補之不同如此。

四磨湯 濟生

卷二 二黃湯 四磨湯 升麻葛根湯

六

上海大成書局印行

南京中醫藥大學圖書館藏書
南京中醫藥大學圖書館編

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

治七情感傷。上氣喘急妨悶不食。

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸放溫空心服或下養正丹尤妙。
王又原曰。經云。聖人審氣如持至寶。庸人役物而反傷太和。此七情隨所感皆能為病。然愈於壯者之行而成於弱者之着。愚者不察。一遇上氣喘急滿悶不食。謂是寢者宜瀉。輒投破耗等藥。得藥非不暫快。初投之而應。投之久而不應矣。夫呼出為陽。吸入為陰。肺陽氣旺。則清肅下行。歸於腎陰。是氣有所收攝。不復散而上逆。若正氣既衰。邪氣必盛。縱欲削堅破滯。邪氣必不伏。方用人參補其正氣。沉香納之於腎。而後以檳榔為藥。從而導之。所謂寢必顧。虛瀉必先補也。四品氣味俱厚。磨則取其味之全。煎則取其氣之達。氣味齊到。效如桴鼓矣。其下養正丹者。緩腎藥也。本方補肺氣。養正溫腎氣。鎮攝歸根。喘急滿已矣。

升麻葛根湯

治陽明表熱下利。兼治痘疹初發。

升麻 葛根 茄藥 甘草

右四味水煎服

柯韻伯曰。此為陽明初病。解表和裏之劑。可以用以散表熱。亦可以用以治裏虛。一方而兩擅其長也。夫身熱汗自出。不惡寒反惡熱。是陽明之本證。仲景未嘗立治表之方。見陽明初起。汗出多而惡寒者。便用桂枝湯。反無汗而喘者。仍用麻黃湯。症同太陽。而稱陽明者。是陽明之自病。而非太陽轉屬也。此方不用麻桂者。恐傷肌肉之表。計太過而亡津。升麻葛根提胃脘之陽。散肌肉之浮熱。芍藥甘草瀉肝膽之火。以解胃府之寢熱。有汗則發。無汗則止。功同桂枝而已。遠於薑桂。且不須啜稀粥以助陽也。胃寢為陽明之裏症。仲景製承氣三方。然陽明初病。往往有移熱於脾而下利者。內經所謂暴注下迫。皆屬於熱也。下利正是胃寢之兆。故太陽陽明合病。必自下利。仲景製葛根湯。以表散之。是從陰引陽法。此方即仿其義。去薑桂之辛熱。以升麻代麻黃。便是陽明表劑。而非太陽表劑矣。葛根稟性甘涼。可以散表寢。協升麻以上升。則使清陽達上。而濁陰降下可知。芍藥收斂陰精。甘草緩急和裏。則下利自止可知。治裏仍用表藥者。以表寢下利。而非裏寢故也。痘疹自裏達表。出於少陰而發於太陽。初起則內外皆熱。故亦宜於涼散耳。

防風通聖散

風熱壅盛。表裏三焦皆寢者。此方主之。

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷

麻黃

連翹

芒硝

甘草

黃芩

石膏

桔梗

一滑石

三甘草

兩荆芥

白朮

梔子

錢半

生姜

三片

每服三錢

半

黃芩

吳鶴皋曰。防風麻黃解表藥也。風熱之在皮膚者得之由汗而泄。荆芥薄荷清上也。風熱之在顱頂者得之由鼻而泄。大黃芒硝通利藥也。風熱之在腸胃者得之由後而泄。滑石梔子水道藥也。風熱之在決瀉者得之由溺而泄。風淫於鬲。脾胃受邪。石膏桔梗清肺胃也。而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火。風之為患。肝木主之。川芎歸芍和肝血也。而甘草白朮所以和胃氣而健脾。劉守真氏長於治火。此方之旨詳且悉哉。亦治失下發斑。三焦火寔。全方除硝黃。名曰雙解散。解表有防風麻黃。薄荷。荆芥川芎。解裏有石膏滑石。黃芩。梔子。連翹。復有當歸芍藥以和血。桔梗白朮甘草以調氣。營衛皆和。表裏俱暢。故曰雙解散。本方名曰通聖。極言其用之妙耳。

藿香正氣散

治外受四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱。或霍亂吐泄。或作瘧疾。

藿香

桔梗

紫蘇

白芷

厚朴

大腹皮

半夏

茯苓

陳皮

甘草

右十味加薑棗水煎熱服。

吳鶴皋曰。四時不正之氣。由鼻而入。不在表而在裏。故不用大汗以解表。但用芬香

利氣之品主之。蘇芷陳腹朴梗皆氣勝者也。故足正不正之氣。若半甘草則甘平之品。所以培養中氣者也。若病在太陽與此湯全無相干。傷寒脉沉發熱與元氣本虛之人。并夾陰發熱者。宜戒。又金不換正氣散。即平胃散加半夏藿香。凡受山嵐瘴氣。及出遠方。不服水土。吐瀉下利者主之。蓋平胃散可以平溼土而消瘴。半夏之燥以醒脾。藿香之芬以開胃。名曰正氣。謂能正不正之氣耳。

防風黃芪湯

治中風不能言。脉沉而弱者。

防風 黃芪等分 水煎服

柯韻伯曰。夫風者百病之長也。邪風之至急如風雨。善治者治皮毛。故用防風以驅逐表邪。邪之所湊其氣必虛。故用黃芪以鼓舞正氣。黃芪得防風其功愈大者。一攻一補。相須相得之義也。唐柳太后中風不言。許胤宗造防風黃芪湯數十斛。置床下蒸之。身在氣中居。次日便能語。是以外氣通內氣。令氣行而愈也。經曰。五氣入鼻。藏於心肺。上使耳目修明。聲音能彰。製此方者。其知此義矣。夫薰蒸之力尚能去病。況服之乎。今人治風。惟以發散為定法。而禁用參芪。豈知目盲不能視。口噤不能言。皆元氣不足使然耳。誰知補氣可以禦風。正勝而邪却之理耶。神而明之存乎其人。信



哉。

稀涎千繒湯

治風痰不下。喉中聲如牽鋸。或中溼腫滿。

半夏

大者四枝十

猪牙皂角

一錢

甘草

一錢

白礬

二錢

右四味研末用生薑自然汁少許沖溫水一盞調末一錢灌之得吐痰涎即醒。柯韻伯曰：攻邪有汗吐下三法。仲景於吐劑立桔梗瓜蒂二方。所以導熱邪之外出。逐寒邪而外散也。其有不因外感。因醇酒厚味漸漬凝結變為頑痰。一旦乘虛上塞咽喉氣不得通。忽然昏仆。目反直視。喉中聲如牽鋸。此為痰厥。先輩所云怪症多屬於痰者此也。非用峻劑以攻之。頑痰不能遽退。故用生薑半夏之辛以散之。甘草之甘以湧之。白礬之澀以墜之。牙皂之勇以開之。此斬關奪門之勢。惟稟氣素寢而暫虛者可用。壅塞稍疏續進他藥。不可多用。以傷元氣。如平素虛弱者。又當攻補兼施。六君湯中加牙皂白礬末以吐之。則庶幾矣。若誤作中風治之。去生便遠。

麥門冬湯

金匱

火逆上氣咽喉不利。止逆下氣者主之。

麥門冬

七半夏一升人參三

甘草

二兩米仁三合

大棗

十二枚



大森
图书馆版权所有

製方之妙全在半夏一昧非喻氏不能表其微也

右六味以水一二斗煮取六升溫服一升日三夜一服

喻嘉言曰此方治胃中津液乾枯虛火上炎治本之良法也夫用降火之藥而反升用寒涼之藥而熱轉熾者徒知與火熱相爭而正氣不致津液不生不維無益反害之矣凡肺病有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也本草有知母之名者謂肺藉其清涼知清涼為肺之母也有貝母之名者謂肺藉其豁痰豁痰為肺之母也然屢施於火逆上氣咽喉不利之症而屢不應名不稱矣孰知仲景妙法於參冬人參甘草大棗粳米大補中氣以生津液津液既中又增入半夏辛溫之味以開胃行津而助潤肺豈特用其利咽下氣哉顧其利咽下氣非半夏之功寔善用半夏之功矣

九味羌活湯一名沖和湯四時發散之通劑

合論一條

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 蒼朮 黃芩 甘草 生地
加生薑三片葱白三莖水煎服

活人敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 白芍芩 桔梗 人參各一
右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服
甘草錢