

醫鈔類編卷十八

武寧翁 藥稼江氏編輯

奉新許振祚仙屏重刊

幼科總略

察色論

金鑑云小兒之病先從面部氣色觀之詳察五部之色則五藏之病自昭然可見矣五部者額屬心頰屬腎鼻屬脾左腮屬肝右腮屬肺也五色者青爲肝色赤爲心色黃爲脾色白爲肺色黑爲腎色也如面青主風面赤主熱面黃主傷脾傷食面白主虛寒面黑主痛多是惡候總之五色明顯爲新病其證輕濁晦爲久病其證重五部色相生爲順如脾病色黃此正色也若見紅色乃火能生土故爲順也若見青色乃木來尅土故爲逆也餘病倣此若氣血充寢又遇部色相生縱有外邪病亦



醫鈔類編卷十八

幼科

幼科總略目錄

察色論

面部圖

面部五藏部位圖

面部形色賦

聽聲論

審病論

小兒脈法

四脈主病

四脈主證

總括脈要譜

脈證宜忌譜


指紋晰義

指紋圖

指紋切要

看指紋法

三關部位譜



浮沉分表裏訶

紅紫辨寒熱訶

淡滯定虛寔訶

紋形主病訶

看病審證

審顏色苗竅知表裏寒熱虛寔

肝藏見證

心藏見證

脾藏見證

肺藏見證

腎藏見證

小兒熱證有七

小兒寒證有七

論幼科證治得失

壽夭辨

變蒸辨

初生證治目錄

拭口法

拭口下胎毒法

斷臍法

灸臍法



浴兒法

不曬

初生輒死

不乳

喚乳

眼不開

懸癰垂

鼻塞

不小便

不大便

二便不通

肛門內合
無穀道

腎縮

生下無皮
身如魚脬

藏胎衣法

剃頭

斷乳法

一捻金

初生門方目



茯苓丸

生地黃湯

木通散

紫霜丸

胎病門證治目錄

胎弱

胎毒

胎寒

胎熱

胎搐

胎黃

胎赤

胎肥

胎怯

胎病門方目

集成沉澀丹

指迷七氣湯

助胃膏

天麻丸



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

茵陳地黃湯

犀角散

金鑑

清熱解毒湯

金鑑

蔣氏化毒丹

加減連翹飲

浴體法

調元散

臍病門證治目錄

臍風論證

臍風

噤口

鎖肚

臍風內因外因辨

臍風外因

臍濕臍瘡

附臍爛

臍突

用火須知火穴

用火口訣

臍風火穴圖

夏氏臍風火穴圖



臍風火穴

用火次序

宜火諸證

忌火諸證

回生艾火

掐人中合谷并灸中衝之法

撮口

馬牙

臍中出水

臍中出血四法

見簡便方

臍病門方目

辰砂殭蠶散

龍膽湯

保生湯

定命散

辰砂全蝎散

秘方擦牙散

驅風散

金鑑

益脾散

金鑑

黑白散

金鑑

柏墨散

錢氏



滲膈散

金黃散

異功散

犀角消毒飲 金鑑

白芍藥湯

三妙散

二豆散

外消散

簡便方

驚搐門證治目錄

驚風闢謬

真搐

急驚

大驚

假搐

傷風發搐

傷食發搐

慢驚

吐瀉虛風慢脾

小兒大熱呻吟驚風悞治救驗



慢脾風治驗

驚搐門方目

瀉青丸

集成

益黃散

錢氏

利驚丸

秘旨安神丸

圍參散

錢氏

玉樞丹

匯參

保命散

秘方

牛黃散

金鑑

鈎藤散

金鑑

大青膏

錢氏

鈎簾飲子

錢氏

裸病門證治目錄

客忤

盤腸氣痛

嘔哭

夜嘔



客忤盤腸氣夜嘯方目

撮生飲

沉香安神丸

塗顱法

搐鼻法

調中散

白豆蔻散

鈎簾飲

加減當歸散

導赤散

十味安神丸

簡便方

肢體病門證治目錄

頭項顱

解顱

顱腫

天柱骨倒

龜胸龜背



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library
1951

五鞭

五鞭

語遲

行遲

齒遲

髮遲

髮黃

肢體病門方目

封顙法

生筋散

杏仁煎

松蕊丹

菖蒲丸

柴胡飲

補腎地黃湯

巨勝丹

調燮諸法目錄

襁褓

乳哺



南京中医药大学图书馆版权所有
www.e-tongbook.com

論小兒陽有餘陰不足之證

論小兒無補腎之法

論小兒藥餌之悞

勿輕服藥

火功無故慎用

浣衣不宜露

臨病乳食宜節

乳母口腹宜慎

小兒飲食宜慎

小兒病後食復治驗

集成外治九法

疎表

清裏

解煩

開閉

引痰

緩痰

納氣

通脈

定痛

幼科預宜修製丸藥九方



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

醫鈔類編卷十八

武寧翁 藥稼江氏編輯

奉新許振祚仙屏重刊

幼科總略


察色論

金鑑云小兒之病先從面部氣色觀之詳察五部之色則五藏之病自昭然可見矣五部者額屬心頰屬腎鼻屬脾左腮屬肝右腮屬肺也五色者青爲肝色赤爲心色黃爲脾色白爲肺色黑爲腎色也如面青主風面赤主熱面黃主傷脾傷食面白主虛寒面黑主痛多是惡候總之五色明顯爲新病其證輕濁晦爲久病其證重五部色相生爲順如脾病色黃此正色也若見紅色乃火能生土故爲順也若見青色乃木來尅土故爲逆也餘病倣此若氣血充寢又遇部色相生縱有外邪病亦



易治若久病氣血虛弱又遇部色相剋則正氣不支病則難治如天庭
青暗主風紅主內熱黑則不治太陽青亦主風青色入耳者死印堂青
主驚瀉風氣二池青亦主風紫多吐逆兩眉青主吉紅色主多煩熱鼻
赤主脾熱鼻黑則死唇赤亦主脾熱白主脾寒左腮發赤主肝有熱右
腮發赤主肺熱痰甚承漿青主驚黃主吐黑主抽搐此皆察色之大要
再以脈證參之庶治得其要矣

小兒面部圖



面部形色賦

察兒形色先分部位左頰青龍屬肝右頰白虎屬肺

經曰左右者陰陽之道路也蓋五行

之位木旺在卯金旺在酉天地之理陽從左升陰從右降故以左頰配肝右頰配肺非謂左頰卽是肝右頰卽是肺無過以生殺之理配本全

龍虎之位以候其藏氣之強弱也

天庭高而離陽心火地角低而坎陰腎水

周易以東震西兌南

離北坎定子午卯酉之四正蓋後天之用有形者無不由之故以心配離南之午火於天庭腎配坎北之子水於地角亦陽上陰下之義第據其理而言之非謂額

內經以鼻爲面主以其位居上卽心唇下卽腎也

鼻在面中脾應唇際

至中內通呼吸生死賴之所

以謂之中也脾爲中土經曰中央黃色入通於脾開竅於口又曰脾胃者倉廩之本其華在唇四白故曰脾應唇際亦中受納之地

紅色見而熱痰壅盛青色露而肝風怔悸

此概二通面之色通面爲足陽以胃經所主胃經鬱熱面

必淡紅熱搏津液定化爲痰而壅滯風邪

如煤之黑爲痛中惡逆傳似衝併面必見青心神不安則爲怔忡驚悸

橘之黃食傷脾虛吐利

面色黧黑至齒之候幸而暴病乍見寔爲中惡之徵偶因毒惡之氣從鼻而入肺先受之阻遏

正氣隧道不通所以腹痛邪盛不能自出反致子乘母位而逆傳如肺傳脾脾傳心者是也橘黃言其深黃也脾司運化乳食不停何黃之有

由是運化失職所以食墳太陰脾氣

白乃疳癆紫爲熱熾

白屬肺氣虛
子傷累母所

凝滯故深黃上面必致有吐瀉之虞

此下遂

以脾必困而爲疳紫爲風熱熾

青遮日角難醫黑掩太陽不治

此下遂

經絡受邪定化爲壯熱而不已

部分言

之諸書皆誤爲口角不知面部無口角之位不但無此位證亦全不符

醫

蓋小兒中氣強者唇不變色●氣虛寒者十有九青此爲常侯非難醫

病

之證今證之日角左額也猶日之東升而爲青色遮蔽爲木蔽陽光病

則必有疑難之慮太陽左右兩額太陽爲眾陽之宗屬火旺夏氣色宜

紅今黑色掩蔽將有水來剋

年壽赤光多生膿血山根青黑頻見灾危

火之象定見傷殘故不治

年壽鼻梁也爲氣之門戶赤光侵位肺必受傷氣不流行則血必凝滯

將有膿血之災山根足陽明胃脈所起大凡小兒脾胃無傷則山根之

脈不現倘乳食過度胃氣抑鬱則青黑之紋

橫截於山根之位必有縲延啾唧故曰災危

朱雀貫於雙瞳火入水鄉

青龍達於四白肝乘肺位

朱雀赤脈也雙瞳腎水也赤脈貫瞳火乘水

白珠見青肝風侵

瀉痢而戴陽須防咳嗽而拖藍可忌

瀉屬脾病痢屬

肺治宜保肺平肝

既傷先後二天並弱面宜憔悴今反見紅赤知爲虛陽上泛故曰須防

咳嗽肺病也青者肝色也由其肺氣已虛肝無所畏木乘金位恐其生

火以剋金

疼痛方殷面青而唇口喰肝風欲發面赤而目竄視

疼痛腹

故曰可忌

白屬肺氣虛
子傷累母所

凝滯故深黃上面必致有吐瀉之虞

此下遂