

孫
醫
學
叢
書

傷寒雜病論章句

冊
三

傷寒雜病論章句卷六

湘潭孫鼎宜撰

【天氣雜病溼病二】

【中溼】

摘出風溼餘依原次傷寒論出厥陰末溼後金匱出溼熱二脈經同

【論大陽中溼脈證一章】

大陽病

又見傷寒論厥陰末關節疼痛翼方作而不心煩李杲曰溼留關節故

煩尤云溼為六淫之一故其感大陽之氣不宣故煩○痛心二字据

于肌腠而溼則流入關節柯云大陽之脈沉當因證而合

補口口脈沈而細者則金匱注溼細則一作傷上柯浮大傷下則脈沉當因證而合

而斷證脈名曰中溼大陽變傷也此與傷脈沈細別柯云大陽變脈溼自內發

與外感不同溼傷于下與傷上不同故同大陽○中溼為溼痹中溼云

即尤云溼性濡滯而氣重着故亦名痺痺者閉也溼痹之候小便不利

利李杲曰溼大便反快溼成勝云內經云但當利其小便成云宣泄腹中

在當利小便此治風溼兩大法尤云湯柯云風溼者必先有內風而後召外

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溼

中華書局聚

風中溼者必先有內溼而後感外溼此其平日土德必不及而小
動于中由是氣化不速而溼侵于外外內合邪故關節煩疼而不利
小便不利大便反快也必先逐內溼而後除外溼東垣云治溼不利
搏脈浮惡風身重疼痛者則必以麻黃白朮薏苡
杏仁桂枝附子等發汗為宜詳後○脈經白朮薏苡

右一章二節首言太陽經府病中溼定脈定證次言溼痺及

治法

【論二陽併病中溼一章】

〔溼家之為病〕

又見傷寒厥陰末

一身盡疼

徐彬曰此溼在久而鬱為熱者若

痛不止關節是身單疼溼為病也尤云溼外威者其陽必發熱徐彬云溼

發身色如熏黃也軌範云此黃與黃痺別尤云熱與溼合交蒸互鬱故

黃則黃而明所謂身黃如橘也陳云黃而有陰陽辨黃明亮陰黃闇黑

五苓散加茵陳與茵陳湯等方也寒熱不同不可不辨黃明亮陰黃闇黑

色蒸于皮毛故疼之柯云至溼不得泄所至身即黃傷寒發黃身

痛也須解此溼流關節故不

右言溼鬱化熱有發黃者

【論二陽中溼誤治轉兼少陰二章】

〔溼家其人〕

又見傷寒論出厥陰末

但頭汗出

汗出部位過小溼不得泄與陽明熱蒸上越之證別尤云寒溼

居表陽氣不得外通而但上越柯云若小便不利亦不背彊溼強非風

能發黃陳云大陽之脈夾脊背大陽客欲得被覆向火擬麻黃加朮湯成云此

大陽表氣不利而背強也

宜用麻黃加朮湯尤云是宜驅寒溼以通其陽謂宜○若下之蚤藥

用四逆輩吳云此溼盛生寒也○翼方無向火二字

多涼益則噦轉兼少陰○陰脈經作則吐義同△或曰滿不噦者則被

抑驟聚于上尤云或上小便不利尤云或下焦之陽不化而為病也吳

焦之陽不化而為病也吳

謙曰誤入于中則胃不和而為藏入于下則膀胱氣化不行為肺氣逆

而曰滿入于中則胃不和而為藏入于下則膀胱氣化不行為肺氣逆

不利○脈舌上如胎者滑而白似胎非胎此為丹田有熱成此非真熱

經無不字

陽氣陷于胸中則口燥煩也而渴藏燥〔欲飲水〕陳云丹田有

有熱而不能飲有寒故則口燥煩也而渴藏燥〔欲飲水〕陳云丹田有

故有熱而不能飲有寒故則口燥煩也而渴藏燥〔欲飲水〕陳云丹田有

水而又惡水其懊惱不可明言之意則為煩也程應旄曰雖渴似熱

而不能飲可辨則止口燥煩非胸中煩燥可知證同病別也○脈經

無煩字

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溼

二一中華書局聚

右言寒溼誤下轉為亡陽證

〔溼家下之〕

又見傷寒論出厥陰末〔蒙上〕章省雍曰大抵溼家不可

積成實未可

下尤云溼在表者宜汗在裏者宜利

微喘

水氣侵肺較上章曰二證

是虛陽欲上脫

○小便不利者死

與上章不同既汗出而小便又

死也○傷寒論無不字方云治溼當利小便

○若下利不止者

亦死

在下也○利則溼當愈今不愈而反下利不止是陰氣不脫而液脫也趙云

曰二便不利是陰欲下脫柯云溼家本陽無不越而陰之根猶在也程知

則驚癇瘕癰下之則直視失溼更胎而噦皆死也夫額上汗出小

便不利是溼不得越故發黃此更微喘是水氣入肺也夫額上汗出小

道而小便反利是勝於驚癇瘕癰水泉不止也若下利不止是倉廩不藏

比而之

〔寒溼中頭治法一章〕

右言寒溼誤下陰脫陽亡之死證

傷以寒上依

〔溼家病〕

又見傷寒論出厥陰末

身疼發熱面黃而喘

病溼之常○脈經

頭疼

鼻窒而煩此證之獨尤云溼上甚其脈大細之自能飢食

陳云不腹中和陳云脾無病云明自能飲食之故是中焦無病尤病在

頭中寒溼病中去聲尤云是其故鼻窒明鼻窒內藥鼻中則愈內古通

用瓜蒂末含水搐少許于鼻中附載瓜蒂○執範云內鼻之藥金

匱未載俟廣求其法以補之亦不過牙皂瓜蒂○執範云內鼻之藥金

毋犯其腹內服鼻中如瓜蒂散之屬使黃水出則寒溼去而愈不必

右寒溼鼻中藥

【論寒溼在表宜汗忌火一章】

〔溼家〕身煩疼者尤云溼兼寒而在表陳云不發黃可知未鬱可與

麻黃加朮湯此方在麻黃輩○軌範云△發其汗為宜陳下云覆取微汗

不宜大汗斟酌其適可者故與此湯尤云用麻黃湯以散寒并用白朮

以除溼喻氏云麻黃得朮則雖發汗而不至多汗尤得麻黃并可以

行表裏之溼止此一味加入○慎不可以火攻之而反增發熱也陳

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三 中華書局聚

右一章二節言寒溼在表以麻黃加朮湯為主方并用火之

禁

【風溼】

金匱通在痙溼熱二今拆出溼即水也與風水證無別因敘溼而言故曰風溼因論五水證言故易其名曰風水非有二

也

【論風溼在表宜汗一章】

病者

又見傷寒論厥陰末

一身盡疼

脈經作

發熱

程林曰

風

日晡所

即劇者

陽明經

王于申酉戌時不劇

與溼今為風終日發熱不當其程林曰日晡時也

劇也尤云溼無來去而傷風身有痛無止時必泥定肺與陽明柯云風溼身

痛與傷寒身痛不傷風身痛無止時必泥定肺與陽明柯云風溼身

甚設若不更值陰雨是風溼與天氣合痛亦不止更

名曰風溼

尤云雖在

其內下必在日陰雨是風溼與天氣合痛亦不止更

有寒亦附于風久傷家非冷意不可知矣魏荔彤曰痙家非風一定之理汗出

當風

錢天來云病入汗因不汗得出當風離汗之汁則液既不開當風出則皮毛又

能內返經絡留于肌腠而為溼此即人身外泄之汗也其或暑汗當

汗出時傷于納涼大過汗欲出溼之汗不得外泄之汗也其或暑汗當

久留骨節故無一身也盡云汗府出反風故發熱越或久傷風謂傷取冷謂水

久留骨節故無一身也盡云汗府出反風故發熱越或久傷風謂傷取冷謂水

久留骨節故無一身也盡云汗府出反風故發熱越或久傷風謂傷取冷謂水

久留骨節故無一身也盡云汗府出反風故發熱越或久傷風謂傷取冷謂水

久留骨節故無一身也盡云汗府出反風故發熱越或久傷風謂傷取冷謂水

久留骨節故無一身也盡云汗府出反風故發熱越或久傷風謂傷取冷謂水

久留骨節故無一身也盡云汗府出反風故發熱越或久傷風謂傷取冷謂水

所致也柯云此雖傷于溼而實因于風寒也可與麻〔黃〕杏〔仁〕薏〔苡〕甘〔草〕湯方在黃

輦○尤云痙非風不成溼非寒不作故以麻黃散寒薏苡除溼杏仁

利氣助通泄之用甘草補中予勝溼之權也陳云此為風溼無汗出其證之微甚而擇用之亦隨其證之上下而取親上親下為之理也

右麻杏苡甘湯總證大陽

【論風溼當汗而不可大汗一章】仍徐彬語

問曰又見傷寒論厥陰末風溼相搏成云風在外溼在內陳云風勝為行身

疼痛本風溼證法當汗出而解張璐曰合用桂枝加值天陰句雨不止陰言

雨則溼更甚非謂必俟天晴汗之而其病不愈者何也答曰答曰金匱作蓋陳云

用此法蓋不識王發汗汗大出者但風氣去溼氣在是故不愈也柯

風為陽邪其入淺溼為陰邪其入深風傷于上溼傷于下淺者若治

上者易去而深者難出故微汗之令遍身徐彬曰風性急可驟驅溼

風溼者但微微似欲汗出則風溼俱去也性滯當漸解汗大出則驟

故風去而溼不去若微發汗則緩故風溼俱去也

右言風溼發表之定法大陽

【論風去溼在脈證一章】

〔風溼〕

溼即水也風水中重出此章可證

脈浮

風身重

溼

汗出

溼

○趙云汗出則知

虛

故惡風也惟實其正氣故自愈

惡風者風上衝及胃中不加減法有陳寒四證而氣

防己黃

耆湯主之

有方在此防己輩○脈經脫○不標黃耆千金多仍脈經而八卷中

出表而用未解而已驅之肌則汗解之法不可守矣故不用麻黃出之皮毛

溼下行之徵也然非耆麻黃甘草尤湯小齊衛陽復振而驅溼此為虛邪

故與防己黃耆湯亦猶麻桂青龍三方鼎立矣

右防己黃耆湯定證

【論太陽風溼誤下轉兼少陰一章】

〔傷寒八九日〕

又見傷寒論太陽下傷寒謂時也

〔風溼相搏〕

蒙上章省

唐云仲景書凡風寒二字有通稱不分別者蓋外感或係寒隨風身至或係風挾寒來故二字往通用此風溼是寒風非熱風也

體疼煩

云此乃骨云表證陳云寒邪拘束故身疼風邪煽火故筋煩不

能掉動故下文曰無頭轉側渴等證故雖中人下先受之與風相搏止入關節身疼極重無頭痛飲渴等證故雖中人下先受之與風相搏止

外臺二引仲也景作經痛而煩不能自轉側則身重陳云牙在表後云故

轉側也不歐水溼就下無上達之勢不渴兼寒○擬麻黃加朮湯而

下之誤治不方則不成虛也○冒下二字證外○脈浮虛而濇者轉兼少陰

虛者陽氣微濇者正氣傷也據下節知此證小便必不利而大便溇

俱桂枝附子湯主之以扶陽氣而寒溼自除此風溼平均者陳云附子

是從外驅○若其人金匱無其大便堅以腸內無溼故此大便不潤所

邪之表劑者下利小便便利者故去桂枝枝多利小便僅見此方內者本草下

云併走皮內逐水氣〔桂枝附子〕去桂云此本一方二法若大便下

不堅小便不利加朮〔湯〕尤能燥溼徐云主之此方在玄武輦○陳云

則仍不去桂附子○金匱脈經及翼稱尤湯△虛弱家及產婦宜減服三枚恐傷陰氣

故陰虛弱及產後亡血者皆宜減服

右一章三節言太陽風溼誤下轉兼少陰有風溼平均相搏

于外者以桂枝附子湯為主方有溼多于風相搏于內者則

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 五 中華書局聚

去桂加朮

【論大陽兼少陰病風溼證一章】

〔風溼相搏〕

又見傷寒論出大陽下

骨節煩疼掣痛

釋名釋姿容掣制也制頓

痛溼也風溼則掣溼字作四肌拘急不得屈伸唐云即上章不能轉

近之則痛劇

漢書楊雄傳注劇甚也

汗出

溼短氣勝則衛氣不固

小便不利

成云溼勝則水氣不行洩也化

惡風不欲去衣

成云外風或身微腫者

時浮腫○邪外搏○微風寒引深師作悉甄權不得宣通腎中元陽失

職務必證陽回而沈細柔陰浮大則風多水泉流動矣吳人甘草附子

湯主之

方在玄武輦○陳云此是通備行表裏之劑徐云此風溼之在裏

之風溼當燥之治法不此尤云此亦溼勝陽微之證助陽散溼之方

也風溼在表當從汗解麻黃加朮湯麻杏苳湯其法而白朮附子溫經

補虛者不可重汗則有防熱者不可遽發其陽則有桂枝附子溫經

散溼之法而甘草附子則兼補中以上為散溼者也即此數方而仲景審

證較深用法之甘變蓋可附矣陳云上章風溼尚淺利在速攻此節見

遽走較徒使汗大出而邪不盡耳故減去一枚筋節未去蠶聚而以甘草為

注仲景同千金同甄權作
附子湯近效作尤附子湯

右風溼表裏兼治法以甘草附子湯為主方

【水腫】

金匱脈經并稱水氣著腫
病之源也今依軌範較顯

【論水腫脈證四章】

跌陽脈當伏

趙云非謂跌陽胃氣之本脈也為水畜于內其氣伏故

陰部故其脈當伏按伏當作大漢隸用伏字致誤跌陽在足背試診

之隨手可得何得云當伏趙尤二氏亦知其非而礙于誤字遷就其

說非也大訓昭然今反緊為陳云緊本自有寒句疝瘕腹中痛即本自有

胃氣古訓昭然今反緊為陳云緊本自有寒句疝瘕腹中痛即本自有

此二者以例其醫反下之尤云寒則宜溫而則凶滿短氣陽氣致決

餘擬大為頭煎醫反下之尤云寒則宜溫而則凶滿短氣陽氣致決

瀆無權而陰氣日○跌陽脈當伏作大今反數為熱數本自有熱云

胃中消穀脈經注一作消渴按二小便數擬承氣輩此二者以例其餘

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溼

六中華書局聚

可知寒由誤下熱由小便不利

〔寸口〕脈浮而遲浮脈熱遲脈潛熱潛相搏名曰沈尤云熱而潛則

而無外發之機矣故曰沈徐彬曰潛者元氣潛于下也既見熱又見

潛是熱為虛熱而潛為真潛矣言元氣沈而不舉非沈脈之沈也

○跌陽脈浮而數浮脈熱數脈止熱止相搏名曰伏尤云熱而止則

而無運行之道矣故曰伏徐彬曰數者衛氣止于下也既見熱又

見止脈是客氣為熱而正氣為止言上出之衛氣伏而不升非伏脈

之伏也按止猶潛也○沈伏相搏名曰水尤云熱留于內而徐彬曰從

即元氣潛于下之謂也○沈伏相搏名曰水尤云熱留于內而徐彬曰從

上而下者不能返而終沈從下而上者停止而○沈則絡脈虛尤云熱

久伏則旋運之氣幾于息矣息則陰水乘之也○伏則小便利尤云熱

則氣不往來也寸口絡脈虛沈而在下則絡脈者陰精陽○伏則小便利尤云熱

也跌陽正氣止而在下難徐彬曰小便利者水道之所從出虛難相搏水

走皮膚則為水矣尤云此以不化之水火甚則小便難虛難相搏水

曰水者即身中之陰氣合水飲而橫溢也上不能運

右一章三節寸口跌陽合診以明水走皮膚由絡脈虛而小

便難徐彬曰此論正水所

〔寸口〕脈〔弦而緊〕陳云緊為寒弦則衛氣不行寒所結〔衛氣不行〕經

有此四字即惡寒衛氣為寒所阻失其衛外之常與其制水之性疑此句當作緊則惡寒水不沾流走于腸

間○少陰〔脈緊而沈〕緊為痛沈為水小便即難尤云此二條並陽衰陰勝之證寸口

主陽氣少陰主腎陽主陽氣者寒從外得而陽氣被抑主腎陽者寒自內生而氣化不速亦即所謂陽氣竭者水與寒積而不行者也

右一章二節寸口太谿合診以明水走腸間由衛氣不行而

小便難

〔師曰〕脈經有脈得諸沈者總寸口跌陽當責有水尤云水為陰水

行皮膚營衛被吳云水畜于裏故腫重身體腫重吳云水溢于表故腫重○〔水病〕脈出者死

吳云水病肉腫脈當沈伏今反出者是氣外散也尤云正氣反出邪水之上根本脫離而病氣獨勝故死出與浮迥異浮者盛于上而弱

于下絕無也

右一章二節言水病之常脈為沈水病之死脈為出

【論水腫脈色一章】

夫水病人水一作未猶目下有臥蠅言微擁如蠅尤云目下微腫如蠅

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病淫 七 中華書局聚

腫面目鮮澤脈伏伏即沈也尤云水氣足以潤皮膚而○其人消渴

尤云陽氣被鬱而生熱病水此言其已然上節言其未腹大腹中積小便不利無

出由〔脈沈絕〕者脈即上文〔此為有水也〕○可下之擬十棗五苓輩下

也陳云玄武湯然不合下法尤云始因水病而生渴必承氣然後為下

水水勢瘀壅不行脈道被遏不出其勢亦太甚故必下其水以通其

脈趙云內經曰亦色澤者病溢飲至陰之飲者居也故水在腹于腸胃之外又

曰水陰也目下亦多飲多腫如蠶如新臥積則氣道不宣初由水穀不

靈津液以成消渴必多飲多飲則水積起臥積則氣道不宣初由水穀不

化○千金二十云凡水病之初先有兩目腫起如老蠶色俠頸脈動身

裏冷脛中滿按之沒指腹內轉側有聲此腫起如老蠶色俠頸脈動身

體稍腫腹中盡脹按之隨手而起水為已成猶

可治也此病皆從虛損所致蓋抽繹此章之義

右一章三節首言病水之兆次言因飲水以增其病三總出其治法為可下

【論水腫定證及自愈證一章】

問曰病下利後程林曰渴飲水程林曰小便不利程林曰腹滿

陳云水有入而因腫者水腫因腹滿下利後津液枯乾層層相不利因飲

脈經作陰程林曰腎主水故陰腫何也師曰〔止〕治當利水（者）
便自利尤云水及汗出者尤云水自當愈尤云水雖聚而旋行其所
自行也豈辛散淡滲所能強責之哉按治溼之法不外汗與利小便
此雖言自愈而治法亦不外此二大法門尤說非○千金二十一注
一作滿月當愈

右因問詞以定水腫之證并言其有自愈者則由其汗能自

出與小便能自利以上六章依金匱脈經次

【論水腫治法大略一章】

〔師曰〕諸有水者冒下證○要以下腫當利小便尤云要以下為陰故

五苓猪苓等湯○要以上腫當發汗〔迺愈〕尤云要以上為陽易

勢而利道之也吳云越脾青龍等湯陳云治水者分其內外表裏而

治之不若分其上下而治之尤為確切也沈自南曰利水發汗乃言

其常未及其變若欲汗者兼補陽而利小便必兼變法乃為第一義附子

湯括萆瞿麥丸之類開腠通陽而利小便必兼變法乃為第一義附子

【論水腫挾氣治當先氣後水一章】

問曰病者苦水病苦猶也面目身體〔四肢〕因省體皆腫此即水腫體也小便

不利內有師脈之不言水不言水則先當治氣反言匈中痛一較第

一章匈氣上衝咽二〇不惟衝狀如炙肉三〇不惟衝咽中且有結核

滿加劇肉用半夏當微欬喘治五〇有此五證則腫之挾氣自明故與水腫

厚撲湯證面有似身體俱腫咽塞氣也審如師言其脈何類水腫之氣分師

曰〔寸口〕脈〔沈而緊〕沈為水緊為寒沈緊相搏結在關元此即謂

在少陰沈為始時尙微水腫之始尙微也年盛不覺陳云邪不勝正

水亦為在裏始時尙微陳云水寒尙微非年盛不覺陳云邪不勝正

韻通此俗人妄改失均古陽衰之後營衛相干說文干犯也陳云前

衛相陽損陰盛四十而陰氣自半也起居衰矣不得云氣內經年結寒

微動由年盛以迄陽衰必以十年計腎氣上衝言此衝氣咽喉塞噎

脅下急痛動之衝痛陳云此時若以溫腎祛寒醫以為留飲陳云

源而大下之一誤下氣繫不去其病不除尤云衝氣宜溫降不移也

攻下必去〇復重吐之再誤陳云胃家煩虛除吐虛古叶下咽燥欲