

校正醫宗必讀

錦章圖書局
印行
卷十

三陽經脈不通者氣滯於腹脹滿心腹脹痛有定在而不移脈滑或沉
三陽經脈不通者氣滯於腹脹滿心腹脹痛有定在而不移脈滑或沉
三陽經脈不通者氣滯於腹脹滿心腹脹痛有定在而不移脈滑或沉

死者醫殺之耳須知痛不脹閉者多實不問者多虛拒按者為實可按者為虛是寒者多實是熱者多虛是配則其

安可通利乎故表虛而痛者陽不足也非溫經不可寒虛而痛者陰不足也非養營不可上虛而痛者以脾傷也脾傷中不可下虛而痛者脾腎敗也蓋溫補命門不可若沉痛無補法則殺人慘于利器矣

醫案

疾十數所始安

孝廉李長蘅吳門舟次忽患腹痛用順氣化食之劑弗效余診之曰脉沉而遲寒裏犯胃也以參蘇飲加草豆蔻一

錢煎就加生薑自然汁半碗一服不減二服而瘡

縣令章生公在南者應試至八月初五日痛甚不能飲食余診之寸口滿而軟過大關脾湯加人參三錢官桂

一錢生公云痛而聚補實屬不敵得無與竭期時乎余曰若能信而服之可以無碍城反投破氣之藥其碍也否矣

服之不踰時痛減更進一劑連飲獨參湯兩日而愈場事獲竣

太史焦漪園當胸而痛作氣食瘕之無功余診之曰當胸者少陰腎之部位也元陽沉而弱與氣食存何干漢非徒器蓋反害真元以八味丸料煎飲不十日而健服如常

京卿胡慕東少腹作痛連于兩脇服疎肝之劑日甚一日余診之左關尺俱沉過治以理中湯加吳茱萸一劑至十劑起矣

加味七氣湯 治七情鬱結心腹作痛

蓬木 青皮 香附 玄胡索 薑黃 草豆蔻 三棱 桂心 益智仁 陳皮 蒼朮 甘草

水二鐘煎一鐘食前服 死血加桃仁紅花

手招散 治血滯心腹作痛

玄胡索 五靈脂 枳實 沒藥 小胃丹 胃苓湯 代抵當湯

桃仁承氣湯 行瘀血 去積 小胃丹 胃苓湯 代抵當湯

生地黃 當歸尾 穿山甲 降香 肉桂 桃仁 大黃 芒硝

清中湯 治火痛 黃連 枳子 陳皮 茯苓 半夏 草豆蔻 甘草

食前服

草豆蔻丸 治寒氣犯胃心腹作痛 草豆蔻 吳茱萸 益智仁 陳皮 當歸身 青皮 甘草

神麴 薑黃 生甘草 桃仁 半夏 澤瀉 茯苓 甘草 柴胡 人參 黃耆 陳皮 共為末

水丸每服三錢食遠白湯下

大柴胡湯 治心虛悸動而痛

加味歸脾湯 治心虛悸動而痛

人參 黃耆 白朮 當歸 茯苓 酸棗仁 遠志 肉桂 木香 甘草 龍眼肉 北棗 煨薑 三葉蒲

人參 黃耆 白朮 當歸 茯苓 酸棗仁 遠志 肉桂 木香 甘草 龍眼肉 北棗 煨薑 三葉蒲

桂心

水二錢煎一錢食後服

沉香降氣散

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

妙香丸

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

山藥丸

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

金鈴子散

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

木附湯

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

右為水每服三錢

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

葛根散

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

乾漆丸

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

烏梅丸

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

補肝湯

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

分三服

柴胡疏肝散

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

推氣散

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

片薑黃

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

枳實散

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

導痰湯

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

一服薑十片煎八分食遠服

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

龍骨丸

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

為細末

治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不安

黑錫丹 見頭痛萬花解毒湯見過頭

桂枝散 驚氣傷肝脇中疼痛 枳殼 桂枝 細茶每服二錢薑薑湯調下

芍藥甘草湯 治腹痛如神 芍藥 甘草 水二杯煎一服服時以飲之

霍香正氣散 治中風十味香薷散見中風

大金花丸 治大黃子金花

黃連 黃蘗 黃芩 大黃 為和水丸每服白湯下二錢

木香順氣散 治氣滯腹痛 木香 香附 檳榔 青皮 陳皮 厚朴 薑茶木 枳殼 砂仁 甘草 水三錢薑三片煎一服食前服

萬應丸 取蟲積如神

黑丑 大黃 檳榔 八寶丸 沉香 將黑丑大黃檳榔同為末大皂角苦楝皮各四兩煎湯汁

為丸大黃 雷凡木香沉香為衣 五更補神糖水下

腰痛

內經云太陽所至為腰痛 腰痛不可忍也 腰痛之症多由風寒濕熱所致 腰痛者內傷房慾也 假令作強伎巧之官 謹其開關封藏之木 則州郡之地 真氣布遠 雖六氣苛毒 弗之能害 惟以然

竭其精以耗散其真 則腎虛感傷 楊說之府安能獨足 於是六氣乘虛侵犯 太陽故分別施治 有寒濕有風熱有杜風

有瘀血有滯氣有痰積皆標也 腎虛其本也 標急則從標 本重則從本 標本不失 病無遺狀矣

寒感寒而痛 其脈沉緊 腰間如扣 得熱則減 得寒則增 此陰寒也 杜仲黃汁炒為末 每服一錢酒送 治腎氣腰痛 兼治風令或牛膝

淫傷淫如坐水中 腎虛久坐水濕或傷雨露 兩水相傷 以致腰痛 身重脈緩 天陰不發 此風濕也 杜仲黃汁炒為末 每服一錢酒送 治腎氣腰痛 兼治風令或牛膝

風有風脈浮痛無常 牽引兩足 此風也 杜仲黃汁炒為末 每服一錢酒送 治腎氣腰痛 兼治風令或牛膝

酒

熱脈洪數發渴便閉

悶挫或跌撲損傷

瘀血脈滑轉動若鞭刀之刺大便黑小便或黃或黑日輕夜重

氣滯脈沉

痰積脈滑

腎虛腰痠

五積散

獨活寄生湯

藥 獨活 桑寄生 杜仲 牛膝 細辛 秦艽 茯苓 桂心 防風 羌活 人參 甘草 當歸 芍藥 地黃 水 二錢 鹽 五片 食前服

牛膝酒 牛膝 川芎 法活 地骨皮 五加皮 薏苡仁 甘草 海桐皮 生地黄 為粗末 絹袋盛入

好酒二斗浸二七日每服一杯日三四杯

膝著湯 治腎虛傷濕腰中如帶五十錢腰冷如坐水中不渴小便自利

乾薑 炒 茯苓 甘草 白朮 二 每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

參朮湯 治寒濕所傷身重如坐

每服四錢水一鍾煎一分

厚膝膏 治人白帶痛 附子天 馬頭天 南星 硫磺 雄黃 樟腦 丁香 各半 麝香 五分

為細末雲風龍眼大每服一丸生薑汁化開如厚粥火上烘熟放掌上厚膝中條藥盡即烘歸衣裏腰熱如火

間一日用一丸

甘豆湯 治風熱腰痛 二錢不通 黑豆 甘草 水 二錢生薑七片煎服

甘豆湯

二錢不通

黑豆 甘草

水 二錢生薑七片煎服

蘇木蜜丸桐子大每服三錢酒下

補腎丸 鹿板 熟地 藥 知母 側柏葉 枸杞子 五味子 杜仲 砂仁 甘草 五 甘 草 仁 兩 猪 脊 鏈 地 黃 膏

無火每服五錢滾湯下

氣

[illegible]

愚按內經所謂任脈爲病內結七疝合言疝證之原也。所謂衝疝狐疝癰疝厥疝癢疝瘻疝遺精疝分言七疝之狀也。然以不能詳考內經原具七疝乃強分厥證寒氣盛腫脹自附於內經之七疝不亦妄乎宜徵子知非之曰此俗工所立異名似與及其立論世辨余器其小腸膀胱腎了不相干尋屬肝經受病見不知任脈爲七疝之原亦不知經文自有七疝散見於各論之中又奈寒水筋血氣孤瀕之七種此其紕繆與葉氏未有以異也若言痛爲筋病皆挾肝邪則可若言止在股肱一經不亦與內經相戾耶且執病在下者引而竭之不問虛實概興攻下其禍有不可勝言者豈特下復枯槁而可回其生乎學者但當以內經爲正不當惑於多歧丹毒以爲疝證皆始於濕熱蓋大勢則火起於筋解飽則火起於胃大怒則火起於肝大驚自入淫氣日風濁液凝滯並入血脈流於厥陰肝性急速爲寒所束宜其痛甚此

亦補前人未備之一端不可守為模度也故夫治法寒則多痛熱則多瀉瀉則腹虛者亦腹滿在血分者不移在氣分者多動蓋要丸有兩左火屬水水生肝和木生心火三部皆司血統納左之血者肝也右火屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺也是故諸寒收引則血立而歸肝下注於左丸諸氣情動則溫聚而歸肺下注於右丸且要丸之所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也故左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多此確然者耳

衛氣上衝心二便不通

治法木香 或用水蛭六兩鹽泥固濟炭三觔煨至火盡取二兩

乾薑一兩煨為細末二味和勻水調得所塗痛處

癰疽陰囊腫大如升如斗甚而按揉大者宜晚九之與膏子投木野不痛

藥能治者酒糊丸鹽湯下用馬鞭草搗塗或細行和之

癰疽脾受肝邪氣逆有積但飲食不化肝邪甚者宜用四逆湯

癰疽脾傳腎少腹熱痛出白即和之而丹溪所謂內鬱濕熱者與此症相似

熱傳入太陽發熱惡寒小腹脹痛即和之而丹溪所謂內鬱濕熱者與此症相似

癰疽足陽明筋病內有膿血和之而丹溪所謂內鬱濕熱者與此症相似

癰疽內有膿血小便不通和之而丹溪所謂內鬱濕熱者與此症相似

癰疽七疳厥氣逆下利和之而丹溪所謂內鬱濕熱者與此症相似

子和大疳寒熱下利和之而丹溪所謂內鬱濕熱者與此症相似

癰疽血氣逆下利和之而丹溪所謂內鬱濕熱者與此症相似

小腸疝小腸之病小腹引舉丸公連腰脊而痛小腸虛則風冷寒間而入邪氣既入則厥而上冲肝肺按引舉丸上而

不下

治法

膀胱氣小腹腫痛不得小便是也五苓散一兩分三服服之小便如常此方治水腫
候發急搏背症腫視在何部而知其藏 尺部脈滑為寒山此方治水腫

醫案

常州 文 嗜火酒能飲五觔五月間入閨中漢水壁濕沙水至七點覺腹痛之甚半月之後石火腫大漸如斗形關中縣
都皆與肝經之刺及濕熱之毒半載無功歸而就商于余余已嗜火酒則濕熱滿中沙大水則寒濕外來今病在右
脾肺之濕下注羣丸以胃苓湯加梳子枳殼香柏茴香十劑而寒濕即以丸服至十八劑而安此方治水腫
文學路元賓十年患疝形容枯槁余診之左脇有癰其大如臂以無手握之濕濕有聲甚至上攻于心悶絕者久之
熱醋煮之方愈余曰此聖所謂皮疝可食餅因連湯半月積形衰小更以八味丸間服其真遺信余言半載無間積
盡消後不復患

木香散 治肝邪上厥痛悶欲絕

木香 陳皮

良薑 訶子

乾薑 枳實

路子 草豆蔻 牽牛 川芎

水二錢煎一鍾空心服

知味散 仲景以之治孤症

知味 枳殼 枳實 枳實

右為末每服一錢此方治水腫

三層面香丸 治一切疝如神此方治水腫

大茴香 炒和鹽 川楝子 炒 沙參 木香

為細末水煮米糊為丸桐子大每服三錢茶鹽湯下日三

服藥先便後服第二料

照前方加 華散而振脚

共前藥六味重五兩半為末粥丸服法如前未愈服第三料

照前二方加 白茯苓 附子

共前八味重十兩桐子大每服三錢連三十年之久大如梧棧者皆可除根

荔枝散 治陰丸腫大痛不可忍 荔枝核 炒 枳殼 炒 枳實 炒 木香 青鹽 食鹽 路子 川楝肉 小

萬香散二

為末每服三錢空心熱酒調服

宣胞丸

治外腎腫痛

黑豆拌炒木通

為末酒糊丸桐子大每服二錢溫湯下

地黃膏子丸

治男婦奔豚氣塊小腹腔暈而痛上冲心腹

人參

沉香

木香

白朮

玄胡索

血竭

蛤蚧

當歸

廣茂

吳茱萸

續斷

川芎

金竭

川楝子

煨紫胡

沒藥

青皮

肉桂

以上各藥

同炒

右為細末

地黃膏子丸

加桐子大

空心溫酒下

二十九

日加一丸至三十丸

當歸四逆湯

當歸尾

附子

官桂

茴香

柴胡

五片

藥酒玄胡索

川楝子

茯苓

三澤瀉

水二錢煎一鐘空心服

川苦楝散

木香

川楝子

煨神曲

當歸

等分

為末

每服二錢

空心食前酒調下

木香楝子散

治氣此散

石菖蒲

兩青木香

少兩

真解

為末

每服二錢

入麝香少許

空心炒茴香

溫酒調下

為細末

每服二錢

入麝香少許

空心炒茴香

溫酒調下

烏頭梔子湯

治內有鬱熱

外有寒

川烏頭

梔子仁

三錢

水

一鐘煎

一鐘空心服

加味通心散

治積癥

內有膿血

小便不通

聖藥

木通

梔子

煨黃芩

連翹

甘草

根散

川楝子

煨歸尾

桃仁

煨破山查

等分

為末

每服

三錢

空心調服

五苓散

治傷寒

砂丸

木香

沉香

巴豆肉

一青皮

二銅青

煨砂

研

二香膏皮巴豆

慢火炒紫色

去巴豆

為末

入砂

銅青同研

為末

和丸

桐子大

每服七丸

至十丸

溫酒下

空心下

日二服

羊肉湯

治寒疝

腹痛甚急

當歸

生薑

羊肉

水八碗

煮取三碗

溫服一

碗

日三服

內經曰脾受積滯之氣小便後赤甚則淋也。風火鬱於上而熱其病

未有複痊者也

腎精有脾方腎勞之分多思憂慮實重運行與五苓散分脾也直補中氣專因思慮者脾若強力入室或疲

血淋有血瘀血虛血冷血熱之分小便硬滿中作痛欲死血瘀也一味牛膝煎膏酒服大效但虛人能損胃耳宜

血色黑，面黃枯白，尺脉沉，通下元虛冷也。金匱或用漢椒根四、五錢，水煎，冷服。然有內熱過極，反兼水化

氣林有虛實之分如氣滯不通膈下妨悶而痛者沉者重如牛氣虛者八分如吐仲

冷淋多是腎虛

肥瘠勝於州都之官澤液藏焉氣化則能出矣風寒濕邪透客于胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通小腹脹

膀胱之內痛若沃以湯塞於小便以足太陽經其直行者上入腰入絡腰下泄其則為清濁也

醫宗

已率羈知志熱經年痛如刀鐮火清火疎利之劑計三百帖病勢日甚蓋基來就於余曰兩尺數而無力是虛火也從
未醫者皆泥痛無補法愈速通則愈愈愈虛則虛大愈熾遂以八味地黃丸料加車前沉香人參服八劑痛減一二而
頻數猶故原醫者進云淋證作痛定是實火若用溫補恐致日後必將悶絕不可救矣知非腎虛復來商之余曰若不
宜溫補則服藥後病勢必增今既減矣復何疑乎朝服補中益氣湯晚服八味丸連月而病去其九更倍用參耆十四
日而霍然矣

大司寇杜完三夫人淋瀝兩載靡藥不當卒無少效余診之見其兩尺沉數為有熱血乎留法當攻下因在高年不敢
輕投但於補養氣血之中加琥珀半兩服此等緩劑須以數十劑收功而夫人躁急求功再劑一不效輒欲更端遂致癰病
神效琥珀散 治水道泣痛頻下沙石 琥珀 桂心 杜 滑石 大黃 麝香 木通 木香

石

水煎服

治沙石淋

馬蘭花

等分為細末每服二錢燈心蔥白煎湯調服

如聖散

治沙石淋

馬蘭花

等分為細末每服二錢燈心蔥白煎湯調服

水煎服

治沙石淋

馬蘭花

等分為細末每服二錢燈心蔥白煎湯調服

如聖散

治沙石淋

馬蘭花

等分為細末每服二錢燈心蔥白煎湯調服

獨聖散

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

補中益氣湯

見五苓散

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

治沙石淋

黃蜀葵

為細末每服一錢食前茶飲調服

生地黃

沉香散 治氣淋脛下妨悶小便大痛 沉香 石華甘滑石 當歸 王不留行 瞿麥 桑子 赤芍藥

白木藥草甘草藥草 為末每服一錢太麥湯空心調服以利為度

石菖蒲
石菖蒲亦名蘭草
木通
厚朴
芒硝
葵子
木香
滑石
每服四錢方一

六分

瞿麥湯 瞿麥穗 黃連壯土 大黃 蒸枳殼 當歸 羌活壯土 木通 牽牛 延胡索 桔梗 大腹皮 射干配車 梔

每服四錢水一鐘半生薑七片煎八分服

鹿角霜 鹿角霜 白茯苓 秋石 鹿角末 和丸 梧子 大 每服 五錢 米飲下

大沉香散 治膏淋瀝下妨悶 沉香 陳皮 黃耆 瞿麥 榆白皮 韭子 滑石 黃芩 甘草

為末每服二錢食前米飲調下。

沉香丸 沉香 肉桂 荊芥穗 礞石 滑石 石為末 蜜丸 梧子丸 每服三錢 酒下

海金沙散 海金沙 滑石 甘草 研末每服二錢空心湯調送下

兔絲子丸
兔絲子西藥名桑螵蛸五錢澤瀉五分
烏梅 芡實 梧子 大每服二錢空心米飲下

肉苁蓉丸
肉苁蓉
熟地黃
山藥
石斛
牛膝
官桂
五劑
黃芪
黃連

五錢細辛半斤甘草五錢
為末蜜丸梧子大每服二錢鹽酒下

澤瀉散 治冷淋脹滿痛
澤瀉 雞絲 石葦去毛 赤茯苓 蒲黃 當歸 琥珀 橘核 枳殼

桑螵蛸五錢 官桂五錢 細末每服一錢木通湯調服

腎著湯 見腰痛
腎泄湯 見痔

巴戟丸 治胞痺 巴戟去心 桑螵蛸切破 杜仲去皮 生地黄 附子去皮 肉桂去粗 山藥去粗

志法林石斛土鹿耳鹿耳兔鱗子酒洗山茱萸其五味龍骨官桂各七為末蜜丸梧子大每服三錢空心

陳酒送下

國朝文獻

小便閉澀
經云肝足厥陰之脉過陰器所生病者閉澀又云督脉者女子入繫廷孔之直孔也言正中其孔弱孔之端也
在兩膝半橫骨之下也孔之上陰溝之端乃膀胱外起之所此男婦子病不得前
後難出之病也此三焦皆由中而上行故其病如此又云三焦下膈在於足太陽之前少陽之後出於臍中外
廉名曰委陽是足太陽絡也三焦者足太陽太陰之所將太陽之別也上踝五寸別入貫腸出於委陽並太陽之正入
絡膀胱約下焦實則閉塞虛則遺溺此三焦下膈之病也又云三焦下膈之病也三焦下膈之病也三焦下膈之病也
其病又云膀胱不利為癃不約為遺溺此三焦下膈之病也又云三焦下膈之病也三焦下膈之病也三焦下膈之病也
少也閉澀之病內經分肝與督脉三焦與膀胱四經然太陽膀胱但主藏溺其主出溺者皆肝經及督脉及三焦也又
考膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣夫主氣化者太陽膀胱經也若使肺燥不能生水則氣化不及以和法當
清金潤肺使津液充足則如脾經不運而精不上升故肺不能生水於法當燥脾健胃使津液充足則如腎水燥熱膀胱
不利法當滋腎陰熱藥如車之潤夫滋腎為膀胱名為正治清金潤燥名為隔二之治健胃燥脾名為隔三之治又
或有水液只參大腸小腸因而燥濕宜以淡滲之品如茯苓澤瀉等藥分利而已或有氣滯不能通調水道下輪膀胱者
氣為急瀉之利有實熱者非與純陰之劑則陽無以化矣上焦者下焦者中焦者知有水虛者非與溫補之劑則
水不能行如陰虛者如東垣治一人小便不通自突腹脹皮膚欲裂服淡參之藥與熟地東垣曰疾急矣非精思
不能處思至半夜曰吾得之矣膀胱為津液之府必氣化而能出服淡參而病益甚蓋是氣不化也無陽則陰無以生無
陰則陽無以化淡參氣薄皆陽藥也孤陽無陰欲化得乎以滋腎丸詳陰之劑投之即愈升溪音曰吾以吐法通小便
譬如滴水之器上塞閉則下流無以自通公上塞開而下流之水出焉氣虛者先服後吐血虛者先服後
吐痰多者先服後吐氣閉者先服後吐更有瘀血而小便閉者牛膝桃仁為要藥別錄云小便不利者是氣虛
參湯如神由是觀之則受病之原自非一途若夫望聞問切察之明審之當而浪投藥劑何不以人命為戲耶
妊娠小便不通孕婦胎滿壓胞多致小便閉塞宜升舉其氣如神效如仲景用八味丸酒服或令槐葉手入產戶
托起其胎溺出如注或令孕婦眠於榻上將榻倒豎起胎即不壓而溺出勝于托起多矣或各有所因者並依條治

產後小便不通 陳皮去白為末空心酒調二錢外用鹽填臍中却以葱白皮十餘幅作一縛切作一指厚安臍上用
大艾炷滿餅上以火炙之覺熱入臍內即通此法因氣逆者宜之若氣虛者宜用

醫案

郡守王履癰火喘嗽正甚時忽然小便不通自服車前木通茯苓澤瀉等藥小腹脹悶熱滿不通余曰石寸數大是金
燥不能生水之故惟用紫菀五錢麥門冬三錢北五味十粒人參三錢一劑而小便湧出如是若淺淺之藥金多則反
致燥急之苦不可不察也

先兄山謫官浙江按察司之餘又當盛暑小便不通氣高而喘以自知醫服胃苓湯四貼不愈余曰六脉見結此氣
滯也但用枳殼八錢生薑五片急火煎服一劑稍安四劑霍然矣

孝廉趙修府志勞神忽然如傷神守小便不通余診之曰寸微而尺鼓是水瀉而神傷也用地黃知母參人參丹
參路三錢五分黃柏二劑稍減十劑而安

八正散 治心經和熱燥渴煩躁小便不通

瞿麥 篇蓄 車前子 滑石 甘草 山梔子 木通 大黃地黃 為末每服二錢水一鍾入燈心煎至

七分食後臨臥服之

五苓散見泄瀉

木通湯 治小便不通小腹痛甚 木通 滑石五 牽牛二 石作一服水二鍾燈心十葉葱白一葉煎

至一鍾食前服

通心飲 治心經有熱唇焦面赤小便不通 木通 連翹三 水鍾半燈心十葉煎八分服

牛膝湯 治血結小便閉結中痛 牛膝五 當歸三 黃芩三 水鍾半煎八分日三服

金匱腎氣丸 治腎虛小便不通或過服涼藥而愈其者每服三錢淡鹽湯送下防瀉

琥珀散 治老人虛人心氣閉塞小便不通 用琥珀為末每服一錢人參湯下極效

利便散 治老人氣虛小便不通 黃耆五 陳皮三 甘草一 水一鍾煎七分服

參芪湯 治心虛寒熱小便澀數 赤茯苓五分 生地黄黃 黃芪 桑螵蛸 煨地骨皮 歸一人參 五味子 羌活

子 甘草五分 水一鍾煎七分入燈心二十一莖一沸服

清肺散 治渴而小便閉澀 茯苓 猪苓 澤瀉 瞿麥 琥珀 五燈心 扁蓄 木通 通草 車

前子 水二碗煎至一碗服

滋腎丸 治陰虛小便閉 黃蘗 知母 酒炒各肉桂 為末熟水為丸如芡實大每服百丸加至二百丸

百沸湯空心服

滋陰化氣湯 治因服熱藥小便不利膝下痛 黃連 黃蘗 甘草 水煎服 服如通加

滑石散 治男婦轉胞小腹急痛不得小便 寒水石 研葵子 合滑石 亂髮灰 車前子 木通 各一兩

水十碗煎至五碗每服一碗一日服盡即利

洗方 治轉胞小便閉先用

良薑 乾葱頭二枚 紫蘇 煎湯密室內薰洗小腹外腎肚門留湯再浸藥綿洗以手撫臍下拭乾 被中仰坐

垂脚自舒其溺次用

蜀葵子 仁 赤茯苓 赤芍藥 白芍藥 各五

每服三錢煎取清汁調蘇合丸三九并研細青蘘五分食前溫服

又法 炒蘘半助黃蘗製小腹

又法 治小便閉小腸脹不急治緩心 用葱白三助切細炒熟絹包分兩袋更替炒臍下即通

又法 以白瓜甲燒灰水服

塗臍方 治小便不通 大蒜 一兩 梔子 批鹽花 炒

右搗爛綿紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

又法 治小便閉老壯者神效 桃枝 柳枝 木通 川椒 白善 甘 白 燈心 水三十碗煎十五

碗用磁瓶熬成一半藥汁煮外腎週迴以被圍繞不令外風得入良久便通如赤豆汁若冷即易之效