

農桑輯要

冊二

卷之三

三

農桑輯要卷五

元 司 農 司 撰

瓜菜

種瓜黃瓜

齊民要術收瓜子法常歲歲先取本母子瓜截去兩頭止取中央子

本母子者瓜生數葉便結子子復早熟用中輩瓜子者蔓長二三尺然後結子用後輩子者蔓長足然後結子子亦晚熟種早子熟速而

瓜小種晚子熟遲而瓜大去兩頭者近蒂子瓜曲而細近頭子瓜短而喝又收瓜子法食瓜時擇美者收取卽以細糠拌之日曝向燥

授而簸之淨良田小豆底佳黍底次之刈訖卽耕頻翻轉之二月上而且速也

旬種者爲上時三月上旬爲中時四月上旬爲下時五月六月上旬

可種藏瓜凡種瓜法先以水淨淘瓜子以鹽和之鹽和則不能死先臥鋤穫

卻燥土不樓者阤雖深大常雜燥土故瓜不生然後培蒲溝阤大如斗口納瓜子四枚

大豆三箇于堆旁向陽中瓜生數葉掐去豆

瓜性弱苗不能獨生故不去豆則豆反扇瓜不得滋茂但豆斷汁須大豆爲之起土瓜生出更成良潤勿拔之拔之則土虛燥也多鋤則饒子不鋤則無實

五穀蔬菜果蓏之屬
皆如此也
蓏郎果反

黃瓜一名胡瓜四月中種之宜豎柴木令引蔓緣

案黃瓜一條原

本誤入治瓜籠法中據目錄小
註考之當在此條之末今校正

治瓜籠法

齊民要術旦起露未解以杖舉瓜蔓散灰于根下後一兩日復以土堆其根則永無蟲矣又摘瓜法在步道上引手而取勿聽浪人踏瓜蔓及翻覆之若無蔓而種瓜者地雖美好正得長苗直引無多槃岐故瓜少子若無蔓處豎乾柴亦得凡瓜所以早爛者皆由腳躡及摘時不慎翻動其蔓故也若以理慎護及至霜下乃盡矣

區種瓜法

齊民要術六月雨後種菉豆八月中犁掩殺之十月又一轉卽終種瓜率兩步爲一區坑大如盆口深五寸以上壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保澤以瓜子大豆各十枚徧布坑中瓜子大豆兩物爲以糞五升覆之亦令均平又以土一斗薄散糞上復以雙藉其起土故也亦令足微躡之冬月大雪時速併力推雪於坑上爲大堆至春草生瓜亦

生莖葉肥茂異於常者且常有潤澤旱亦無害五月瓜便熟

其掐豆鋤瓜之日

法與常同若瓜子盡生則大概宜掐去之一區四根即足矣

又法冬天以瓜子數枚納熱牛糞

中凍卽拾聚置之陰地量地多少正月地釋卽耕逐畠布之率方一步下一斗糞耕土覆之肥茂早熟雖不及區種亦勝凡瓜遠矣有蟻

者以牛羊骨帶髓者置瓜科左右待蟻附將棄之棄二三則無蟻矣

案此條首行原本脫去齊民要術書名今校增

崔寔曰十二月臘時祀炙薑

所甲切

樹瓜田

四角去蟲

胡溫反瓜中蟲謂之蟲

龍魚河圖曰瓜有兩鼻殺人

博聞錄種

花藥最忌麝瓜尤忌之賸栽數株蒜薤遇麝不損

西瓜

新添西瓜種同瓜法科宜差稀多種者熟地垡頭上漫擲撈平苗出之後根下擁作土盆欲瓜大者一步留一科止留一瓜餘蔓花皆掐去瓜大如三斗栲栳

冬瓜

齊民要術種冬瓜法傍牆陰地作區圓二尺深五寸以熟糞及土相
和正月晦日種二月三月亦得既生以柴木倚牆令其緣上旱則澆之八月
斷其梢減其實一本但留五六枚多留則不成也十月霜足收之早收則爛冬

瓜越瓜瓠子十月區種如種瓜法冬則堆雪著區上爲堆潤澤肥好

乃勝春種

瓠今名葫蘆
古通曰瓠

齊民要術氾勝之書曰區種瓠法收種子須大者若先受一斗者得
收一石受一石者得收十石先掘地作坑方圓深各三尺用蠶沙與
土相和令中半若無蠶沙牛糞亦得生著坑中足躡令堅以水沃之候水盡卽
下瓠子十顆復以前糞覆之旣生長二尺餘便總聚十莖一處以布
纏之五寸許復用泥泥之不過數日纏處便合爲一莖留強者餘悉
掐去引蔓結子子外之條亦掐去之勿令蔓延留子法初生二三
子不佳去之取第四五六區留三子卽足旱時須澆之坑畔周匝小

渠子深四五寸以水停之令其遙潤不得坑中下水 家政法曰二月可種瓜瓠 四時類要種大葫蘆二月初掘地作坑方四五尺深亦如之實填油麻菜豆糞糞同穢及爛草等一重糞土一重草如此四五重向上尺餘著糞土種十來顆子待生後揀取四莖肥好者每兩莖肥好者相貼著相貼處以竹刀子刮去半皮以刮處相貼用麻皮纏縛定黃泥封裹一如接樹之法待相著活後各除一頭又取所活兩莖準前刮去皮相著一如前法待活後唯留一莖四莖合爲一本待著子揀取兩箇周正好大者餘有旋旋除去食之如此一斗種可變爲盛一石物大此莊子魏惠王大瓠之法

芋

齊民要術氾勝之書曰種芋區方深皆三尺取豆糞豆糞音其內區中足踐之厚尺五寸取區上溼土與糞和之內區中糞上令厚尺二寸以水澆之足踐令保澤取五芋子置四角及中央足踐之旱數澆之糞

爛芋生子皆長三尺一區收三石 又種芋法宜擇肥緩土近水處
和柔糞之二月注雨可種芋率二尺下一本芋生根欲深勦其旁以
緩其土旱則澆之有草鋤之不厭數多治芋如此其收常倍 列仙
傳曰酒客爲梁使蒸民益種芋三年當大飢卒如其言梁民不死
芋以救饑饉度凶年今中國多不以此爲意後生至有耳目所不聞見者及水旱風蟲霜雹之災便致餓死備道白骨交橫知而不種坐致泯滅悲夫 慡本新書芋宜沙白地地宜深耕二月種爲上時相去六七
寸下一芋芋羞二月衆人來往眼目多見并聞刷鍋聲處多不滋息
比及炎熱苗高則旺頻鋤其旁秋生子葉以土壅其根芋可以救饑
饉蟲蝗不能傷霜後收之冬月食不發病其餘月分不可多食霜後
芋子上芋白擘下以滾漿水燂過曬乾冬月炒食味勝蒲筍 區芋
區長丈餘深闊各一尺區行相閒一步寬則透風滋息

葵

齊民要術葵廣雅曰薌邱葵也廣志曰胡葵其花紫赤案今世葵臨有紫莖白莖二種種別復有大小之殊又有鴨腳葵也

種時必燥曝葵子

葵子雖經歲不浥然

地不肥也

地不厭良故

墟彌善薄卽糞

溼種者疥而不肥也

地不厭良故

墟彌善薄卽糞

溼種者疥而不肥也

地不厭良故

墟彌善薄卽糞

之不宜妄種春必畦種水澆

春多風旱非畦不得且畦者

省地而菜多一畦供一口

畦長兩步

大則水難均又不容人足入

深掘以熟糞對半和土覆其上令厚一寸鐵

齒耙耨之令熟足蹋使堅平下水令徹澤水盡下

葵子又以熟糞和

土覆其上令厚一寸餘葵生三葉然後澆之

澆用晨夕日中便止每一招輒耙

耨地令起下水加糞三招更種一歲之中凡得三輩

凡畦種之物治畦皆如種葵法

不復條列繁文

早種者必秋耕十月末地將凍散子勞之

一畝三升正月人末散子亦得

足踏踐之乃佳

踏者地釋卽生鋤不厭數五月初更種之

春者旣老秋葉未生

故種此相接

六月一日種白莖秋葵

白莖者宜乾紫莖者乾則黑而澀

秋葵堪食仍留五

月種者取子

春葵子熟不均故須留中輩

於此時附地剪卻春葵冷根上耕

音生

者柔軟至好仍供常食美于秋菜

留之亦中爲榜簇招秋葉必留五六葉

不招

則莖孤留葉則科大

凡招葵必待露解葵日中不剪韭

留其岐歧多者則去

地一二寸獨莖者亦可去地四五寸

耕生肥嫩比至收時高與人膝等莖葉皆美科雖

不高菜實倍多其不剪早生者雖高數尺柯葉堅硬全不中食所可
用者唯有葉心附葉黃蒼至惡竟亦不美看雖似多
其實收待霜降傷早黃爛榜簇皆須陰中見日亦澁其碎者割訖卽地中
倍少傷晚黑澁

崔寔曰六月六日可種葵中伏後可種冬葵

九月作葵菹乾葵

茄子

齊民要術種茄子法茄子九月熟時摘取擘破水淘子取沈者速曝
乾裏至二月畦種治畦下水一如葵法著四五葉兩時合泥移栽之
若旱無雨澆水令徹澤夜栽十月種者如區種瓜法推雪著區中則
之白日以席蓋勿令見日

不須栽其春種不作畦直如種凡瓜法者亦得惟須曉夜數澆耳

務本新書茄初開花斟酌窠數削去枝葉再長晚茄秋深老茄煮軟
水浸去皮以鹽拌勻冬月食用旋添麻油爲上

蔓菁

齊民要術種不求多惟須良地故墟新糞壞牆垣乃佳

若無故墟糞者以灰爲糞

令厚一寸灰多耕地欲熟七月初種之一畝用子三升從處暑至八月白露節皆
得早者作薺晚者作乾則燥不生也漫散而勞種不用溼溼則地堅葉焦既生不鋤九月末收葉晚
則黃落仍留根取子十月中犁麤畊力輒反耕拾取耕出者若不耕時
不茂實其葉作薺擬作乾菜及醃女亮反薺者耳須留第一好菜擬之
割訖則尋手擇治而瓣並善之勿待萎萎而後爛掛著屋下陰中風涼
處勿令煙熏煙熏則苦燥則上在廚積置以苦之積時宜候天陰潤不爾
春夏畦種供食者與畦葵法同剪訖更種從春至秋得三輩常供好
薺取根者用大小麥底六月中種十月將凍耕出之一畝得數車
又多種蔓菁法近市良田一頃七月初種之早出者根細
六月種者根雖麤大葉復蟲食七月末者葉雖
膏潤根復細小七月初種根葉俱得漢桓帝詔曰橫水爲災五穀不登令所傷郡國皆
種蔓菁以助民食然此可以度凶年救饑饉乾而蒸食既甜且美若
凶年一頃可活百人務本新書耕地宜加糞往復勻蓋秋初可種自破甲至
結子皆可食十月初採苗爛作和菜餘者曬過留根在地或慮河朔

地寒凍死可于十月終以牛隔兩犁耕一犁拾去菜根之後卻將畠土擺勻據先耕出之數曬過冬月蒸食甜而有味春生薹苗亦菜中上品四月收子打油陝西惟食菜油燃燈甚明能變蒜髮比芝麻易種收多油不發風武侯多勸種此菜故川蜀曰諸葛菜油臨時熬用少摻芝麻煉熟卽與小油無異

蘿蔔胡蘿蔔附

齊民要術種菘蘆菔

蒲北法與蔓菁同

菘菜似蔓菁而大方言曰蕪菁紫花者謂之蘆菔根實麤

大其角及根葉並可生食
取子者草覆之不則凍死

四時類要種蘿蔔宜沙輒地五月犁五

六偏六月六日種鋤不厭多稠卽小閒拔令稀至十月收窖之

新

添種蘿蔔先深斲成畦杷平每畦可長一丈二尺闊四尺用細熟糞

一擔勻布畦內再斲一偏卽起覆土再耙平澆水滿畦候水滲盡撒

種于上用木欵勻撒覆土苗出兩葉旱則澆之每子一升可種二十

畦水蘿蔔正月二月種六十日根葉皆可食夏四月亦可種大蘿蔔

初伏種之水蘿蔔未伏種皆候霜降或醃或藏皆得用如要來年出種深窖內埋藏中安透氣草一把至春透芽生取出作壠或畦下糞栽之旱則澆須令得所夏至後收子可爲秋種 胡蘿蔔伏內畦種或壯地漫種

蜀芥芸薹芥子

齊民要術蜀芥芸薹取葉者皆七月半種地欲糞熟種法與蕪菁同既生亦不鋤之十月收蕪菁訖時收蜀芥中爲鹹淡二菹亦任爲乾菜芸薹足霜亦收不足霜即澆種芥子及蜀芥芸薹取子者皆二三月好雨澤時種二性不耐寒經冬旱則畦種水澆五月熟而收子芸薹冬天草覆亦得取子又得生茹供食

務本新書芥子菜宜秋前種大槩雖不及蔓菁餘亦頗同子作芥花芥末如近城郭芥菜宜多種蓋冬月醃藏家家用度曬乾無煙兩處架起三年亦可食

薑

齊民要術薑宜白沙地少與糞和熟耕如麻地不厭熟縱橫七徧尤
善三月種之先種糲構尋壟下薑一尺一科令上土厚三寸數鋤之
六月作葦屋覆之不耐寒九月掘出置屋中中國多寒宜作窖以穀得合埋之得奴勤反穀

穰中國土不宜薑僅可存活勢不可滋息種者聊擬藥物小小耳

崔寔曰三月清明節後十日封生薑至四月立夏後蠶大食芽生可
種之九月藏茈將几薑其歲若溫皆待十月之生茈謂薑

四時類要種

薑闊一步作畦長短任地形橫作壠相去一尺餘五六寸壠中一尺
一科帶芽大如三指闊蓋土厚三寸以蠶沙蓋之糞亦得芽出後有
草卽耘漸漸加土已後壠中卻高壠外卽深不得併上土鋤不厭頻
菌子

四時類要三月種菌子取爛構一名木及葉于地埋之常以泔澆令
溼三兩日卽生又法畦中下爛糞取構木可長六七寸截斷碓碎
如種菜法于畦中勻布土蓋水澆長令潤如初有小菌子仰杷推之

明日又出亦推之三度後出者甚大卽收食之本自構木食之不損

人

蒜

齊民要術蒜宜良輒地

白軟地蒜甜美而科大黑軟次之剛強之地辛辣而瘦小也

三徧熟耕九

月初種種法黃鶴時以糲構逐壠手下之五寸一株

諺云左右通一鋤一萬餘株

曳勞二月半鋤之令滿三徧

勿以無草而不鋤則科小

條拳而軋之

獨科葉

黃鋒出則瓣於屋下風涼之處

早出者皮赤科堅則皮皴而易碎皴他骨反皮壞

也冬寒取穀得布地一行蒜

一行得凍死不爾則

收條中子種者一年爲

獨瓣種二年者則成大蒜科皆如拳又逾于

凡蒜矣不爾則

瓦子壠底置獨瓣蒜于瓦上以

土覆之蒜科橫闊而大形狀殊別亦足以爲異今并州無大蒜朝歌取種一歲之後還成百子蒜矣其瓣麤細正與條中子同蕪菁根其

大如椀口雖種他州子一年亦變大蒜瓣變小蕪菁根變大二事相

反其理難推又入月中方得熟九月中始刈得花子至于五穀蔬果與餘州早晚不殊亦一異也并州豌豆度井陘已東山東穀子入壺關上黨苗而無實皆余目所親見傳信傳疑蓋土地之異者也

種澤蒜法預耕地熟時採取子漫散勞之澤蒜可以香食吳人調鼎

率多用此根葉作菹更勝蔥韭此物蕃息一種永生蔓延滋蔓年年
稍廣閒區斂取隨手還合但種數畝用之無窮種者地熟美于野生
崔寔曰布穀鳴收小蒜六月七月可種小蒜八月可種大蒜四
時類要種蒜作行下糞水澆之務本新書蒜畦栽每窠先下麥糠
少許地宜虛春暖則鋤拔薹時頻澆剗麥時人多食解暑毒

薺薺同

齊民要術薺宜白軟良地三轉乃佳二月三月種八月九月率七八
支爲一本薺二蒜四移薺者三支爲一本種薺者四支爲一科然支多者科圓大故以七八爲率薺子三月
葉青便出之未滿令薺瘦燥曝擇去莖餘切郤殼根留殼根而溼得肥也先重穢構地壠燥培而種之壠燥則薺肥構重則白長率一尺一本葉生卽
鋤鋤不厭數薺性多穢荒則羸瘦五月鋒八月初構不構則損白短葉不用剪剪則損食者經久不別種九月十月出賣經久不佳也擬種子至春地釋卽曝之崔寔曰正
月可種薺韭七月別種薺矣四時類要正月上辛日掃去薺畦中

枯葉下水加糞

蔥

齊民要術收蔥子必薄布陰乾勿令浥鬱

蔥性熱不喜浥
浥鬱則不生其擬種之

地必須春種菜豆五月掩殺之比至七月耕數徧一畝用子四五升

良田五升
薄地四升炒穀拌和之

蔥子性澁不以穀和下不炒穀則草穢生

兩櫟重構竅瓠下

之以批

蒲結反

契

蘇結反

繫腰曳之七月納種至四月始鋤鋤徧仍剪剪

與地平

高留則無葉
深剪則傷根

剪欲旦起避熱時良地三剪薄地再剪八月止

不剪則不茂
剪過則根跳若

八月不止則蔥無袍而損白

不去枯葉春
葉則不茂

二月三月出之

良地二月出

收子者別留之蔥中亦種胡荽尋手供

食乃至孟冬爲菹亦不妨 四時類要種蔥炒穀攬勻塞縷一眼於

一眼中種之他月蔥出取其塞縷一眼之地中土培之疏密恰好又

不勞移

韭