

沈訥仲先生病機彙論

吳郡門人馬

叙元儀校定

中風門

脉法

要畧云、脉微而數、中風使然。頭痛脉滑者、中風。風脉虛弱也。寸口脉浮而緊、寸口脉緩而遲、皆中風也。

脉經曰、浮而大者風、浮而緩皮膚不仁風寒入肌內、涓而浮散者癱瘓風、誇人被風不仁瘻壁其

脉虛者生堅急疾者死

中風之脉各有所兼。兼則益造其偏。然必顯呈於脉。蓋新風挾舊邪。或外感。或內傷。其脉隨之忽變。兼寒則脈浮緊。兼風則脉浮緩。兼熱則脉浮數。兼疫則脉浮滑。兼氣則脉沉濇。兼火則脉盛大。兼陽虛則脉微。亦大而空。兼陰虛則脉數。亦細如絲。陰陽兩虛。則微數。或微細。虛滑為頭中痛。緩遲為營衛衰。大抵陽浮而數。陰濡而弱。浮滑沉涓微虛散數。皆為中風。然虛浮遲數。正氣不足。尚可補救。急大數疾邪。不受制必。

死無疑。若大數未至，急疾猶可不死。經言風氣之病似七証而非。故言不死可見。大數為風氣必有之脉亦未可定為死脉也。

經論中風之曰

岐伯曰：八風發邪，以為經風，觸五藏邪氣發病。又云：風中五藏六府之俞，亦為藏府之風，各入其門戶所中，則為偏風。又云：虛風之賊傷人也，其中人也深，不能自去。虛邪偏客於身半，其入深內居營衛，營衛衰則真氣去，邪氣獨居，發為偏枯。其邪氣淺者，脉偏痛。

中風多從虛入

嚴用和云人之元氣強壯營衛和平腠理緻密外邪
為能為害或因七情飲食勞役致真氣先虛營衛空
疎邪氣乘虛而入故致此疾

風病多因熱甚

劉河間曰所謂中風有癱瘓者非謂肝木之風寔甚
而卒中之亦非外中於風良由將息失宜心火暴甚
腎水虛衰不能制之則陰虛陽寔而熱氣怫鬱心神
昏冒筋骨不用而卒倒無知也亦有因喜怒悲憂恐

五志有所過極而卒中者夫五志過極皆為熱甚俗
云風者言末而忘其本也

風為夲氣有病

東垣曰中風者非外來風邪乃夲氣病也凡人年逾
四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾
壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰
而如此

風本於濕

丹溪曰西北氣寒為風所中誠有之矣東南氣溫而

地多濕。有風病者。非風也。皆濕生疫。疫生熱。熱生風也。

風病多兼燥氣

素問論諸風掉眩肢痛強直筋縮為厥陰風木之氣。自大寒至小滿。風木君火二氣之位。風主動善行數變。木旺生火。風火屬陽。多為薰化。且陽明燥金主於緊斂縮勁。風木為病。反見燥金之化。由亢則害。承乃制。謂已過極。則反似勝己之化。故木極似金。况風能勝溫而為燥。風病勢甚而成筋縮燥之甚也。

內因似中風

經曰。神傷於思慮則肉脫。意傷於憂愁則肢癱。魂傷於悲哀則筋寧。魄傷於喜樂則皮槁。志傷於盛怒則腰脊難以俛仰也。

酒濕為病有似中風

元戎云。酒濕之為病亦能作痺證。口眼喝斜。半身不遂。渾似中風。舌強不正。當鴻熱毒不可作風病治之而汗也。

氣病似中風

中風

許學士云。世言氣中者。雖不見於方書。然暴怒傷陰。
暴喜傷陽。憂愁不已。氣多厥逆。往往得此疾。便覺涎
潮脣塞。牙閂緊急。若便作中風用藥。多致殺人。經云。
無過而瘡脉不至。不治自己。謂氣暴逆也。氣復則已。
審如是。雖不服藥亦可。

血厥似中風

有平人居無疾苦。忽如死人。身不動搖。默々不知人。
目閉不能開。口噤不能語。或微知人。惡聞人聲。但如
眩冒。移時方寤。此因出汗過多。血少氣併於血。陽獨

上而不下氣壅塞而不行故身如死氣遏血還隕陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之

諸似中風證

卒然昏仆無汗而冷身體強直口噤戰慄此中寒之類中風也卒倒而瘈昏不知人冷汗自出手中厥冷或吐或瀉此中暑之類中風也食墮胸中胃氣不行忽然厥逆昏仆口不能言肢不能舉此中食之類中風也飛尸鬼擊卒厥客忤手足逆冷肌膚粟起頭面青黑妄見妄言牙閼口襟昏不知人此中惡之類中

風也是數症者本無風邪。若用風乘所謂誅伐無遇也。其死必矣。

中風有四

千金云。岐伯謂中風。大法有四。一曰偏枯。半身不遂。二曰風癱。於身無痛。四肢不收。三曰風瘧。奄忽不知入。四曰風痺。諸痺類風狀。

風分經絡藏府之異

要畧云。風之為病。當半身不遂。經絡空虛。賊邪不馳。或左或右。邪氣反緩。正氣即急。正氣引邪。喝辟不遂。

邪在於絡。肌膚不仁。在經即重。不勝邪入府。則不識。
人入藏。即難言。口吐涎。

東垣云。中血脉者。口眼歪斜。中府者。肢節癱而加五
色。有表證。拘急不仁。中藏者。舌緩失瘡。鼻塞耳聾。目
睂便閉。性命危急。

風分陰陽閉脫

中風之法。全在分別陰陽閉脫。如肢冷而慘。咬牙拘
急。脈弦遲者。陰中也。身熱面赤。四肢溫柔。二便閉滯
者。陽中也。四肢拘挾。牙閔緊急。便溺隔耳。聲目睂者。

閉症也。口開眼合。手撒遺尿。声如鼾睡者。脫症也。五症不全。猶為可治。若髮直吐沫。搖頭目竄而赤如朱。汗出如珠者。斷不可治。

論口眼歪斜

靈樞曰。足陽明之筋。其病頰筋有寒則急。引頰移口。熱則筋弛縱緩不能收。故僻。是左寒右熱。則左急而右緩。右寒左熱。則右急而左緩。故偏於左者。左寒而右熱。偏於右者。右寒而左熱也。夫寒不可徑用辛熱之劑。蓋左中寒則逼熱於右。右中寒則逼熱於左。陽

氣不得宣行故也

經脉拘繩有寒有熱

景岳曰中風唇口流涎。声重語遲含糊者。是皆縱緩之類。縱緩多由乎熱而聞亦有寒者。氣虛故也。歪斜牽引抽搐反張者。皆拘急之類。拘急多由乎寒而亦有熱者。血虛故也。經所言者理之常。余所言者理之變也。

論真氣不周為偏枯為瘓

心是天真神氣開發之本。胃為谷氣充大真氣之標。

氣作機

是天真神机

標本相得。則胸膈間之膻中氣海。所留宗氣。盈溢分布。四藏三焦。上下中外。無不周偏。若標本相失。則不能致其氣於氣海。而宗氣散矣。故分布不周於經脉。則偏枯。不周於五藏。則瘡也。

四肢不舉有虛有實

四肢不舉。皆屬脾土。膏粱太過者。積熱內壅。為脾土癥實。宜瀉以開其壅。食少體羸。怠惰嗜臥者。為脾土虛衰。宜補以健其運。

中風偏枯不可執左血右痰

大經之道路。左有十二經。右有十二經。推曲脣脉可
分腹由任脉所界。全藉宗營二氣行運導引。血脉得以流通。則机閑便捷。若營衛之氣偏閑於右。則右癥。偏閑於左。則左癥。蓋氣虛。則氣滯在血脉。不能運動。盡可為死血。氣虛。則氣閑在津液。不能分布。盡可為渴痰。萬不可執左為血。死右為渴痰。

治風分表裏中三法

發明云。中血脉者。外有六經之形證。則從小續命加減。中腑者。內有便溺之阻隔。宜三化湯等通利之外。

無六經之形證。內無便溺之阻隔。宜養通氣。大秦先
湯羌活愈風湯主之。

風症不可輕用續命等湯

治風之法。解表。攻裡。行中道。三法盡矣。然不可執用
前方也。如小續命湯。亦麻黃桂枝之變。麻黃桂枝若
不施於冬月。即病之傷寒。而施於溫熱之症。未有不
殺人者。况邪之所乘。其氣必虛。世間內傷者多外感
者。間而有之。其可執乎。

治風不可妄下