

詳註
大書

醫學入門

上海廣益書局
印行

第四冊

總方

外科總方

溫暑傷寒

六經

賦傷寒

五法正傷寒

類傷寒

賦初

初症雜症

變症

賦雜症

瘥症危症

殆症

賦婦人傷寒

婦人傷寒賦六經

賦正傷寒傷寒總方

內傷



傷寒序

欲識傷寒之義者。先正傷寒之名。百問云。冬曰傷寒。春曰溫病。夏曰熱病。通而言之。為傷寒者何哉。蓋邪之所湊。其氣必虛。冬月陽氣不密。以致寒邪觸犯。其即發而為病者。名曰傷寒。其不即發。至春感溫氣而發者。名曰溫病。至夏感熱氣而發者。名曰熱病。溫熱雖發於春夏。而其受病之因。隔冬寒毒藏於肌骨。而自裏發之。故通而言之。為傷寒也。仲景傷寒立論。萬世典也。河間溫暑補方。三時用耳。至於傳經直中。別陰陽雜症。乃丹溪之獨見。傷寒大義如此。然西北風高。傷寒者多。東南地燠。肉傷者多。是以東垣又作內外傷論以辨之。傷寒之書。至此可謂全且備矣。奈何今之醫者。或讀傷寒一二。而不理會雜病內傷。或竊內傷雜病一二。而不理會傷寒。主傷寒者。專一發散。主內傷者。專一溫補。內外莫辨。殺人慣矣。陶節菴曰。醫者不可一日不讀傷寒。以活心源。愚謂讀傷寒而不讀三子之書。亦不足以活心源。噫。三世四家之書。缺一不可。

萬歷丙子初夏序

中國醫藥大學圖書館藏

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.



精校 醫學入門 卷四

病機 外感 溫暑 傷寒

河間劉先生溫暑纂要

【諸風】掉眩乃肝木

掉，搖也。眩，昏亂旋轉也。由風木旺甚生火，痛痒瘡瘍，心火屬。

大氣者，微熱則痒，熱甚則痛。肘近則灼，而為瘡，皆火之用也。痒者，美疾也。瘡得火而旺，於

夏而萬物蕃美，或云痛為實，痒為虛，非謂虛為寒也。正謂熱之微甚也。瘡得火而旺，於

者，爬今皮膚辛辣，而屬金化，辛能散故也。瘡痒屬熱，而濕腫滿本脾土經。

出膿水，猶肉果熱極，則腐潰而為水，反兼水之化也。而濕腫滿本脾土經，土濕過極也。

則痞塞腫滿物濕亦然，故氣臏鬱痿肺金伏，臏謂臏滿也。鬱謂奔迫也。痿謂手足痿

長夏屬土，則庶物隆茂也。氣臏鬱痿肺金伏，臏謂臏滿也。鬱謂奔迫也。痿謂手足痿

氣臏滿，奔迫不能上升，至於手足痿弱，不能運動。由肺金本燥，燥之為病，血衰不能

榮養百骸，故指得血而能攝足得血而能步。秋金旺則霧氣蒙鬱，而草木萎落，病之

象也。痿，寒之收引腎水鄉，收斂引急，寒之用也。五運主病樞要目。【諸暴】強直支病

猶萎也。寒之收引腎水鄉，故冬寒則拘束矣。五運主病樞要目。【諸暴】強直支病

裏急筋縮腰戾本足肝膽二經厥陰風木之氣暴卒也。強直，堅勁也。支痛，支持也。謂

戾，乖戾也。謂筋縮裏急，乖戾失常而病也。然燥金動切本病，反兼金化，由亢則害承

乃制也。况風能勝濕而為燥也。風病勢甚，而成筋緩者，燥之甚也。故甚者，皆兼於燥也。

【諸病】喘嘔及吐酸暴注下迫轉筋難小便渾濁血溢泄瘤氣結核瘍疹斑癩疽吐

下霍亂症臏鬱腫脹鼻塞乾靛衄淋秘身發熱惡寒戰慄驚惑間笑悲謔妄衄瀉污

腹脹鼓之有聲和少陰君火手二經真心小腸氣之過。喘，大氣甚則氣盛而息粗也。

嘔，胃膈熱甚，大炎之象也。吐

精校醫學入門 卷四 溫暑 廣益書局印行



酸木味為酸如飲食熱則易於酸矣暴注卒瀉火性連故也下迫裏急後重也火燥能令下焦急迫也轉筋熱燥令筋而自轉也小便渾濁寒則水清熱則水濁溢於上竅泄血出於下竅瘡氣赤痢丹霍亂熱甚氣則傳化失常或下永穀不化膿胸膈憤悶或引背痛也鬱熱不通鼻出清涕衄血不通也腫脹陽熱大便滯熱能耗液故也發熱惡寒邪在表也戰慄火熱過極反兼水化恐則傷腎水寒故也驚心卒動而不寧感昏惑而志不一笑火盛喜發悲火盛凌金金不受制故發悲語多言也心熱神亂則言妄出妄狂妄也心熱神昏則目有

滿諸隔痞體重吐下附腫痿肉如泥之按不起太陰濕土足二經脾與從中胃之氣

欲閉嘔涌溢食下不能目昧不明潤癆弱或禁慄之如喪神暴病暴死暴注利少陽

相火手二經心胞絡與三焦氣

金肺與大腸氣

上下水液出清

冷癥瘕癩疝堅痞病腹滿急痛利白清食已不饑吐利腥屈伸不便與厥逆厥逆藥

固太陽經腎與膀胱為寒水陰陽標本六氣裏上下水出清冷寒則水自澄清癥氣

結之塊蓋由久於月水沉滯久而成痼也亦有熱者當以標本明之癩疝足厥陰寒

寒則陰腫也堅痞消穀利腥穢水寒則不能踏攀而冷清白水寒則清淨明白食已

不自感故水腥也屈伸不便厥逆禁固謂手足奪寒並補不遵桂枝麻黃之謂也若用辛熱

一十八劑古人不傳之妙乃補之藥所遺亡也非溫濕與榮隨症選用真有

清平之世同水化也雖辛熱之藥不遺亡也非溫濕與榮隨症選用真有

之藥則發黃又斑變壞之病作矣蓋人內火既動外火又侵所以幸熱發汗

不如辛涼藥也又斑變壞之病作矣蓋人內火既動外火又侵所以幸熱發汗

胸虛痞或合劑解小柴胡湯半表半裏者病已傳變清涼膈散者用吐下後無異症

天水小柴胡劑解小柴胡湯半表半裏者病已傳變清涼膈散者用吐下後無異症

湯裏太熱者用表裏大熱合柴胡湯調胃承氣湯裏熱無脈吐瓜蒂散胸膈

甚者用劑天水益元散傷寒餘日暑白虎湯中暑汗者用半表半裏者用或

解之或裏熱內感陽厥極皆因失下而成此症自進涼膈劑黃連解毒湯劑淡五

天合而為一調合陰陽洗滌臟腑則其他症自不生矣劑火劑黃連解毒湯劑淡五

冷癥瘕癩疝堅痞病

固太陽經腎與膀胱

結之塊蓋由久於月水

寒則陰腫也堅痞消穀

不自感故水腥也屈伸不

一十八劑古人不傳之妙

之藥則發黃又斑變壞之

胸虛痞或合劑解小柴胡

天水小柴胡劑解小柴胡

湯裏太熱者用表裏大熱

甚者用劑天水益元散傷

解之或裏熱內感陽厥極

天合而為一調合陰陽洗

湯裏太熱者用表裏大熱

甚者用劑天水益元散傷

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

腹滿急痛利白清

食已不饑吐利腥

屈伸不便與厥逆

厥逆藥

清涼膈散者用吐下後

無異症

瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

吐瓜蒂散胸膈

清夜 溫暑 廣益書局印行

承氣湯合解毒語發黃者並用○已上一十八劑二十四方二十四味溫暑熱

仲景張先生傷寒纂要詳傷寒百問百症歌活人書陸氏傷寒未睹其書

嘗聞病皆起於傷寒治莫精於仲景一百一十三方如水有源溫補總方變和之解

也三百九十七法如衣有領不過陰陽表惜乎全書亡而後益支離記性拙而聊從

簡省姑以六經言之

【太陽】則頭痛身熱脊強此太陽正病也以後凡言太陽症即頭痛身熱脊強也

故頭項背脊強頭者諸陽之會邪氣熱則病皆一二日發以其脈上連風府

而後發熱陽雖人身正氣鬱則為邪熱熱則病皆一二日發以其脈上連風府

也惟不發熱而但惡寒者邪發於陰也或熱熱雖甚不死蓋傷寒始於寒而數成於熱

或過經不解或汗多溺難或汗後不嘔或汗多不止【陽明】則目痛鼻乾不眠

陽之中陽氣盛極故曰陽明此邪變熱身前皆熱煩渴者煩甚津乾便艱或不和也

痛鼻乾身熱者陽明主肌肉邪甚則身熱煩渴者煩甚津乾便艱或不和也

之正陽明少陽主筋然亦有裏寒下利或寒氣初結積而為痼者少陽寸俱弦

聾脇痛寒熱嘔而口苦少初也陽氣初結積而為痼者少陽寸俱弦

【太陰】腹滿自利尺寸沉而津不到咽

疑矣此以經所主血吐而能食者為三陰不受邪也若身無大熱躁問者陽去入陰在表則



見四陽脈發利其裏則布胃脈絡於寸俱沉實有力當下細無溫大便不通

如傷飲食冷氣入脾必腹痛胸膈不熱或利不渴之終冷陰始陽經少陰

宜下直中陰經溫少陰病當五六日發其脈起於心貫腎絡於肺

口下微渴或吐不利腹脹或大便乾秘不飲則欲飲者乃陰毒入

逆深也或吐不利腹脹或大便乾秘不飲則欲飲者乃陰毒入

得病者宜吐之或利體痛咳者氣也或飲入口則吐脈弦微逆者乃陰毒入

無復可傳再傳則逆於太陽經矣脈寸俱沉實有力當下細無溫大便不通

病自急也或陰囊受病當六七日發矣脈寸俱沉實有力當下細無溫大便不通

於內也或木移熱下以脾受也或六腑皆困禁引小腹痛此經傳厥陰風熱

發熱者和水或發熱惡寒如瘧疾或下利腹脹身有燥熱氣也

下利清穀大汗出而厥者不治也或手足厥者當發熱而後消渴難拘

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

言包陰經遺症如也宜溫之六經之症即此病也

少陰
舌乾
口燥

厥陰
煩滿
囊拳

傷寒

廣益書局印行



口陳本焦氣湯枝請明陰經風督之太府不而惟胃身也犯動寒厥氣巷猶
 燥湯腹無湯渴餘詳明後經者有自而此傳也陽黃可極子氣之又之而水陰下云當
 或腹滿形少而月言先者此間背上行醫少反者凝濁降而次外生木明見汗
 遠滿痛膽陽有九之脫標邪傳入行也誤者葛此者一自者陽氣主受氣陽症即
 臍者謂無三汗味太為者稍無二直有而當根若夫入而陽為氣行而氣陽相直用
 硬瓜之出焦不羌陽本餘未體經中太陽傷傳府之陽自深自下於榮自人逆三陰桂
 痛蒂腑入相解活勝餘做本體經中太陽傷傳府之陽自深自下於榮自人逆三陰桂
 或散熱之入火者湯脫此者不者太陽傷傳府之陽自深自下於榮自人逆三陰桂
 心如咽路為白陽為此者不者太陽傷傳府之陽自深自下於榮自人逆三陰桂
 下自乾故本虎明本以根可有陽傷傳府之陽自深自下於榮自人逆三陰桂
 硬利腹從遊湯大故客本拘不少風之而也自深自下於榮自人逆三陰桂
 痛不滿中行胃腸頭邪以於傳陽以序反太傳至中肚大衛鼻身其氣少即太脉
 或渴手治一為為痛言主日而自致也下陽於於腹腹陰肋至腕而陰救陽沉
 下或足標身本標脊之言數罷面陰又有陷經陰腹至乎身側皆其會下而太活即
 利嘔溫本故目與強先之也者入血自太之傳作而臍先五側皆其會下而太活即
 純吐者桂小熱鼻為腸為為絡云罷中熱即太陽者當因極於死主故頭上陰法用但
 清者屬枝柴膽為潮裏標本為六再陽蓄勝厥陰太府黃也而反陽於於手肝木其於
 水臍加胡湯標汗閉惡為病腑邪有首逆傳頂者當甚用二桂柴傳此主之消部必
 或臟大湯標汗閉惡為病腑邪有首逆傳頂者當甚用二桂柴傳此主之消部必
 擔病黃太耳閉惡為病腑邪有首逆傳頂者當甚用二桂柴傳此主之消部必
 便中湯或肺脇滿寒發熱為標本如得直陽謂之而宛傳熱有同
 閉湯小九少柴標咽熱為病腑邪有首逆傳頂者當甚用二桂柴傳此主之消部必
 承少柴標咽熱為病腑邪有首逆傳頂者當甚用二桂柴傳此主之消部必
 氣陰胡湯乾身身目目黃苦脾為三承肌桂者
 湯心湯乾身身目目黃苦脾為三承肌桂者
 腎為本故黃舌者茵為三承肌桂者
 標故黃舌者茵為三承肌桂者
 面舌者茵為三承肌桂者
 寒乾茵為三承肌桂者

標本須



如刀割唇青不渴吐利胸腹絞痛四肢厥逆指不黑膝小腹痛身如被杖古姜附湯厥陰
 心胞絡為標故舌卷厥逆冷過肘膝吐利或手足不溫者大便溏滿者
 西順大承氣湯本主男囊縮便自調者必愈不愈此後祖汗吐下溫於此而一惟甚則
 屬熱桂麻各半湯似其囊乳縮內秘其孰能與於斯乎此後祖汗吐下溫於此而一惟甚則
 汗者各半湯似其囊乳縮內秘其孰能與於斯乎此後祖汗吐下溫於此而一惟甚則
 病機到宜利汗宜非仲景玉內秘其孰能與於斯乎此後祖汗吐下溫於此而一惟甚則
 吐宜下宜利汗宜非仲景玉內秘其孰能與於斯乎此後祖汗吐下溫於此而一惟甚則
 榮血獨陰利汗宜非仲景玉內秘其孰能與於斯乎此後祖汗吐下溫於此而一惟甚則
 然宜獨陰利汗宜非仲景玉內秘其孰能與於斯乎此後祖汗吐下溫於此而一惟甚則
 者傷寒因煩為傷風口苦咽乾目眩故發為溫病至夏純生化之源發為熱病所以
 太陽少陰二經先經可解而腑可下陽明為主焉表裏多表少為在經宜清肌解
 受病最多最光經可解而腑可下陽明為主焉表裏多表少為在經宜清肌解
 通裏蓋陽明標雖主肌而入於腑可汗而已然獨陽明為十二經之長而有在經宜清肌解
 乎仲景曰三陽受病未入於腑可汗而已然獨陽明為十二經之長而有在經宜清肌解
 在經者仍宜微汗之蓋榮衛屬太陽主行三部臟腑三陰主筋骨併兩足故太陽之上有
 腸胃也胸膈主少陽主血榮衛屬太陽主行三部臟腑三陰主筋骨併兩足故太陽之上有
 症之表胃為陽症之裏若行裏者胃腑而分表裏則臟腑又深臟為裏若合榮衛則亦不
 分表裏則胃為陽症之裏若行裏者胃腑而分表裏則臟腑又深臟為裏若合榮衛則亦不
 更傳不則表者榮衛之所行裏者胃腑而分表裏則臟腑又深臟為裏若合榮衛則亦不
 可不知少陽原從乎中治禁汗禁下少陽居太陽之表陽明之深臟為裏若合榮衛則亦不
 陰中只宜和之解以小柴胡湯犯三禁則變不可勝他陽明之深臟為裏若合榮衛則亦不
 血熱入裏而難解陽明經禁汗與滲犯之則竭津血蓄下而陽經禁汗恐生發之氣則入
 白湯是也又下三陰利用乎變法有中有傳三陰最不可執有宜下者有連鬚慙
 症中治見合病下三陰利用乎變法有中有傳三陰最不可執有宜下者有連鬚慙
 症傳非傳人脾腎肝也乃入三陰血分胃與初起腹自利也故仲景謂之傳經者
 下者是非傳人脾腎肝也乃入三陰血分胃與初起腹自利也故仲景謂之傳經者
 也上症加一差生立判雖然傳經直中先賢發之盡矣然自利也故仲景謂之傳經者
 或連陰陽一差生立判雖然傳經直中先賢發之盡矣然自利也故仲景謂之傳經者

經之除經生者或被生冷或犯房慾或粗工猛施汗下真氣衰弱陽症變為陰症如俗所謂陽症歸陰仍宜直中寒症治法故內經止言傳變而不言直中者蓋言變則包直中今局方言傳陰直中三陽傳經三陽病在於表脈浮長弦傳經三陰病在於裏脈沈數實直中三陰病在於經脈沉微緩此表謂傷足而不傷手則可以陽為足之所裏虛實大分非專以陽為熱陰為寒也

然寄旺四季寒熱溫涼之氣皆能傷之况表邪傳裏亦能傷之足經受病其後則少陽必歸於脾胃而為燥糞用湯藥下之而胃自和矣

謂傳足而不傳手不可蓋執為手之所究隨人身之氣每日周行三百六十五骨節以應周天三百六十五度血亦風寒中人先入榮衛晝夜循環無所不至雖手間斷於手經所以一脈不愈而再傳者足經移熱傳於手經深究手足之相撫也

有經分手足其意甚深况手足之相撫也雖手間斷於手經所以一脈不愈而再傳者

分明手足陰病也胸滿乾嘔耳聾即如手厥陰少陽病也認真五臟六府俱有表裏二症蓋人之情慾天之淫邪自然不齊故病多標本兼見假令脈弦六府俱有表裏善怒心下滿者魚肝有風也脈洪面赤口乾善笑身熱者魚心有熱也脈緩面黃身重肢疼嗜臥者魚脾有濕也脈溫面白帶憂喘嗽下胸者魚肺有燥也脈微面黑善

何職何腑表症必同歸於太陽裏症必同歸於陽明噫法無定用病有定體如此則疑於手經之不受病耶又何

右一段論六經正病

【表】可汗而裏可下。表症屬太陽凡見頭痛發熱惡寒清便自調腰項脊強脈浮而虛宜解肌無汗為表實春月陽氣尚微秋月陽氣欲斂俱不可大汗夏月天氣熱玄

表虛宜解肌無汗為表實春月陽氣尚微秋月陽氣欲斂俱不可大汗夏月天氣熱玄

症則卧多踈足陽症內熱而渴陰症則不渴陽症二便閉陰症二便清且利也惟有
 腹痛與嘔陰陽二症俱有然陰脈沉微凡言陽症多得之風寒暑濕邪生於太陽也
 凡言陰症多得之飲食起居喜怒邪生於少陰也

陰陽極者從治非訛

陽邪不深不

故云傷寒挾內傷者十居八九此陰陽正病也
 陰邪不甚不能至於煩躁此水極似火火極似水謂之反化亢極則害之義也
 潮汗秘赤滿渴狂譫甚則斑血喘急然熱極忽然熱伏於內故身寒四肢厥逆狀若
 陰症但身難冷而不欲近衣神雖昏而氣色光潤脈必沉滑而有力此陽極似陰也
 宜「大柴胡湯」下之或白虎湯竹葉石膏湯陰症厥冷吐利不渴靜躁甚則咽痛
 鄭聲然寒極忽熱火浮於外發躁擾亂狀若陽也宜「通身雖煩躁而引衣自蓋口乾煩
 渴而飲水不下脈必沉細無力此陰極似陽也宜「通身雖煩躁而引衣自蓋口乾煩
 藥冷飲之藥熱飲之或熱藥為君而佐以涼藥或冷藥為君而佐以熱劑亦非判然
 如庸醫之差訛也借有熱病服熱藥而愈者必先服寒藥過多寒病服寒藥而愈者
 必先服熱藥過多故耳若夫以寒治熱以熱治寒此「表裏俱熱不可犯上犯下」傷寒
 為逆治逆治者正治也正治之法入執不知之乎

表裏俱熱不可犯上犯下

傷寒熱

又無裏症身微熱者虛熱耳「小柴胡湯」和之不可汗吐以至過經十三日既無表症
 以傷下焦胃氣身熱目中不了了睛不和大便鞭者乃可大柴胡小承「表裏俱有」
 氣下之設或已下而脈數消殺善饑六七日不大便者亦為表裏俱有

察其孰少孰多

之表裏俱見必分多少治之脈浮而大為表煩渴尿赤為裏五苓散主
 閉為裏惡寒頭汗為表「小柴胡湯」主之太陽病因下早而脇熱下利心痞鞭者謂
 之表裏不解「桂枝人參湯」太陽病因下早而腹痛有積者謂之太陽太陰又謂之

裏傳表「桂枝加芍藥湯」甚者加大黃太陽病下利不止脈促喘而汗出表未解
 也「葛根苓連湯」脈弦胸滿者「枳實芍藥湯」之通治表多裏少者「白虎湯」或合小柴
 胡湯裏多表少者五苓散或合「小柴胡湯」

患太陽症脈浮緊者宜汗而汗之不濟者再與汗之若失其汗則寒邪傳經當看傳
 病過何經變出何病若應汗而反下消表邪乘虛內陷則熱蓄於裏變為瘀血懊懣
 胸等症

當下而汗


則為悖悖亡陽謔語厥竭之病熱不退服未和者猶當量虛實

九藥下之。停留餘熱。凡過經氣。【尺遲】暫補何忌。凡尺寸遲弱。血少也。不問風寒初虛。或如異氣。宜與壞症參看。如素實者。小發表攻裏溫裏之方。扶陽助陰抑陰之義。此中湯。或黃芪建中湯。秋脈不遲。方實。表病裏和。則邪入於內。而為陰虛陽盛。故發裏。榮胡湯。亦好。俟脈不遲。方實。表病裏和。則邪入於內。而為陰虛陽盛。故發裏。陽指表裏言。病者為虛。所以扶陽也。裏病表則邪入於內。而為陰虛陽盛。故發裏。不遠熱而用辛甘之劑。所以扶陽也。若陰經自受寒邪。則於內。而為陰虛陽盛。故發裏。宜辛熱。而用抑酸芳之藥。所以扶陽也。若陰經自受寒邪。則於內。而為陰虛陽盛。故發裏。而益有餘。醫殺之。或曰桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。實發裏。宜辛熱。而用抑酸芳之藥。所以扶陽也。若陰經自受寒邪。則於內。而為陰虛陽盛。故發裏。耳。此汗下之機。樞法以得中為責。不及愈於太過。汗有吐。有大汗發表。微解。五法。各有不同。重。下有急下。少與微和。滲利。以分清濁。溫有熱。氣得補者。復盛。更復下之。是重困也。惟虛。敢吐者。和解。則一而已。或曰傷寒無補法。熱氣得補。復盛。更復下之。是重困也。惟虛。從輕。凡傷寒。汗下。藥一服。中病即止。不必盡劑。與雜病不同。傷寒。目未定之時。不知。若用之得當。有何傳變。全症有似是而非。不知寧可不治。有無風濕勞役。疲食等項。在醫者。精明審處之耳。症有似是而非。不知寧可不治。有無風濕勞役。疲食等項。相。魚似是而非。最宜詳辨。故不知者。蓋可不治。班固有言曰。有病不治。得中醫。倘一。藥之。慎。將。噫。古以醫藥救天札。今以醫藥治其生。治生可也。而誤人於死。豈。不與謀劫者同。哉。慎之慎之。

右一段論表裏陰陽汗吐下溫解五法

【傷寒】惡寒無汗。而手足微冷。霜降後。春分前。人有衝斤道途。履霜。踢水。胃犯寒氣。前。輕。後。重。口中。雖不食。亦不惡食。手足不熱。病深。重者。必先惡寒。頭痛。甚。鼻無涕。寒氣。湯。輕。者。陶和。雖不食。亦不惡食。手足不熱。病深。重者。必先惡寒。頭痛。甚。鼻無涕。寒氣。用。麻。杏。仁。飲。此。專。辨。無。汗。為。傷。寒。益。風。暑。濕。皆。有。【傷風】惡風自汗。而手足微。

煩。傷風初症。惟頭痛。口和。初症。傳變。雜症。俱詳。後段。有。傷風。惡風。自汗。而手足微。後能發熱。傷風即能發熱。傷寒手足微厥。傷風手足背皆熱。傷寒鼻無涕。傷風鼻。



流涕共聲如自覺中出傷寒面慘身痛傷風面光身重傷寒無汗惡寒不惡風傷風

有汗惡風不惡寒甚者自汗出不止酒洒惡風復齒齒惡寒冬月桂枝湯自汗

便數者芍藥甘草湯自汗小便利脚膝急者桂枝湯加參附輕者柴胡桂枝湯

時防風沖和湯柴胡桂枝湯或敗毒散自汗不渴者邪在表茯苓桂枝湯

半夏湯古立六經傷風方見後桂枝湯下但三陰藥皆辛熱似非傷寒家法仲

亦風邪直傷陰分其人素虛或房室後傷風則可解通利更無分別今詳桂枝湯

表燥大何也蓋暑火同氣燥濕同源風寒傳變六經暑濕性偏着人五臟汗者氣行

則已怯者乃着為病故耳前所謂晝治表裏急治裏表急陰同於陽為兩感

入於陽半入於陰陰陽兩感臟腑俱病一日太陽與少陰俱病身熱語為陽明邪感於

表口乾而渴為少陰邪感於裏三日陽明與太陰俱病身熱語為陽明邪感於表

不欲食腹滿為太陰邪感於裏五日陽明與少陰俱病身熱語為陽明邪感於表

但稟氣實而感邪淺者或挾異氣或挾風濕之類猶可救療所以仲景有治有先之症

發表攻裏之說當審其表裏緩急虛實何如如表裏俱急者大羌活湯主之如

攻裏如陰症先受病身體痛而下利者為表裏俱急先以葛根黃連湯救裏後以調胃承氣

救表如陰症先受病身體痛而下利者為表裏俱急先以葛根黃連湯救裏後以調胃承氣

中國醫藥大學圖書館藏

