

幼幼集成

鼎錄幼集成卷之三

羅澤陳復正

遂陽周宗

廬陵劉

參定

胎病

兒之初生有病亦惟胎毒二者而已矣胎弱者稟受於氣之不足也
了於父母一體而分而稟受不可不察也稟肺氣爲皮毛肺氣不足則
皮薄情寒毛髮不直稟心氣爲血脈心氣不足則血不華色面無光彩
受脾氣爲肉腴氣不足則肌肉不生手足如削受用氣爲筋肝氣不足
則筋不束骨機閉不利受腎氣爲骨腎氣不足則骨節軟弱久不能行
此皆胎前之病隨其臟氣而求之所謂父強母弱生女必羸父弱母強
生兒必弱故小兒有頭破顱解神慢氣怯項軟頭傾手足痿軟諸症

齊髮生不黑行住坐立須人扶掖者此皆胎稟不足之故也

胎毒者即父母命門相火之毒也命門者男子以藏精女子以繫系道家謂之下丹田也夫一五之精妙合而凝純粹之精鎔液而成胎淫佚之火蓄少則為胎毒至盡人主而靜天不可也感物而動人之欲也成胎之後其母之關係尤繁凡思慮火起於心悲怒火生於肝悲哀火鬱於肺甘肥火積於脾淫縱火發於腎五欲之火隱於母胞遂結為胎毒凡胎毒之發如蟲疥流丹瘰癧癰結核重舌下疳口瘡與夫胎熱胎寒胎搐

是也

若夫七日之胎風百日之痰嗽牛反之真搐

一週之治丹

至烈而不可解也

胎寒者母娠時患熱病多服寒涼之藥或過食生冷令兒受之生後昏臥多睡閒或吐乳瀉自此內因也或百日之內忽病戰慄口冷手足踈

曲不伸腹痛啼叫不止此生後受寒得之治宜溫散指迷七氣湯助胃膏爲佳

胎熱者母娠時喜食熱炙博之物或患熱病失於清解使兒受之生後目閉面赤眼目赤腫驚身呢呢作聲或啼叫驚煩遍身壯熱小便黃澀此熱也若不早治則丹瘤瘡癰由此而至宜集成沉瀝丹徐服解之以平爲度

胎驚者母娠時曾因驚恐氣傳於子生後頻頻作搐其後身熱面青手足搐搦要關緊閉腰直身僵睛邪目閉多啼不乳此乃胎癰不治之證如因身有熱而作者必先啼叫雖曰胎病由外因也宜天麻丸後以六味地黃湯滋其化源久服自愈

盤膠氣者幼科稱內吊者是也皆因胎氣鬱積壅結榮衛五臟六腑無不

舒暢其氣不能升降築隘腸胃之間抵心而痛其聲嘔嘔如猫吐惡聲啼口開手足皆冷宜疎散通氣調中散及木香丸

臍突者小兒多啼所致也臍之下爲氣海啼哭不止則觸動氣海氣動於中則臍突於小其狀突出光浮如吹起者捏之則微有聲用亂髮燒灰枯丸等分爲細末敷突臍上以膏藥貼之自消

不乳者小兒生下二三日間忽然不乳當詢問之勿以不乳作臍風治之臍風有多啼撮口之證此則無之但不乳耳有吐乳乳之又吐者或試口不淨惡寒入腹也宜用枳實木香丁香乳香當歸甘草煎湯與服如啼哭不乳者腹痛也亦胎寒之證宜木香丁香乳香當歸甘草煎湯與服如無已上諸證無故不乳宜問其母之乳汁多少乳多者傷乳也宜少節之不必自思乳矣乳少者必有他證細心察之

胎黃者兒生下面目渾身皆黃如金色或目閉身上壯熱大便不通小便如梔子汁皮膚生瘡不思乳食啼哭不止此胎中受溼熱也宜茵陳地黃湯母子同服以黃退爲度

胎肥者兒生下遍身肌厚肉色通紅面色亦紅而黑睛多時時生痰自滿月以後漸漸肌瘦五心熱而大便難白睛粉紅色此名胎肥是亦在胎時母食甘肥溼熱太過流入胞中以致形質虛肥血分壅滯也加減大連翹飲外以浴法浴之

胎怯時生下面無精光肌肉瘦薄大便白而身無血色目無精彩時時哽氣多噓者此卽胎怯也非育於父母之暮年卽生於產多之孕婦成胎之際元精旣已澆漓受胎之後氣血復難長養以致生來怯弱若後天調理得宜者十可保全一二調元散助之

○入方

桔連七氣湯

一切腹痛寒熱多啼不乳等證皆由陰陽不升降氣道壅塞而然並宜此方凡人身內之氣呼吸出入無刻不與天道陰陽之氣通故六淫外襲節感而致病易受之理也內氣閉塞則天道不通升者不升降者不降寒熱由此而生也是方疎利臟腑神化無方最宜領會

廣陳皮

杭青皮

藿香葉

芽桔梗

蓬莖米

香附米

法半夏

上肉桂

公丁香

益智仁

老薑薑

大紅棗

炙甘草

右咬咀水二碗煎至一碗母子同服

助胃膏 治胎寒內釣胃氣虛弱胸脇脹滿嘔乳便青

白豆蔻

肉豆蔻

麝香包煨

官揀參

廣木香

各兩

公丁香

藟藥 雲茯苓 漂白朮 真藟桂 西砂仁 炙甘草

各一兩 廣陳皮 二錢 洋沉香 二錢 淮山藥 二錢

爲末蜜丸共實大每丸炒米湯化服

集成沉瀝丹 音立 北斗夜半所降之甘露也

治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉

驚口瘡重舌木舌喉閉乳蛾渾身壯熱小便黃赤大便閉結麻疹斑

癍遊風癰疥流丹癰疹瘰癧食風熱疳腮面腫十種火丹諸般風摘神效

此方古書未載得之異授微似舌之神芎丸近有能者妙出化裁而增

損之遂爲幼科有一無二之神方作三焦之主治蓋六臟氣流通者必

不鬱滯或受毒於胎前或感邪於誕後遂爾中氣抑鬱則見以前諸證

方內所有黃芩清下焦之熱大黃清中焦之熱又藉其有推陳致新上

焦之熱黃柏清之功活血除煩之力能導三焦鬱火從魄門而出猶慮

苦寒凝膩復加檳榔枳殼之辛散爲行氣利痰之佐使川芎薄荷引頭
面風熱從高而下趨連翹解毒除煩赤芍調榮活血牽牛利水走氣分
而舒鬱滑石清瀾抑陽火而扶陰又能引邪熱從小便而出用治以前
有餘諸證應如桴鼓予生平最慎攻伐惟此方用之裏久功效莫能殫
述真濟世之良方也

杭川芎

九錢酒洗

錦莊黃

九錢酒蒸

實黃芩

九錢酒炒

厚黃柏

九錢酒炒

黑牽牛

炒取頭末六錢

薄荷葉

四錢五分

粉滑石

六錢飛

尖檳榔

七錢五分重便洗

陳枳殼

四錢五錢錢炒

淨連翹

除去心隔取淨六錢

京赤芍

六錢炒

右十味依方炮製和勻焙燥研極細末煉蜜爲丸如蒸實大月內之兒
每服一丸稍大者二丸俱用茶湯化服乳母忌油膩俱覺微有泄瀉
則藥力行病卽滅矣如不泄再服之重病每日三服以愈爲度此方斷

不較屬辛卯疑畏胎寒胎怯面青白者忌之

天麻丸

治胎搖先以此丸通其經絡次服地黃丸

明天麻

姜法生夏

北防羊

川羌活

牛膽星

直殭蠶

北全蝎

錢各五

爲末蜜丸芡實大每

一丸鈎藤湯下

六味地黃丸

卽仲景所製麥門地黃丸原治腎水虧損小便淋瀝頭目

眩暈腰腿酸軟陰虛發熱自汗盜汗

憔悴瘦弱精神疲困壯水之主以

制陽光此方是也○錢仲陽以之治小兒胎怯稟受先天不足併肝疳

白膜遮睛瀉血失音身瘦瘡疥腎怯語遲解顱行遲等證○薛立齋又

以治小兒肝經血虛燥熱

九腎經虛熱

作渴小便淋秘痰氣上壅或風淫

客氣癰癰結核或四肢搐搦眼目

瞤動或欬血吐血頭目眩暈或咽

喉燥痛口舌生瘡或稟腎不足解顱失音遲五軟腎疳肝疳凡腎肝

不足之證皆用此以滋化源其功能盡述予按錢薛二翁能用此方治小兒先天不足誠卓然有識者予所敬佩奈今之小兒體質元氣更不及前古以地黃丸為補劑今則實為誤劑矣此藥用於陰虛枯燥者誠為得宜倘兒肌肥面白脾弱多痰者服此必致臍膈變生他證其害不小非方之不良由今稟受愈溥乎故為之斟酌其炮製少使地黃陰疑之質稍近陽和致沉寒痼冷始能免臍膈損脾之患矣

大懷地

四兩以西砂仁二兩不必搗碎生姜二兩切片從一

大人好酒者一晝夜以地黃與麻燻為度取起其衣不用以地黃搗膏聽候

白雲苓

二兩乳懷山藥

三兩乳酒棗皮二兩粉丹皮酒炒

宣澤瀉

一兩監水炒焦

右依炮製和勻一處焙燥研為細末和前地黃膏少加煉蜜

右曰內忤勻重一錢一顆半週一歲者每用一九三五歲者

二九俱空腹鹽湯化下倘丸一時未備卽以前藥十分之一但宜炮製不可生用水煎服之名六味地黃湯功效更捷

調中散 治嬰孩盤腸氣腹內築痛

青木香 川練子 暗沒藥 白雲苓 上青桂

抗青皮 萊菔子 陳枳殼 尖檳榔 炙甘草

等分入葱白二寸鹽三錢水煎先服

茵陳地黃湯 治小兒初誕面白渾身其黃如金胎中受熱 懷生地

京赤芍 正川芎 大當歸 天花粉 赤茯苓 結豬苓 茵陳蒿

宣澤瀉 諸藥隨時定分兩水煎每子同服

大連翹飲 治胎肥解熱毒

淨連翹 瞿麥蕙 白滑石 牛蒡子 車前子 川木通

北防風炒梔仁 片黃芩 京茶穗 大當歸 北柴胡

京赤芍 淨蟬蛻 炙甘草 竹葉十片 燈心半莖 水煎服

浴體法 治胎肥

明天麻錢一 淨全蝎去毒 舒朱少各五 烏蛇肉酒浸 枯白礬

洋青黛錢三 真麝香一分 共研勻 每用三錢水三碗 桃枝一握同煎

十沸溫熱浴之 但勿浴背

調元散 治胎怯

揀人參 漂白朮 白茯苓 化橘紅 大當歸 甘枸杞

炙甘草錢二 陳粳米合 爲末 每服二三錢 龍眼煎湯調下

八味地黃丸 治面黃先天不足 卽前六味地黃丸加青桂桂二兩熟

川附一兩 治稟賦命門火衰凡齒遲 遲行遲顙門開大腎瘡等證

火衰不能生土以致脾土虛寒不思乳食臍腹疼痛夜多漩溺皆實寒
天不足自睥周時卽有虛病腎病能從幼填補亦多可復此方用水煎
名八味地黃湯經曰益火之源以消陰翳之謂乳母肥白者母子同服

○驚風闢妄

喻嘉言曰驚風二門古人鑿鑿妄談後世之小兒受其害者不知千百億
兆蓋小兒初生陰氣未足性稟純陽身內易致生熱熱盛則生風生痰
亦所恒有乃以驚風命名隨有八候之自夫小兒腠理不密更易感冒
寒邪寒邪中人必先入太陽經太陽之脈起於目內皆上額交巔還膏
別下項夾脊抵腰中是以病則筋脈牽強遂有抽掣搐搦種種不通各
自妄用金石腦麝開關鎮墜之藥引邪深入臟腑于中于矩徒據小兒
八歲以前無傷寒之說而立驚風二門殊不和小兒不耐傷寒故初傳

太陽一經早已身強多汗筋脈牽強人事昏沉病勢已極湯藥妄投危
亡接踵何由得至傳經解散哉故言小兒無傷寒也不知小兒易於外
感惟傷寒爲獨多而世之妄稱驚風者卽此也是以小兒傷寒要在三
日內卽愈者爲貴若至傳經則無方耐之矣且傷寒門中剛瘧無汗柔
瘧有汗小兒剛瘧少柔瘧多世俗見其汗出不止神昏不醒便以慢驚
爲名妄用參耆木附閉塞腠理熱邪不得外越亦爲大害但比金石差
減耳所以凡治小兒之熱切須審其本元虛實察其外邪重輕或陰或
陽或表或裏當徹其外邪出表不當固邪入裏也仲景原有桂枝湯
舍而不用徒事驚風毫釐千里害豈勝言哉

又曰小兒體脆神怯不耐外感壯熱多成瘧病後世多以驚風立名有四
證八候之說說實卽指瘧病之頭搖手勁者爲驚風之抽掣指瘧病之

卒口噤脚攣者爲驚風之搐搦指瘧病之背反張者爲驚風之角弓反張幼科翕然宗之病家坦然任之不治外淫之邪反投金石腦麝之藥中于死而不悟也

又曰凡治小兒瘧病妄稱驚風名色輕用鎮墜之藥者竝殺其兒此通國所當共禁者也蓋小兒不耐傷寒壯熱易致昏沉卽於其前放銃呐喊有所不知妄揮驚風輕施鎮墜勾引外邪深入內臟中于死從未有自救者通國不爲厲禁寧有底止哉

又曰婦人產後血舍虛外風易入仲景謂新產亡血虛多汗出喜中風故令病瘧後賢各從血舍驅風成法可遵非其不肖者不妄用鎮驚之藥不以小兒驚風之名貽害千古在賢智且不免焉茲約通國共爲厲禁革除驚風二字不許出口入耳凡兒病發熱昏沉務擇傷寒名家循

經救治自不失一於以打破小兒八鬼關天人共快也

瘧擊上聲風強病也

前爲喻先生闢除驚風指明病瘧之說誠善矣

驚風之名誤傳既久沉迷者衆倘不爲之剖晰詳明指出證候治療俾臨證者有所依歸則後

人何能深信予不辭狂瞽請爲詳晰申明之蓋病瘧非止一端男婦皆

有不特小兒爲然也如太陽過汗變瘧風病誤下變瘧瘡家誤汗變瘧

產後汗多遇風變瘧跌撲破傷當風變瘧表虛不任風寒變瘧一切去

血過多變瘧然男婦病此醫者皆從太陽厥陰循經救治未聞以驚風

之治治瘧者無如小兒病瘧獨以驚風名而治者由宋人之訛傳也一

人倡之遂爲起而和之然亦無師之智言爲臆說愈趨愈下遂致於離

經叛道乃有黃帝不知幼少之妄談殊不知內經通語實論有孔子

病熱乳子病風熱脈證之辨刺論有嬰兒肉脆血少氣弱毫鍼之傳經