

證治彙補八



證治彙補卷之八

門人黃 桓賚先

陸永清景山

上海李惺菴先生著
姪邦俊彦章

勇 謨丕文

泄瀉章
誥揆文仝較

大意

濕勝則濡瀉內經脾土受濕不能滲化致傷闌門元氣

不能分別水穀併入大腸而泄瀉指泄者大便溏薄

瀉者大便直下略分輕重總屬脾虛彙補

內因

胃氣和于飲食入胃精氣則輸于脾歸于肺行于百脈而成營衛若飲食起居內外之邪傷于脾胃傳化失節清濁不分上升精華之氣反下降而爲泄瀉矣

要

外候

泄分五種如脾泄飲食不和色黃胃泄腹脹注下食則嘔吐大腸泄食已窘迫色白腸鳴切痛小腸泄澼瀉便膿血小腹痛大瘕泄裏急後重數至圊而不能便莖中痛難經又有飧泄腸垢鴨溏濡泄滑泄之名飧

泄者濕兼風也故惡風自汗完穀不化腸鳴脈弦腸
垢者濕兼暑也故稠粘垢穢小水赤澁煩渴脈數鴨
漉者濕兼寒也故澄徹清冷儼如鴨糞溺白脈遲濡
泄者濕邪自甚也故瀉多清水腸鳴身重溺短脈沉
滑泄者濕勝氣虛也故所下不禁大孔如竹筒直出
不止又食積泄者瀉下腐臭噫氣作酸也痰泄者或
多或少胸悶瀉沫火泄者暴注下迫焦黃穢臭氣泄
者腹常痞滿去不通泰虛瀉者困倦無力食減微漉
必兼體瘦瀼瀼者停蓄飲食數自一瀉必兼腹脹腎
泄者五更腹痛微響乃泄必兼足冷肝泄者忿怒所

傷厥而面青必兼脇滿交腸瀉者大小便易位而出

直腸瀉者飲食入口少頃卽瀉彙補

瀉分久暴

暴注下迫食不及化是無水也溏泄日久止發無恒

是無火也太僕

腹痛分辨

瀉不腹痛者濕也瀉白腹痛者寒也痛一陣瀉一陣

泄復澁滯者火也痛一陣瀉一陣瀉後痛減者食也

腹中脹痛瀉不減者肝氣也腹中絞痛暴瀉煩渴者

霍亂也腹中絞痛下無休時去如蠛渤者氣食交併



也腹中覺冷隱隱微痛下如稠飲者痰也

戴氏

寒熱分辨

熱者小便赤澁煩渴肛門熱穀食腐化或雖不化而色變焦黃身能動作手足溫煖寒者小便清白不渴腹中冷完穀不化色亦不變變亦白色身懶動作飲食不下手足清冷

河澗

腸鳴分辨

濕多成五瀉腸走若雷奔此寒濕之患然亦有火勢攻衝搏擊水氣而鳴者必兼腹痛暴注下迫肛門澁滯小水色黃非若濕症之腹不痛也

景

完穀分辨

完穀不化其因有四曰氣虛曰胃寒曰胃火曰胃風
夫氣虛胃寒固不能傳化矣火者火性急速傳運失
常卽邪熱不殺穀也至于胃風者肝風傳脾脾受其
尅不能變化名爲飧泄乃五泄之一也

醫統

泄瀉死症

脈細皮寒少氣泄利前後飲食不入是謂五虛者死
其漿粥入胃泄注止則虛者活

素問

脈法

瀉脈自沉沉遲寒侵沉數火熱沉緩濕邪沉虛滑脫

凡泄注沉緩弱小者生浮大弦數者死

補藥

治法

凡瀉皆兼濕初宜分理中焦次則分利下焦繼以藥燥濕久則升舉元氣滑脫不禁然後澁之其間風勝兼以解表寒勝兼以溫中虛弱補益食積消導濕則淡滲火則清涼痰則湧吐陷則升提隨症而用不拘次序

藥補

治審虛寔

下積如稠膿者消化爲上去薄而小便短少者利水爲捷若小便如常不必再利惟燥脾而已如兼口渴

則利水與燥脾皆不可用但審溺赤爲有熱如溺短而色不變則補益無疑也

補藥

鬱結當開

憂思太過脾氣結而不能升舉陷入下焦而洩瀉者

宜開鬱結使氣升而穀自化

補藥

鬱熱當清

有肺熱閉錮咳嗽胸滿誤服參朮使肺中之熱回奔大腸而瀉者當先清肺金然後和脾

補藥

泄瀉忌用

補虛不可純用甘溫大甘則生濕清熱不可純用苦



北京中醫藥大學圖書館

1994

館藏

寒太苦則傷脾兜澁不可太早恐留滯餘邪淡滲不可太多恐津枯陽陷必讀

用藥

主以茯苓白朮加陳皮半夏濕加猪苓澤瀉火加黃連白芍寒加炮姜益智風加防風蒼朮食加枳實厚朴食積加查肉麥芽氣虛加人參黃芪氣陷加升麻柴胡泄久脾虛飲食難化加參芪神麴麥芽乾姜泄久腸滑加肉蓯訶子木香有夏月暴注水泄用香茹散益元散有腎脾兩虛每朝五更洞瀉用四神丸漿水散有經年脾瀉用桂香丸椒附丸有痰積肺中魄

門不禁用二陳加防風桔梗探吐有肺熱移腸下爲
腸癖用黃芩地骨皮阿膠百合兜鈴甘草有酒積作
瀉者五更腹鳴作痛瀉下黃赤此酒濕入臟所致非
腎虛者比也宜四苓葛花或金匱澤瀉湯加草薢之
類凡煎瀉藥用甘爛水者取其不助濕而益脾胃也
彙補

選方

白朮茯苓湯 統治泄瀉

白朮 茯苓 甘草

胃苓湯 卽五苓合平胃散

益元散

香茹湯

治夏月暑瀉

俱見暑症

四苓散

治清濁不分因作泄瀉

茯苓

猪苓

白朮

澤瀉

加桂名五苓散

白朮散

白朮

芍藥

各三錢

炮姜

五錢

甘草

二錢

每服二錢水煎

桂枝湯

桂枝

白芍

白朮

各五錢

炙草

二錢

每服五錢水煎

朮附湯

白朮

附子

甘草



北京中医药大学图书馆版权所有

理中湯 見中寒

連理湯 卽理中加茯苓黃連

五味子散 治腎虛人感陰氣而每泄千五更者

五味 二兩 吳萸 五錢 炒研末每服二錢陳米飲下加補

骨肉菜名四神丸

參附湯

人參 一兩 附子 五錢 每服五錢加姜十片煎

二神丸 治脾腎虛洩五更腸鳴

補骨脂 四兩 肉豆蔻 二兩 加五味子二兩吳茱萸五錢

名四神丸

四柱散

濟生

治臟腑虛冷眞陽耗散臍腹冷痛泄瀉

茯苓

附子

人參

木香

各一兩

每服三錢姜五

片加肉菓訶子名六柱散活人方有白朮無訶子

漿水散

古

治脾土陰寒水瀉清冷

半夏

二兩

良姜

二錢半

乾姜

肉桂

甘草

附子

各五

錢

爲末每服三錢

椒朴丸

魏氏

益智

川椒

炒

厚朴

陳皮

白姜

茴香

炒各等分

右用青塩于銀石器內以水浸乾藥用火煮乾焙

燥爲末酒糊丸塩湯下

椒附丸 治腎藏虛寒大便久瀉

椒紅炒 熟附 鹿茸焙 桑螵蛸炙 山藥 山萸

龍骨煨

桂香丸三因 治藏府虛寒為風寒所迫冷滑注下老人

虛人危篤累效

附子 肉豆蔻 茯苓各一兩 桂心 乾姜 木香

各半兩 丁香二錢半 為末麵糊丸米飲下五十丸

戊己丸和劑 治脾胃不足濕熱下乘而泄

黃連 吳萸 白芍各等分 為末麵糊丸如梧子大

米飲下

溫六丸

丹溪

治濕熱氣滯用爲向導上可治吞酸下可

治自利

六一散

七兩

乾姜

一兩

末之粥丸一方去乾姜加吳萸

二兩名參黃丸

節齋泄利方

白朮

茯苓

半夏

陳皮

甘草

砂仁

神

麴

麥芽

三消谷寒黃水
六入一煎
部自味
為六入
中滿熱燥帶出
欲向學士
世欲吞蠅
丁

