

瘰癧 瘰癧 火 吐血 咬血 咯血

衄血 溺血 下血 腸風 痔瘡 漏瘡

脫肛 淋症 小便不通 小便不禁 夢遺

丹溪心法附餘卷之十

痰熱門

三十七

丹溪心法

○痘切不可作風治兼用風藥大率與癰病相似此癰爲甚爲虛
宜帶補多是氣虛有火兼痰宜用人參竹瀝之類

附論

○廣按痘症發作則通身而戰棹皆因氣虛挾痰火所致正猶火炎
而旋轉也火能燥物而使氣液之不足世人不諳誤認爲風而用
風藥風能勝濕是不足之中而又見預也玉璽金鑑曰休治風休
治燥治了火時風燥了夫火爲風燥之本能治其火則是散風而

潤燥何風燥之有哉此痙症所以宜補氣液而兼散痰火也

癰

三十八

丹溪心法

○驚與痰宜吐

大率行痰爲主用黃連南星瓜蒌半夏尋火尋痰

分多分少治之無不愈者

分痰與熱

有熱者以涼藥清其心

有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸

大法宜吐吐後用平肝之

劑青黛柴胡川芎之類龍會丸正宜服之

且如癰因驚而得驚則

神不守舍舍空而痰聚也

戴云癰者俗曰猪癰風者是也

附脉理

脉訣舉要曰癰癰之脉浮洪大長滑大堅痰蓄心狂

附諸方

通泄散

治風涎暴作氣塞倒仆

苦丁香

爲末三升

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎自出如未出舍砂糖一塊下咽涎出

咳痰丸

治風癰

南天星

九蒸九晒

右爲末姜汁糊爲丸如梧桐子大每服二十丸人參湯菖蒲麥門冬湯任下

一方治遠年近日風癰心痒風狂中風涎潮牙關不開破傷風搖

者用皂角不蛀肥者一斤去皮弦切碎以酸漿水一碗浸春秋二

四日夏一二日冬七日搽去滓將汁入銀器或砂鍋慢火熬以槐

柳枝攪成膏取出攤厚紙上陰乾收貯用時取手掌大一片以溫

漿水化在盞內用竹筒灌入病人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止

服溫鹽湯一二口便止忌雞魚生硬濕麵等物

五癇丸 楊氏方 治癲癇發作不問新久並宜服之

全蝎 去毒炒 皂角 四兩槌碎水半升浸 半夏 湯泡七次 南星 泡二兩

烏蛇 一兩酒浸一夕去骨 白附子 兩 雄黃 一兩 白礬 一兩

蜈蚣 半條去頭尾用石 硃砂 二兩半 麝香 二兩 白僵蚕 一兩半炒去絲

右為末姜汁煮麪糊丸如梧桐子大每三十丸姜湯下

控涎方治諸癇久不愈者頑涎結聚變生諸症並宜治之 濟生方

全蝎 二兩 鐵粉 二兩 甘遂 二兩 半夏 二兩 生川烏 去皮

氣所爲也是皆火之變見爲諸病也爲肝虛見火爲心虛見火爲脾虛見火爲肺虛見火爲腎虛見火之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水濕折之從其性而伏之惟黃栢之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立爲陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬爲血虛之病以壯水之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實爲陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰失守無根之火爲陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄

參之屬若右腎命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子
乾姜之屬若胃虛過食冷物遏遏陽氣於脾土爲火鬱之病以升散
之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此之類而求火之爲病施治
何所依據故於諸經集略其說備處方之用庶免實實虛虛之禍
也

附脉理

脉理提綱曰火脉洪數虛則浮

附諸方

九味羌活湯

治春夏秋非時感冒風寒發熱惡寒頭疼項強或無

汗或有汗以代桂枝麻黃青龍各半湯治太陽經表熱之神藥也

此湯非獨治四時風寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜症亦

有神也

六神通解散 治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數見

用九味羌活湯不愈後服此湯

正見傷寒

○已上二方發散風寒表熱之劑

東垣瀉陰火升陽湯 治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛

羌活

甘草

黃芪

蒼朮

升麻

柴胡

一兩半

人參

黃芩

各七錢

黃連

酒炒半兩

石膏

半兩秋深不甲

石咬咀每服一兩或半兩水煎

此藥發脾胃火邪又心膽肝肺

膀胱藥也瀉陰火升發陽氣榮養氣血者也

升陽散火湯

治男子煩人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困

熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏

陽氣於脾土火鬱則發之

升麻

葛根

獨活

羌活

各半兩

防風

二錢半

柴胡 八錢

甘草 炙三錢

人參

白芍 各半兩

甘草

生二錢

右咬咀每服半兩或一兩水煎稍熱服

地骨皮散

治渾身壯熱脉長而滑陽毒火

熾發渴

地骨皮

茯苓

各半兩

柴胡

黃芩

生薑

知母 各一兩

石膏 二兩

羌活

麻黃

各七錢半有汗並去

右咬咀每服一兩入姜煎

○已上三方并散鬱火表熱之劑

小柴胡湯

見傷寒

柴胡飲子

治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來

表熱裏和則發寒熱表不和則發熱

無時身冷脈絕寒戰而必煩渴也及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下

後熱未愈汗後勞復或胃蒸肺痿喘嗽煩人餘疾產後經閉

柴胡

人參

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥

各半兩

右為末每服抄三錢水一盞姜三片煎至七分溫服日三服病熱甚者加服之

防風當歸飲子

宣明方

治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱甚陽勝陰

衰邪氣上逆上實下虛怯弱不耐或表熱而身熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進退出入不已而為寒熱往來或表多則惡寒或裏多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪相助

并甚於裏畜熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱而痛者或熱結極甚陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏熱者或熱極閉塞不得宜通陽極似陰中外喜熱而反畏寒者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或一切風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭痛口乾鼻塞耳鳴及聾咽隘不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥澁小便溺淋闕或是皮膚搔痒手足麻痺又或筋脉拘急支體倦怠或渾身肌肉跳動心忪驚悸或口眼喎斜言語蹇澁或狂妄昏惑健忘失志及或腸胃燥熱悌鬱而餓不欲食或濕熱內餘而消穀善饑然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥

及妄食熱物過多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順飲食以服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功驗自可知矣

防風

當歸

白芍

柴胡

黃芩

人參

甘草

大黃

各一兩

滑石

六兩

右停每服三錢至五錢水一大盞生姜三片同煎至七分去滓溫服

○廣按此方用大黃瀉陽明之濕熱從大便出用滑石降三焦之妄火從小便出用黃芩以涼膈柴胡以解肌防風以清頭目用人參甘草以補氣當歸芍藥以補血瀉心肝之陽補脾腎之陰而無半味辛香燥熱之謬藥直治風熱燥熱濕熱挾虛之良劑非聖於醫

者其能如是也耶

濕熱病汗下後餘熱未退用此尤妙

○已上三方和解半表半裏熱之劑

大柴胡湯

方見傷寒

防風通聖散

方見中風

○已上二方發攻表裏熱之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

天承氣湯

並見傷寒

三一承氣湯

見濕熱

○已上四方攻下裏熱之劑

清心湯 卽京膈散料內加黃連五錢用蜜與竹葉同煎

連翹

山梔子

大黃

薄荷葉

黃芩

各五錢

甘草

一兩半

朴硝

二錢半

加黃連

半兩

右爲細末每服五錢水一鍾蜜少許竹葉十片同煎七分溫服

洗心散

和劑方

治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便

秘結小便赤澁

白朮

一兩半

麻黃

和節

當歸

去芦洗

荆芥穗

芍藥

甘草

大黃

麩裏煨去麩切片
各八錢

右爲末每服二錢水一鍾生薑薄荷少許同煎溫服

人參瀉肺湯

秘方

治肺經積熱上喘咳嗽胸脇脹滿痰多大便滯

澁

黃芩

梔子

枳殼

甘草

薄荷

連翹

杏仁

炒去皮

桑白皮

炒

大黃

桔梗

炒各等分

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食後通口服

三黃湯

和劑方

治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃連

去芦須

黃芩

去腐

大黃

煨各等分

右咬咀每服四錢水一鍾煎至七分空心服

三黃丸

和劑方

治男子煩人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便

赤澁大便秘結並宜服之

黃連

去芦須

黃芩

去土

大黃

煨各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九熱水吞下

一方用腦射為衣丸如大豆大夜間噙化一二丸亦好

舍化三黃丸 治症見前

大金花丸 宣明方

治中外諸熱癰汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳

衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花

丸又曰既濟解毒丸

黃連

黃栢

黃芩

大黃

各等分

自利去大黃加梔子

右為末滴水丸如小豆大每服二三十丸新汲水下

四生丸 宣明方

治一切熱痰常服潤肌膚諸熱症皆可服

大黃

牽牛

皂角

各二兩

朴硝

半兩

右為末滴水丸如梧子大每服三十丸食後白湯下

黃連解毒湯 宣明方

治陽寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥

極深蓄熱內甚

方見濕熱

黃連湯

聖惠方

治一切積熱血熱腹熱酒熱並用

黃連淨不拘多少井水浸之良久碗盛於鍋內煮取清汁之

○廣按書云寒因熱用熱因寒用何也蓋積熱用寒藥以治之固令用熱藥以治之恐相違逆如黃連用姜汁制酒制如附子用蜜制童便制是也此方既用一味黃連又用井水浸之不無太過乎以酒代之庶乎妙矣

神芩丸

宣明方

治三焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或生瘡癰咽膈

不利或腸胃結燥小便赤澀大便閉塞一切熱症並宜服之

大黃

生

黃芩

各二兩

牽牛

生

滑石

各四兩

黃連

薄荷

川芎

各半兩