

痢證滙叅卷之六

海虞吳道源本立纂輯

王式金聲谷評定

同里

劉文思庭輝叅訂

門人

龔錫勇天表

同校

王文瑞希范

產後痢總論

御纂金鑑云產後痢者名產子痢多因飲食不調食

食生冷。或起居不慎。衝寒冒暑所致。若腹中疝痛。後重裏急者。屬有餘之證。若日久虛寒滑脫者。屬不足之證。痢色焦黃稠粘。多屬於熱。清稀澄澈如鴨糞者。則屬於寒。治之之法。熱者清之。寒者溫之。冷熱不和者。調之。虛者補之。實者瀉之。虛實新久之間。宜細心詳參也。

熱者清之。宜槐連四物湯。卽四物加槐花黃連。以清熱而兼腸也。冷熱不和者。調之。用黃芩芍藥湯。

產後痢症
此一條當
細參

卽芩連歸芍木香肉桂甘草枳榔。痛加大黃。虛寒
滑脫。宜溫而固澀之。宜真人養臟湯。日久不止。氣
血大虛者。十全大補湯。外感風寒成痢者。宜敗毒
散。若因暑濕致痢。香連丸。若敗血滲入大腸而成
痢者。加阿膠地榆烏鰂骨。

郭嵇中濟陰綱目云。產後氣血大敗之候。腸胃怯弱。
寒熱易侵。若未滿月。飲冷當風。乘虛襲於育膜。散於
腹脇。或腹痛作陣錐刺之狀。則敗血流入大腸。水穀

不化。洞泄腸鳴。或下赤白。胠脇填滿。或痛不定。急服調中湯立愈。

陳無擇曰。產後痢疾。非止一證。當隨其因而調之。旣云飲冷當風。何所不至。寒熱風濕。本屬外因。而喜怒憂思。還從內性。況勞役飢飽。皆能致病。若其洞泄。可服調中湯。赤白滯下。非此不能愈。各隨門類治之。大全云。產後痢疾。由產勞傷臟府。日月未滿。虛之未復。或勞動太過。誤吞冷物。或行走太早。外感風冷。乘

虛入於脾胃致令洞泄。甚者變爲痢疾。若滲入大腸。卽成血痢。難治。若飲食不進。下痢無常。日夜無度。產後本虛。又加痢頻不止。益增其虛。倦怠瘦乏。謂之虛羸。下痢恐成蓐勞。又有產後氣不順。下痢白膿。謂之氣痢。法當調氣。

仲景謂一婦。產後七月。秋初滯下。腹痛脈微而軟。曰此氣虛不能運化精微。其痛窘迫後重。乃氣下陷也。以升陽散火湯。加減。繼以補中益氣湯。加砂仁數貼。

而安。又一臨產滯下。用以黑山梔爲末。每服五錢。空心滾水下。甚者二服卽安。凡痢脈弦數者重。微弱者爲欲自止。雖發熱不死。

治一婦產後五月。腹痛下痢。用薑汁以黃連一錢。白芍三錢。黃芩扁豆各二錢。蓮肉枳殼各三錢。陳皮葛根各一錢。炒紅麴二錢。炙甘草一錢。烏梅二枚。甫服一鍾。藥行至腹。卽一次。痛亦隨已。滯下而全安。

薛古蒙曰。產後氣血大傷。喜吞生冷。瀉痢齊作。鮮不

此條與郭
氏相表裏

危殆。治當溫補。勿拘拘以滲濕分利。反召虛虛之禍。也。審係傷食所致。則用四君子湯。察其所傷何物。分別而消導之。若見嘔吐。加藿香。若係虛寒。完穀不化。或去清水。手足厥冷。用調中湯。若瀉痢色黃。乃脾土真氣。宜加木香。肉果。若脾土虛寒。八味丸以補土母。若小便澀滯。四肢浮腫者。須補脾胃爲主。久不愈。腎氣虧損也。用四神八味之屬。經曰。痢而作渴者。但止其渴。痢自止矣。

妙訣

語語仔細
字字斟酌

鄭文康曰。產後痢疾。脈細小者生。洪大者死。凡產後痢。兩手脈絕細細尋之。微見附骨者。卽以無事斷之。蓋產後之脈沉細者。生。何況產後痢疾。脈尤當細也。痢見赤白。胃苓湯可以治之。此藥服之。亦可消導。切不可用芍藥湯推蕩。如惡露未盡。胃苓湯加桃仁。不發飽。加紅花。當歸。蓋山查。足以消積破瘀。恐其消尅太甚。但用神麴可也。若惡露已淨。胃苓湯加半夏。神麴足矣。

此法亦穩

赤水元珠云。下痢墮胎。腹滿少食。脈虛痢不止。手足厥冷。用酒炒白芍五錢。滑石三錢。焦白朮二錢。蒼朮三錢。乾薑二錢。茯苓二錢。訶子皮二錢。爲末。調下。保和丸。

明者所見
畧同

錦囊秘錄云。產後腹痛痢疾。由腸胃虛怯。寒邪易受。故腹痛。水穀不化。下痢赤白。急用調中湯立効。若非外感所傷。必是腎虛虧損。陽虛不能生土。陰虛不能閉藏耳。必用四神八味以補腎。倘誤用分利消導之。

亦不定屬
死症在用
藥中歟耳

藥是益虛其虛矣可不慎歟。

準繩曰。產後痢疾。死多活少。不甚者。尤可施治。若瀉
比於痢。則痢尤爲難。而瀉則易治。大抵瀉者。補脾土
爲主。而消食藥佐之。痢無外邪者。扶脾補腎。消積而
以補血藥佐之。如膠艾丸之類。蓋痢多下血。產後血
虧。蓋用補血之藥。如瀉不止。四神丸如氣虛下陷。補
中益氣湯。瀉痢止。更酌用四物湯之屬。

辨證錄云。產後下痢厥逆。躁不得眠。俱是死證。蓋下

舍此誠無
別法

痢亡陰厥逆亡陽也是難救。況躁不得眠。是血無以養心也。而厥更不止。則汗自出。又無已也。欲不死。可得乎。我欲於死中求生。舍人參當歸。再無別藥。名曰參歸湯。用人參一兩。當歸二兩。荆芥二錢。水煎服。當歸生氣血。而以生新血。則舊血去。而新血益生。自然有血以養心。則厥可定。而心可安。躁可釋也。

又一產後痢。加之呃逆。必死之證也。蓋下痢亡陰。產後尚非所宜。何況氣血大敗之候乎。今加呃逆。胃中

用外治法
更穩

有火遏抑拂亂而氣血更虛。勢必致胃氣之絕不死。何待。然而胃氣尚有一線未絕。即可救援。吾有一方。不必服藥。卽治噤口。法稍爲更易。將活田螺一枚。搗爛。入麝香一厘。吳萸一分。爲末。拌勻。掩在臍上。紮緊。則引火下行。呃逆立止。蓋產後下痢。氣血大虛。不可用驅濕散火藥。益虛其虛。故用此法。嘔逆止後。以當歸一兩。白芍三錢。甘草一錢。枳殼三分。檳榔一分。水煎服。醫通云。產後痢疾有三。一者因胎前患痢。產後

產後痢緣
由亦不外
此三項

不止。昔人謂七日必死之候也。若產後其婦壯實元氣未敗。脈有胃氣。能進食者。伏龍肝湯加減隨證治之多。有生者。二因產時。臍腹受冷。飲食不化而腹痛。或惡露不行。理中湯爲主。白者加吳萸木香。赤者加茯苓肉桂。三則產後或有誤吞生冷。或臨產飲食過飽。瀉痢齊作。亦宜理中湯。白者加枳實厚朴。赤者加山楂香附熬糖。加入人參肉桂。間有熱痢後重。白頭翁湯以甘草阿膠湯清理之。如惡露未淨。痢久不止。

腹痛後重。補中益氣湯升舉之。大抵產後下痢。惟顧慮元神調和氣血。則積滯自下。惡露自行。不然較妊娠更難照顧也。

孫文垣治程氏婦小產後。已二十日矣。忽患痢。一日十餘次。怯寒惡食。小腹痛。診之。右脈滑大。知其虛中有熱。想其惡露未淨。故小腹痛。有專泥丹溪產後大補氣血之語。槩施之。因而作痢。乃翁曰。病尚怯寒。何云有熱。余曰。惡寒非寒。明是熱證。由熱而似寒也。

服藥後當知之。以當歸爲君。滑石酒炒。芩連爲臣。木香桂皮。枳郎爲佐。酒炒白芍爲使。服之果去惡物甚多。黑臭難當。小腹頓寬。口乾小便不利。惡心不食。疲倦。仍裏急後重。以人參白朮川芎各一錢五分。酒炒黃連陳皮各六分。木香二分外。以清六丸服之。痢減十之八九。但大便不實。虛怯惡心仍在。以四君子湯加炒白芍陳皮木香肉果。酒炒黃連當歸。調養而安。李修之曰。婦人經行產後。誤食生冷。惡血不行。凝滯。

透徹語

於內侵腸間而成痢疾。純下紫惡血。脈見芤而細結。
促此瘀血痢也。法當去瘀生新。當歸桃仁丹參之類。
劉宗厚曰。產後痢疾年餘。形體骨立。內熱晡熱。自汗。
盜汗。口舌糜爛。日吐痰三椀許。脈洪大。重按全無。此
命門火衰。脾土虛寒。而外假熱也。痰者脾虛不能統。
攝歸源也。用八味丸補火。以生土。用補中益氣湯兼。
補肺而脾胃健。

滑伯仁曰。產婦誤吞雞子。腹中作痛。面色青黃。服平

胃二陳更下痢赤白腹脹服流氣飲子又見小腹一
塊不時上攻飲食愈減此脾腎虛寒肝木尅侮所致
以補中益氣湯加木香吳萸服之漸愈又用八珍大
補兼服調氣藥而愈

薛古蒙曰產後痢疾若渴而不喜冷飲屬胃氣虛不
能生津液宜用七味白朮散若夜發熱口渴屬水弱
而不潤宜六味丸作湯服之佐以益氣湯以滋化源
本事方云治產後痢疾諸藥不効一日五十行用杉