

思濟堂方書

四



思濟堂方書卷之四



宛平賈邦秀升安氏校著

遼海姜國璜信侯氏全訂

小兒

辨治方藥大畧

予論小兒之病最爲難治凡驚疳吐瀉腹痛發
熱痘疹痧麻等證關係安危性命緊要蓋小兒
之病古名啞科以其口不能言舌不能辨痛苦
不自知盡委於醫醫者謹慎小心尙恐難痊所
有粗滑之醫額脉一十三關一看卽欲判死



物重濁

人多高喊熱狂

盛聲急驚風得無

淚必腹痛有淚驚

生者予則未敢然耶僕自幼齡究心先聖至理
詳審諸哲淵微稍獲糟粕因以陳綱提領不但
後人用之真切應手而且人目了然匪敢遽以
爲慈幼之一助聊以誌予苦衷而已至於真知
確論不離望聞問切數者之間望者望其氣色
青色驚風紅赤邪熱黃者食積白者疳蟲黑者
不治第二聽其聲音清濁大小哭聲有淚無淚
第三問其起居飲食寒熱二便利結晝夜輕重
第四診其脉息平其浮沉遲數滑濇大緩有力

風合咽啞哭不响

妙藥難起疴喜冷

定知心內熱好溫

乃屬厥中寒二便

閉結邪熱盛滑利

不食脾弱難病發

於晝陽氣疾夜作

還須陰受煎不拘

男婦大小必究明

無力然後按其額脉看其三關紋色再看口舌
有瘡無瘡有胎無胎聞其臭與不臭摸其兩腮
腫與不腫按其肚腹或熱或溫痛與不痛有塊
無塊觀其顙門或凸或凹按其手足或寒或熱
口瘡者脾熱舌瘡者心火舌胎乾燥者滯熱滑
利者虛熱口臭者食積腮腫者肝經毒火或爲
瘟毒腹有塊者積聚腹中痛者有寒有熱有食
有蟲顙凸者欲動驚風顙凹者元氣下陷手心
熱者心中熱手心寒者腹中寒上熱下冷者傷

其綱領方好用藥

調治綱領者何八

要是也八要者何

表裏臟腑寒熱虛

實是也表裏分得

清臟腑辨得明寒

熱審得實虛實看

得透凡病之來無

所逃遁又何須分

驚風

其食積通身俱熱者卽是傷寒隨其病因處其方藥四圍剔透八面玲瓏表裏臟腑寒熱虛實如此分清無有不通病有不愈疾有不瘳者未之有也

當辨急慢用藥不同

立齋薛氏曰驚風名目甚多總不離陰陽二證而已陽證者卽是急驚風陰證者卽是慢驚風治急驚者宜清熱化痰開竅通關之劑治之慢

大方脉小兒科爲

二乎此所謂道之

根源也歟

驚者無風可逐無驚可療急宜補脾溫中之藥

多服漸愈急驚易治慢驚難醫謹將二證詳細

開列於後以便觀覽焉

急驚風

古謂之陽癇風

婁氏曰抽之有力者爲急驚風無力者爲慢驚

風急驚之候身熱面赤角弓反張搐搦上視牙

關緊硬口鼻中氣熱痰涎壅盛忽然而發抽過

容色如舊有偶因驚嚇而發者有不因驚嚇而



發者然多是身先有熱而後發驚搐未有身涼而發者也此陽證也蓋熱盛生痰痰盛生驚生風宜用清熱鎮驚湯之類以除其熱而豁其痰驚風自除矣切不可用辛燥驅風等藥反助心火而爲害矣亦不可艾火灸之燈火燒之此陽證大不宜於火攻曾見有用火攻而壞事者多矣戒之戒之此證雖急若從容調治服清涼之劑自可平安如妄用巴豆輕粉之類取禍最速古諺曰急驚風慢慢醫斯言最當



清熱鎮驚湯

治急驚風熱盛痰盛者效

連翹

去心蒂

柴胡

地骨皮

胆草

釣藤勾

山梔仁

川黃連

酒炒研

黃芩

麥冬

去心

赤苓

木通

車前子

陳枳實

各五分

甘草

薄荷葉

各三分

京南滑石

一錢飛淨

五歲以上者加倍用之



引加清竹葉二十片燈心三分水煎溫服

涼膈散

治熱痰生風大便燥結者用

黃芩

連翹

山梔仁

枳實

前胡

川大黃

各五分
洗入分酒

薄荷葉

甘草

各三分

水煎溫服微利一二次痰熱自退若已通利則不必盡劑五歲以上者加倍用之

宣風散

黑牽牛

四兩半生半炒取頭末二錢半

陳皮

去白

正栳榔

各五錢

甘草

二錢半

共為細末一歲以下服五分二歲以上服七分

紅蜜水調下微利一二次為妙

如抽風而牙關緊閉者以擦牙散擦開方好用

藥

擦牙散

半夏

甘草

全蝎

疆蠶

各一錢

蜈蚣

一條

麝香

五分



共爲末臨用時以鹽梅一個取肉合藥爲丸用

手重擦遍牙上口卽開

全融

如抽風人事不省急難得藥先以吹鼻散開閉

然後用藥

吹鼻散

風而平開閉者以熱干煙氣開衣後用

牙皂

一錢

細辛

一錢

麝香

一分

共爲末密收每用些須吹鼻有嚏可治無嚏再

吹三次無嚏者不治

如牙關緊不卽開用猪牙皂角明礬各八分爲



半
細末滾水調勻晾溫從鼻灌入

慢驚風

古謂之陰癇風

慢驚之證多因吐瀉而得或因久病或久瘧痢而得之身冷面色或黃或白不甚搐搦目微微上視口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛筋脉拘攣俗謂之天弔風蓋由脾土虛極中氣不足故寒痰壅盛而風動筋急也此陰證也宜急用溫中補脾湯補脾多服則風痰自退矣



思濟堂方書 卷之四
溫中補脾湯

人參

陳皮

製半夏

官桂

各五分

天白苓

黃芪

炙

白朮

土炒

揀芍

各一錢

縮砂

八分 去皮

干薑

炒

白蔻

去皮研

炙草

各五分

引加煨薑五分紅棗肉二枚黃土水煎服

五歲以上者加倍用之

虛寒甚者加熟附五分

牛黃紫金丹

又名化風丹



此方治胎驚臍風噤口天弔內釣諸風凡半陰

半陽者累皆效驗

人參

白朮

土炒

白苓

茯神

山藥

硃砂

青礞石

赤石脂

醋煨

三釣藤勾

各一錢

殭蠶

五靈脂

飛淨

麝香

牛黃

各五分

薄荷葉

八分

共爲細末端午日糯米飯搗丸五分重金箔爲

衣每服一丸淡薑湯化下

配合此藥須秉虔誠

驚風不治證

凡急驚風大叫兩三聲者是心絕不治頭項四肢俱軟者是脾絕不治口中出血或下血者是肝絕不治遺尿尿者是腎絕不治自汗喘滿者是肺絕不治風闌黑紋條直者死噴藥不下通關不噴手撒不拳者俱不可治
慢驚風口眼手足一邊牽引者不治頭重項軟四肢厥冷大小便不禁髮直搖頭目無瞳人顫

腫者皆不可治

凡治驚風當以別其真假爲治真者內生驚癇
假者外傷風冷而得真搐者手足冷有汗搐眉
搐肚日夜不止不治不得已而用人參川烏全
蝎等藥救之假搐者口中氣出熱呵欠手足動
者宜發散清熱藥治之雖頻發不死

凡噤口風口不開者用南星去皮臍研爲細末
加冰片少許用手指蘸生薑汁同藥末於大牙
根上擦之立開



元珍丹

此方專治肺胃不清痰盛火炎以致驚風

天竺黃

四錢

九轉胆星

釣藤勾

白直殭蠶

薄荷葉

橘紅

硃砂

龍胆草

赤苓

各三錢

遠志肉

甘草

各二錢

川貝母

四錢去心

共爲極細末煉蜜爲丸黃豆大每服一九燈心湯送下

