

目錄

小兒初生集要十則

馬蘭膏 一

六一散 二

黃散 三
附方三

治撮口方 四

預治小兒臍風馬牙經驗方 五

紫蘆散 六

解毒丸 七

胎癩 八

胎毒害眼 九

鈎藤飲 十

當歸散 十一

托裏益氣湯 三十

三 地益陰煎 三一

參朮和脾飲 三二

救逆痘良法 三三

痘瘡黑陷 三四

痘爛生蛆 三五

五福化毒丹 三六

痘疔散 三七

痘疹入目 三八

痘後目翳 三九

痘風眼癬 四十

痘後耳內腥臭作膿 四一

痘後癰毒 四二

風熱雙和飲 四三

化虫散 四四
附方二

疳膨食積仙方 四五

治猴獼疳方 四六

燈花散 十二

止汗散 十三

嬰兒胎疳方 十四
附方一

惺惺散 十五

異功散 十六

七味安神丸 十七

急慢驚風 十八

千金散 十九

急救回春散 二十

保嬰丹 二十一

稀痘仙方 二十二

胡荽酒 二十三

養血化斑湯 二十四

四味消毒飲 二十五

十二味異功散 二十六

保嬰濟痘神丹 二十七

帶火乾收蒸法 二十八

口脉未周。賴母乳哺之。而其膚革未充。精
氣恒易招客忤。究其根原。有未離母胎而已受
病者。有既脫母腹。而旋致病者。有變蒸非病。而調護
失宜。輾轉而成病者。加以痘疹關煞。種種皆病之所
叢生。心誠求之。不中不遠。今自初生。以及孩提。少長。
內外主客。各採數方。雖未盡保嬰之法。而按症投之。
可無橫夭。是一慈幼之一端也。輯兒科。

五方集
猴疳方

四七

化毒丹

四八

乳母煎藥方

四九

生熟地黃湯

五十

羊肝散

五一

小兒語遲

五二

小兒頭上黃水瘡及禿癩神效方

五三
附方一

爛瘡成孔

五四

小兒軟癰

五五

疳瘡方

五六

馬鳴散

五七
附方二

益陰養榮膏

五八

小兒健脾丸方

五九

寸錄變蒸考

凡且能助養脾氣。消化乳食。月內以猪乳哺兒。
凡痘毒驚癇。且無撮口。臍風之患。

凡不尿。乃胎熱也。取大蔥白。切四片。取乳汁半
斤時。分作四服。卽通。不飲乳者。服之。飲乳若臍
旁有青黑色。及撮口者。不治。

一初生小兒。大小便不通。以致腹脹欲死。急令人以開水
漱口。吸咂兒前後心。並手足心。臍下七處。凡五七次。以
皮紅赤色爲度。須臾卽通。

一小兒生下。徧身無皮。用白米粉乾撲之。候皮生。乃止。

小兒初生集要十則

一小兒初生。先濃煎黃連甘草湯。用軟絹或絲綿包指蘸藥。摳出口中惡血氣。或不及。卽以藥湯灌之。待吐出惡沫。然後與乳。能令出痘稀少。

小兒生下。不出聲者。急看上腭有泡。卽用銀簪挑破。絲勿令入喉。可活。

臍以棉衣包兒。用火紙撚燒臍。待兒氣轉。

前用淡豆豉濃煎與服。可下胎毒。最妙。乳

一小兒忽然驚搐。當令平臥於牀席之上。任其牽動。不可抱緊。蓋風與痰相激而逆行筋絡間。皆有痰流注。定後則仍歸於脾胃中。若一緊抱。便凝結不散。醒後多成廢人。戒之戒之。

馬蘭膏

一

治小兒兩足紅赤。游風流火。如足至小腹。手至胸膛。多致不救。急用此方救之。百不失一。并治大人兩腿赤腫。流火。或濕熱伏於經絡。皮上不紅不腫。其痛異常。病者只叫腿熱。他人按之極冷。此謂伏氣之病。急用此膏搽之立愈。

馬蘭頭

不拘多少。冬季無葉。取根亦可。

右用水洗去泥。搗爛絞汁。以雞毛蘸汁搽之。乾則再

古方彙編 卷之四
一。小兒週歲之內。謂之芽兒。切忌頻浴。以致濕熱之氣鬱聚不散。身生赤遊丹毒。如胭脂塗染。腫而壯熱。毒一入腹。則肚脹哽氣。以致殺兒。更有洗後包裹失護。風邪所傷。身生白流。腫而壯熱。增寒鼻塞。腦悶痰喘。咳逆。故兒忌多浴。

兒時須四圍遮好。謹避風寒。又須掩好肚臍。勿令潮濕。否則風邪入臍。流毒心脾。能致撮口臍風等症。倘中有濕。將大紅羊絨燒灰。糝上札好。或用馬齒莧燒

合口瘡並效。

甘草節四分。煎湯和蜜調下。

一方治胎毒濕爛。用薔薇花梗連皮去葉炙研細末茶油調敷。

一方治小兒月內痲瘡滿頭及渾身脫皮者。用多年尿缸內紅色磚焙乾爲末。或香油。或麻油俱可調搽。

一方治小兒丹毒。用馬齒莧或藍澱搗敷之。

治撮口方四

穿山甲

用尾上甲三片
羊油炙黃色

蝎

梢

七個

共爲細末。人乳調塗乳上。令兒吮之。用厚衣包裹。汗

換如頸項腿肋縫中潰爛。以此汁調飛淨六一散搽之。即愈。

六一散方二

滑石

五錢

硃砂

砂

六分

甘草

一錢

研末和勻。

金黃散

三

治小兒胎毒。赤游丹毒。用生黃蜜調敷。

川黃連

藍石

寒水石

黃柏

芙蓉葉

各五錢

景天

天

鬱金

金

各一錢五分

大黃

黃

一兩

各取淨末。研細和勻。外敷內服皆可。內服。每服五錢。

珍珠一錢五分。西黃一錢。其效更捷。

輕白蘆甘石

火煨一兩黃連汁內淬三次童便內淬四次

大冰頭 五分

紫甘蔗皮

燒存性取淨末

粉口兒茶

赤石脂

各五錢煨

真象豆粉

要炒燥

厚川黃柏

各七錢以猪胆汁塗炙七次

右共爲細末。用麻油入雞子黃煎黑。去黃候冷調搽。

卽愈。假如麻油二兩入雞子黃一枚內服解毒丸方

開後。

解毒丸

七

西牛黃

三分

乳香

燈草炒

沒

藥

燈草炒各五分

山茨菇

一錢

出即愈

預治小兒臍風馬牙經驗方 五

枯礬 礪

砂 各二錢五分

冰片

麝香 各五厘

硃砂 二分

共為末。凡小兒生下。洗浴過。用此藥糝臍上。每日換尿布時。仍糝此末。糝完一料。永無臍風等症。

紫蘆散 六

治小兒竹衣胎癰。凡無皮膿血淋漓。及胎中遺毒。赤剝楊梅等瘡。並治婦女為丈夫梅毒瘡所過。結毒之氣。漸至陰戶濕爛。流血不止。沿至產門。外繞肛門。腫硬潰膿。出水不休。疼痛不堪。將此藥搽之。每一小便。勢必衝去。須要勤搽。漸漸自愈。亟念口申。

胎毒害眼 九

凡新產小兒。兩目紅赤。澁閉腫爛不開。以蚰蟻泥搗塗顙門。乾則再換。不過三次。卽愈。或以生南星。生大黃等分爲末。用醋調塗兩足心亦愈。

鉤藤飲 十 治小兒臟寒夜啼。陰極發燥。

鉤藤勾

茯神

茯苓

當歸

川芎

各二錢

木香

煨四分

甘草

五分

姜一片。棗二枚。水煎服。若心經有熱。臉紅便赤。去木

香加硃砂 一分
木通 五分
赤芍 一錢

硃砂

雄黃

各七分

麝香

一分取當門子佳

右共研勻。煉蜜爲丸。每丸約重三分。每日以金銀花煎湯調服一丸。如欲稀痘。候瘡好後。每逢節氣日。調服一二丸。出痘必稀。

凡治胎毒。須過週歲之外。方可搽此藥。週歲之內。神氣未足。適遇變病。反歸咎也。

胎癩

八

先用猪胆煎湯浴淨。再用宮粉水調塗於碗內。晒乾。

用艾薰至老黃色。取下爲末。絹袋撲之。絕妙。

嬰兒胎疳方十四

凡小兒初生發疳。止見啼哭。不見病形。延至一週兩歲。始知是疳。諸醫不效。用麻櫪樹上之鴛鴦菓一對。其菓連樹枝取下。可辨真假。一對菓可治三人。荔枝核七枚。平地木卽多年老樹椿根也。同煎飲。卽瘥。亦不再發。

一方於午日午時。以脚盆盛熱水。安於中堂。隨抱小兒。將卵放水內一浸。再將小兒在於中門檻上中間。一擱。其卵上之水。印痕於檻。將艾圓。在檻上濕印處。灸三壯。其卵遂漸收小如故。