

傷寒心悟

下集



權量考正

凡古方權量。皆起于律。黃帝律九寸。夏尺則加為一寸。而為十寸。今木工之曲尺是也。以曲尺之寸度作方。徑一寸六分。上下相等。深七分八厘強。其積二千分。即古藥升之容積。古方自靈素至千金。外臺所集。漢晉東齊諸名方。凡云一兩者。以今之七分六厘準之。凡云一升者。以今之六勺七抄準之。知二百四十黍為一兩者。千金云。十黍為一銖。



六銖為一分。四分為一兩。十六兩為一斤。此則神農之秤也。方寸匕者。作匕正方一寸。依曲尺之寸度為之。錢匕者。以五銖錢為之。五銖錢徑曲尺九分。古人用散藥。以刀圭抄取之。匕亦刀圭之意。一撮者。四刀圭也。撮以三指為度。得一百廿八黍。準今四分。方寸匕。十刀圭也。立方算法。滿千分為一寸。藥升之容積二千分。以今倉斛之積寸推之。合曲尺之寸度。積一千四百九十七寸。為今五斗。則

知曲尺二寸。為六勺七抄。千金論蜜。一斤得藥升
七合。水與同積。^蜜異重之比例。若二十與廿九。而次
第以準測之。古一兩。今七分六厘也。五銖錢。徑曲
尺九分。以方寸匕推之。一方寸匕。準今一錢。一錢
匕。準今五分六厘。若云半錢匕者。則是一錢抄取
錢邊之半。準今二分八厘。錢五匕者。則是一錢抄
取錢邊之一五字。準今一分四厘也。而藥性輕重
不等。今但就黍計之。以得其大概。古十六兩。今重



一兩二錢一分八厘。古一兩。今重七分六厘。以古
方參之。麻黃湯。麻黃三兩。準今二錢三分。一劑為
三服。中病即止。每服止七分六厘。小柴胡湯。柴胡
八兩。準今六錢。分三服。每服止二錢。大承氣。大黃
四兩。準今三錢。分再服。中病即止。每服止一錢半。
白虎湯。石膏一斤。準今一兩二錢。分三服。每服止
四錢。五苓。四逆散。等方。每服方寸匕。準今一錢。大
陷胸湯。甘遂一錢匕。準今五分六厘。分二服。每服

止二分八厘。仲景書是古方權量。宋林億以古三兩為今一兩。古三升為今一升。或以一斗為今二升。一兩為今二錢。此誤以秦漢之權量為憑耳。子古方不相涉也。藥秤藥升。農軒敍造之法物。晉宋以來。寢失古意。故梁陶貞白先生著名醫別錄論用藥分劑法。則一遵神農之秤。而不用子穀秬黍之制。孫真人祖述其意。定千金方。首言今依四分為一兩為定。亦不依隨人以三兩為一兩之法。夫



聖人之治病也。觀乎陰陽樞機之順逆。即升降出入之氣是也。順者生。逆者死。但得撥之使轉。無所事矣。故藥也者。求其中竅。不貴多也。求其循序。不貴速也。藥必有毒。非毒無以馭病。非節制無以馭毒。故升稱之以小為度者。誠慎之也。



傷寒一百一十三方下集論

雲間楓理楊福增三辰編

傷寒



桂枝湯 一

陽旦湯金匱無藥味或謂即桂枝湯活人書加黃芩名陽旦湯

桂枝 三兩 去皮

芍藥 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

擘

右五味 㕮咀

不用刀片而用㕮咀可見是方之古 以水七升 微火煮

取三升 去滓

得服

適寒溫 服一升 服已須臾 歠

熱稀粥一升餘 以助藥力 溫覆令一時許 溫身 遍

身熱 熱似有汗者 益佳

汗熱熱小不可如水流漓病

必不除 若一服汗出病瘥 瘥愈停後服 不必盡劑



北京中醫藥大學圖書館版權所有

一劑若不汗更服依前法獸熱又不汗後服小

三服促其間二叩一口半日許令三服盡若病重者一日

夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若

汗不出乃服至二三劑大旨一服盡若汗出不得進桂枝

證仍在者不可疑惑易方不禁生冷粘滑肉麵五

妨服二三劑得微汗為度桂枝湯能通五

辛酒酪及臭惡等物桂枝湯能通五

桂枝加葛根湯二

桂枝湯原方加葛根四兩



右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫內諸

藥者取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須

粥。西須有。可。銀碗。難。胃。受。本。義。手。者。

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝湯原方加厚朴皮二兩去

杏仁五十枚去皮

右七味以水七升微火煮取三升去滓溫服一升

覆取微似汗厚朴皮去其皮上之粗皮炙

杏仁去皮興取利肺降氣甘草炙用和中人解表可用



桂枝加附子湯四

桂枝湯原方加附子一枚泡去皮破八片

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升

桂枝加芍藥湯五

桂枝湯原方加芍藥三兩

右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯六

桂枝湯原方加大黃一兩酒浸芍藥三兩



右六味以水七升煮取三升。由滓溫服一升日三服。

桂枝加芍藥生薑人參新加湯 七

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩

右六味以水一斗二升煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服。再煮取其味。勿取其味再煮。厚和元達邪。可再煮。

小建中湯 八

本方加黃芪。名黃芪建中湯。主虛勞裏急諸不足。見金匱。

桂枝原方加膠飴一升



封... 卷一

右六味以水七升先煮五時取三升去滓內飴更

上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中

湯以甜故也大建中湯蜀椒乾薑人參飲糖主心胸大寒

按桂枝湯辛甘化陽酸甘化陰調營衛祛邪風即

所以止汗歠熱稀粥充胃氣助藥力即所以發汗

故曰有汗能止無汗能發加葛根者振陽明之氣而助

太陽發熱加杏撲者解表而定喘加附子者和營

衛而止漏汗加芍藥者和下傷之脾陰加大黃者



南京中医药大学图书馆藏

解陽明府實。加薑。芍人參者。扶正祛邪。加飴糖者。

中虛感寒。由此觀之。桂枝湯為傷寒羣方之冠。表

裏統治之劑。安內攘外方也。

病有變。方有化。如法用之。無不效也。

難病。而方有化。如法用之。無不效也。

炙甘草湯

又名復脈湯

甘草 四兩

人參 二兩

麥門冬 一斤

生地黃 一斤

阿膠 二兩

麻仁 半斤

桂枝 去皮 三兩

生薑 三兩

大棗 三十枚

擘

此方治心氣虛弱。胸中痞滿。氣短。汗多。小便不利。四肢無力。飲食不進。此方治之。無不效也。

此方治心氣虛弱。胸中痞滿。氣短。汗多。小便不利。四肢無力。飲食不進。此方治之。無不效也。

右大味以清酒七升宣行水八升先煮八味取三升去滓由膠烱消盡溫服一升日三服
有陽中復脈湯中桂枝湯中

本論炙甘草湯主傷寒脈結代心悸金匱主虛勞不足汗出而悶誠補劑之主方也
心動金匱主虛勞不足汗出而悶誠補劑之主方也

當為復脈湯并乃心之液汗出多令人悶汗為虛汗
 閉為虛悶故亦用此湯每服體感寒熱無汗脈弱
 者欲增液以作汗本湯主之若血液素虧不大便五六
 脈濇者欲增液以通大便亦本湯主之是故方不在



虞本方去桂枝加石膏名麻杏石甘湯主身
 無大熱汗出而喘方義彙方不教貝

石甘湯

大青龍湯二十

大青龍湯二十

麻黃 六兩 去節

桂枝 二兩 去皮

甘草 二兩 炙

杏仁 四十枚 去皮尖

石膏 大塊

石膏 大塊 碎如雞子

生薑 三兩 切

大棗 十二枚 擘

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者

