

重修
植物名實圖考

小野職慤重修
蔓草類

廿二下

葛



葛



葛本經、中品、今之織絲給者、有種生野生二種、救荒本草、花可煤食、根可爲粉、其蕈爲葛花菜、贛南以根爲果、曰葛瓜、宴客必設之、爾雅翼以爲食葛名雞齊、非爲絲給者、蓋園圃所種、非野生有毛者耳、周詩詠葛覃、周官列掌葛、今則嶺南重之、吳越亦尠、無論燕豫、江西湖廣、皆產葛、凡採葛、夏月葛成、嫩而短者、留之一丈上下者、連根取、謂之頭葛、如太長、看近根有白點者、不堪用、無白點者、可截七八尺、謂之二葛、凡練葛、採後、卽挽成網緊、火煮爛熟、指甲剝看麻白、不粘青、卽剝下、就流水捶洗淨、風乾、露一宿、尤白、安陰處、忌日色、紡以織、凡洗葛衣、清水揉梅葉洗湔、夏不脆、或用梅樹、搗碎泡湯、入瓷盆內洗之、忌用木器、則黑、然嶺北女工、多事苧、南昌、惟西山葛著稱、贛州、則信豐、會昌、安遠諸處、皆治葛、有家園種植者、亦有野生者、而葛布多雜蕉絲、乍看鮮亮悅目、入水變色、質亦脆薄、用純葛絲、則韌而耐久、沾汗不污、會昌之精者、縷續更艱、葛一斤、擇絲

十兩、績之半年、始成一端、會昌安遠、有以湖絲配入者、謂之絲葛、湖南、舊時、潭州永州皆貢葛、今惟永州有上供葛、葛生祁陽之白鶴觀、太白嶺、諸高峰、芒種時採、煮以灰而濯之、而曝之白、而擘爲絲、紡以爲布、如方目紗、製爲衫、不可浣、污則灑以水、垢逐水溜、無痕也、興寧縣亦蒔之、里老云、葛有二種、遍體皆細毛者、可績布、曰毛葛、遍體無毛者、曰青葛、不可績、惟以爲束縛、則又毛葛所不逮、又毛葛亦有二種、蔓延於草上者、多枝節而易斷、成布不耐久、惟緣地而生者、有葉無枝、成布較勝於苧、廣西葛、以賓州貴縣者佳、鬱林葛尤珍、明內監教之、織爲龍鳳文也、粵之葛、以增城女葛爲上、然不鬻於市、彼中女子、終歲乃成一疋、以衣其夫而已、其重三四兩者、未字少女、乃能織、已字則不能、故名女兒葛、所謂北有姑絳、南有女葛也、其葛產竹絲溪、百花林二處者、良采必以女、一女之力、日采、祇得數兩、絲縷以緘、不以手、細入毫芒、視若無有、卷其一端、可以出入筆管、以銀條紗襯之、霏微蕩漾、有如蝴蝶之翼、然日曬則縹、水浸則蹙縮、其

微弱不可恒服、惟雷葛之精者、細滑而堅、色若象牙、名錦囊葛、裁以爲袍直裰、稱大雅矣、故今雷葛、盛行天下、雷人善織葛、其葛產高涼礪洲、而織於雷、爲絲爲絨者、分村而居、地出葛種不同、故女手良與楷、功異焉、其出博羅者、曰善政葛、出潮陽者、曰鳳葛、以絲爲緝、亦名黃絲布、出瓊山、澄邁、臨高、樂會、輕而細、名美人葛、出陽春者、曰春葛、然皆不及廣之龍江葛、堅而有肉、耐風日也、詩正義云、葛者婦人之所有事、雷州以之、增城亦然、其治葛無分精粗、女子皆以鍼絲之、乾燃成縷、不以水績、恐其有痕迹也、織工皆東莞人、與尋常織苧麻者不同、織葛者、名爲細工、織成、弱如蟬翅、重僅數銖、皆純葛無絲、其以蠶絲緝之者、浣之、則葛自葛、絲自絲、兩者不相聯屬、純葛則否、葛產綏福都山中、采者日得觔、城中人買而績之、分上中下三等爲布、陽春亦然、其細葛不減增城、亦以紡緝精而葛真云、

雲冀農曰、葛者上古之衣也、質重不易輕、吳蠶盛而重者賤矣、質輕不易柔、木

棉興而葛者賤矣、質黃不易白、苧麻繁而黃者賤矣、乃治葛者、與絲爭輕、與棉爭軟、與苧爭潔、一疋之功、十倍於絲與棉與苧、其直則倍於絲、而五倍棉與苧、於是治葛者、能事畢而技盡矣、而受治者、力亦盡矣、褐之壽以世、帛之壽以歲、麻之壽以月、今是葛也、日之焦、風之脆、浣之懈、藏之折、其壽幾何、聖人盡物之性、而不盡物之力、因其重與葛與黃、而葛之壽、於是次於褐、均於帛、逾於麻、
〔長編〕本草經、葛根、味甘平、主消渴、身大熱、嘔吐、諸痺、起陰氣、解諸毒、葛穀主下痢、十歲已上、一名雞齊根、

別錄、葛根、無毒、療傷寒、中風、頭痛、解肌發表、出汗、開腠理、療金瘡、止痛、脅風痛、生根汁、大寒、療消渴、傷寒壯熱、葉主金瘡、止血、花主消酒、一名鹿藿、一名黃斤、生汝山川谷、五月採根曝乾、陶隱居云、即今之葛根、人皆蒸食之、當取入土深大者、破而日乾之、生者、搗取汁飲之、解溫病、發熱、其花并小豆花、乾末、服方寸匕、飲酒不知醉、南康廬陵間最勝、多肉而少筋、甘美、但爲藥用之、不及此間爾、

五月五日、日中時取葛根、爲屑、療金瘡、斷血、爲要藥、亦療瘻及瘡、至良、

唐本草註、葛根、即是實爾、葛雖除毒、其根入土、五六寸已上、名葛脰、服之、令人吐、以有微毒也、蔓燒爲灰水服方寸匕、主喉癰、圖經、葛根生汝山川谷、今處處有之、江浙尤多、春生苗、引藤蔓、長一二丈、紫色、葉頗似楸葉而青、七月、著花、似豌豆花、不結實、根形如手臂、紫黑色、五月五日、午時採根、曝乾、以入土深者爲佳、今人多以作粉、食之、甚益人、下品有葛粉條、即謂此也、古方、多用根、張仲景治傷寒、有葛根、及加半夏葛根、黃芩、黃連湯、以其主大熱、解肌、開腠理故也、葛洪、治腎腰痛、取生根嚼之、嚥其汁、多益佳、葉主金刃瘡、山行傷刺血出、卒不可得藥、但接葉傅之、甚效、貞元廣利方、金瘡中風瘻欲死者、取生根四大兩切、以水三升煮、取一升、去滓、分溫四服、口噤者、灌下、卽差、

本草衍義、葛根、澧鼎之間、冬月取生葛、以水中揉出粉、澄成粢、先煎湯使沸、後劈成塊、下湯中、良久、色如膠、其體甚韌、以蜜湯中、拌食之、擦少生蠶、尤佳、大治

中熱、酒渴疾、多食行小便、亦能使人利、病酒、及渴者、得之甚良、彼之人、又切入茶中、煮以待賓、但甘而無益、又將生葛根、煮熟作果賣、虔吉州、南安軍、亦如此賣、嘉祐本草、葛粉、味甘寒、無毒、主壓丹石、去煩熱、利大小便、止渴、小兒熱痞、以葛根浸、搗汁飲之、良、臣禹錫等謹按、中品上卷、葛根條、功用與此相通、

嶺南雜記、葛根、大如臂、有如瓜者、剖而食之、甘如梨、白如蘿蔔、可以爲粉、

南越筆記、高州多種葛、雷州人、市之爲繩紓、秋霜時、有葛花菜、卽葛乳涌生地上、如芝如菌、色赤、味甘脆、微苦、其性涼、乃葛之精華也、亦曰葛蕈、

救荒本草、葛根、今處處有之、苗引藤蔓、長二三丈、莖淡紫色、葉頗似楸葉而小、色青、開花似豌豆花、粉紫色、結實、如皂莢而小、根形如手臂、掘取根入土深者、水浸洗淨、蒸食之、或以水中揉出粉、澄濾成塊、蒸煮皆可食、及採花晒乾、燂食亦可、

按、寧都州、凡宴客將徹、必以嫩葛根一盤解醒、勸客殷勤、多不遽出、必俟頻

催而後獻故作事濡滯者人每譏之曰如出蔓長寧曰葛瓜以釘盤滇南斧切作片粥於市以止渴

爾雅翼雞齊一名鹿藿一名黃斤今之食葛非爲繩給者也其生延蔓甚者其蔓首至根可二十步人皆掘食之生食甘脆亦可蒸食有粉今江南人凶歲則掘取以禦凶荒大抵南康廬陵者最勝多肉而少筋甘美其花藤皆可醒酒而去酒毒服方寸匕飲酒不知醉博物志曰野葛食之殺人家種之三年不收後旋生亦不可食吳都賦食葛香茅注云食葛蔓生與山葛同根特大美於芋也又曰葛繩給草也國風曰葛之覃兮施于中谷惟葉莫莫是刈是濩又曰葛生蒙楚蔽蔓于野旄邱之葛兮何誕之節兮葛生山澤間其蔓延盛者牽其首以至根可二十步釋邱云前高後下曰旄邱旄邱之葛其節誕闊此言雖同根一體然相去差遠其緩急不相應也故曰叔兮伯兮何多日也黎之望於衛亦如此矣吳都賦蕉葛升越弱於羅紝禹貢卉服注云草服葛越葛花藤皆可醒酒

去酒毒、

越絕書、葛山者、勾踐種葛、使越女織治葛布、獻於吳王夫差、去縣七里、周書、李遷哲傳、太祖令與田宏同討信州、及田宏旋軍、太祖令遷哲留鎮白帝、更配兵千人、馬三百匹、信州先無倉儲、軍糧匱乏、遷哲乃收葛根、造粉、兼米以給之、遷哲亦自取供食、時有異膳、卽分賜兵士、有疾患者、又親加醫藥、以此軍中感之、人思效命、

雒南縣志、物產、葛可爲布、諸山之產最多、民止知秣畜絞索、供爨具耳、洪令其道、始教之爲布、實非難成、後王令象艮亦教之、終怠廢不率、誠可重歎、說文解字注、葛繩給艸也、周南、葛之覃兮、爲繩爲給、从艸曷聲、古達切、十五部、蔓葛屬也、此專謂葛屬、則知滋蔓字、古祇作曼、正如蔓延字、多作蕘、从艸曼聲、無販切、十四部、莫葛屬也、白華、南山經、其名曰白蒼、廣雅曰、莫蘇白蒼也、按未知卽此物與否、从艸皋聲、古勞切、古音在三部、蒼音同、

通草



通草 今木通

通草、本經、中品、舊說皆云、燕覆子藤、中空、一枝五葉、子如小木瓜、食之甘美、今江湘所用、皆非結實者、滇本草、以爲野葡萄藤、此藥習用、而異物非一種、蓋以藤蔓中空、皆主通利關竅、故有效也、

〔長編〕本草經、通草、味辛平、去惡蟲、除脾胃寒熱、通利九竅、血脈關節、令人不忘、
一名附支、

別錄、甘無毒、療脾疽、常欲眠、心煩、噦出音聲、療耳聾、散癰腫、諸結不消、及金瘡、
惡瘡、鼠瘻、踒折、鼈鼻、息肉、墮胎、去三蟲、一名丁翁、生石城山谷、及山陽、正月採
枝陰乾、陶隱居云、今出近道、繞樹藤生、汁白、莖有細孔、兩頭皆通、含一頭吹之、
則氣出彼頭者良、或云、即蓄藤莖、

圖經、通草、生石城山谷、及山陽、今澤潞漢中、江淮湖南州郡、亦有之、生作藤蔓、
大如指、其莖幹大者、徑二寸、每節有二三枝、枝頭出五葉、頗類石韋、又似芍藥、

二葉相對、夏秋開紫花、亦有白花者、結實、如小木瓜、核黑瓢白、食之甘美、南人謂之鶯覆、亦云烏蘋、正月二月、採枝陰乾用、或以爲葡萄苗、非也、今人謂之木通、而俗間所謂通草、乃通脫木也、此木生山側、葉如草麻、心空、中有瓤、輕白可愛、女工取以飾物、爾雅云、離南、活蕘、釋云、離南草也、一名活蕘、山海經、又名寇脫、生江南、高丈許、大葉似荷而肥、莖中有瓤、正白者、是也、又名倚商、主蟲毒、其花上粉、主諸蟲瘻、惡瘡、痔疾、取粉納瘡中、貞元廣利方、療瘰疬、及李絳兵部、療胸伏氣、攻胃咽不散、方中並用之、今京師園圃間、亦有種蒔者、又按、張氏燕吳行役記、楊州、大儀甘泉東院兩廊前、有通草、其形如椿、少葉、子垂梢際、如苦棟、與今所說殊別、不知是木通耶、通脫耶、或別是一種也、古方所用通草、皆今之木通、通脫、稀有使者、近世醫家、多用利小便、南人或以蜜煎作果、食之甚美、兼解諸藥毒、

本草拾遺、本功外、子味甘、利大小便、宣通、去煩熱、食之、令人心寬、止渴下氣、江

東人呼爲畜葛子、江西人呼爲擎子、如筭袋、穰黃子黑食之當去其皮、蘇云色白乃猴葛也。

防已



防已

藥草有毒
無毒當分
別論之本
經及後人
藥性此類
多矣且延
年云々又
何解也
忽又拉到
兩漢循吏
奇々

防已、本經、中品、李當之云、莖如葛根、外白內黃、如桔梗、今藥肆所用、殊不類。零婁農曰、李杲、以防已險而健、能爲亂階、聞其臭、則可惡、下咽、則令人身心煩亂、飲食減少、至於去十二經濕熱壅塞、非此藥不可、其與大黃匹敵可矣、甄權亦云、有小毒、李時珍以入蔓草、而本經、無毒中品、豈古人精神強固、不畏洩利、而後人柔弱、不能勝其苦寒、而乃以爲毒耶、夫藥力平者、不能去病、而猛者、性必有所偏、元氣已虧、根本漸撥、勝病之藥既不支、而苟且塞責之品、何裨毫末、兩漢循吏、多在承平、至於繡衣持斧、殺馬埋輪、其時紀綱未紊、民氣恬熙、故武健者、得行其志、而一時亦收火烈之效、至其季也、雖有戡平盜賊之績、不旋而復熾、火燎於原、一杯曷濟、故治病治民、不先審其根本、而恃藥力之投、頭有蟲、而剃之、蟲則盡矣、髮於何有。

[長編]本草經、防已、味辛平、主風寒、溫瘧、熱氣、諸癘、除邪、利大小便、一名解離、