

名醫類案

第三

S28

1775

1P3



名醫類案卷第三

新都篁南江瓘集

後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煥數會
歙鮑廷博以文

重校

痰

羅謙甫治楊大叅七旬餘宿有風痰春間忽病頭旋眼黑目

不見物心神煩亂兀兀欲吐不吐心中如懊懣狀頭徧痛

微腫而赤色腮頰亦赤色足胫冷

此足冷因痰火上升

羅曰此少壯

時好飲酒久積濕熱於內風痰內作上熱下寒陰陽不得

交通否之象也經云治熱以寒雖良工不能廢其繩墨而



更其道也。然而病有遠近。治有重輕。叅政年高氣弱。上熱雖盛。豈敢用寒涼之劑。損其脾胃。經云。熱則砭之。以三棱針約二十餘處。刺出紫血。如露珠之狀。少刻頭目清利。諸症悉減。遂處一方。天麻爲君。柴胡黃芩黃連俱酒製爲臣。以治上熱。陳皮辛溫炙甘草甘溫補中益氣爲佐。生薑半夏辛溫治風痰。茯苓甘平利水。導濕熱引而下行。故以爲使。立方可法服數服。邪氣平而愈。此案與東垣治火條中案相同。

滄州翁治一人。病寓湖心僧舍。以求治。翁至。其人方飯坐甫定。卽搏爐中灰雜飯猛噬。且喃喃詈人。命左右掖之。切其

脉三部皆弦直上下行而左寸口尤浮滑。蓋風畱心胞症也。法當湧其痰而凝其神。既湧出痰沫四五升。即熟睡。竟日乃寤。寤則病盡去。徐以治神之劑調之。神完如初。丹溪治一室女。素强健。六月發煩悶。困憊不食。時欲入井。脉沉細數弱。口漸渴。醫作暑病治。不効。又加嘔而瘦。手心熱。喜在暗處。脉漸伏而妄語。憑脉作暑治亦不謬。但喜在暗處云云。明屬風痰。朱制局方妙香丸。妙香丸方。辰砂。巴豆。冰片。麝。實大井水下。一丸。半日大便。藥已出矣。病不減。遂以麝香水洗藥。以針穿三孔。涼水吞。半日下稠痰數升。得睡漸愈。因記金匱云。昔肥而今瘦者。痰也。

一人患痰。血滯不行。胸中有飲。服韭汁三四盞。胸中煩躁不寧。無効。以瓜蒌仁一錢。半夏二錢。貝母三錢。爲末。炊餅丸。麻子大。薑湯送下。卽抑痰丸。

一人遍身俱是塊。塊卽痰也。二陳加白芥。薑炒黃連煎服。

一人年五十。形肥味厚。且多憂怒。脉常沉濇。自春來得痰氣病。醫認爲虛寒。率與燥熱香竄之劑。至四月間。兩足弱。氣上衝。飲食減。朱視之曰。此熱而脾虛痿厥之症作矣。形肥而脉沉。未是死症。但藥邪太盛。當此火旺。實難求生。且與竹瀝下白朮膏。盡二斤。氣降食進。一月後。仍大汗而死。案此

一婦年五十餘素多怒因食燒酒次早面浮絕不思食痰身

倦怠脉沉澹獨左豁大朱作體虛有痰氣為痰所隔不得

降當補虛利痰藥為主前六君吞滾痰丸每早以二陳加參朮大

劑與一貼後探令吐出藥辰時與索矩三和湯三倍加白

朮至睡後以神祐丸七粒撓其痰神祐丸不如滾痰丸佳如此一月

而安

虞恒德治一婦四月間因多食青梅得痰飲病日間胸膈中

大痛如刀錐至晚胸中痛止而膝髀大痛蓋痰飲隨氣升

降故也一醫作胃寒治胃寒之脉宜見沉遲或緊今見洪數而滑非寒可知用乾薑

良薑官桂烏附丁沉輩及煮胡椒粥間與病日劇加之口

渴。小水淋瀝。虞診其六脉洪數而滑。作清痰處治。令其亟烹竹瀝。服三日。口不渴。小水亦不淋瀝。但胸中與膝互痛如舊。用蘿蔔子汁。研與半碗。吐痰半升。至夜痛尤甚。兩厥正所謂引動其猖狂之勢耳。粗工至此束手無策矣。次日用參蘆一兩。逆流水煎服。不吐。又次日苦參煎湯服。亦不吐。又與附子尖、桔梗蘆皆不吐。一日侵晨。梨蘆末一錢。麝香少許。酸漿水調與。始得大吐。至次日天明吐方定。前後得痰及稠飲一小桶。其痛如脫。調理而安。

一東南朝貴。素畏熱藥。病痰。輒云火痰。茹芩連。一日冬雪寒冽。眩嘔以死。韓飛霞以黑附子一片。砒一分。春入薑汁。切

之大吐。又服煖藥而愈。此蓋地氣束人。豈可拘執自誤。

痰生於濕。濕生於寒乎。

吐寒痰之法

會稽徐彥純治一人。病痰數年不愈。診其脉。左手微細。右手

滑大。微細爲寒。滑大爲燥。以瓜蒂散湧其寒痰。數升。汗出。

如沃次。以導水丸。禹功散。去腸中燥垢。亦數升。人半愈。後

以淡劑流濕降火。開胃口。不越月而瘥。

吐下兼行

盛文紀以醫名吳中。有訓導病頭疼發熱惡寒。初作外感治。

或以風治。見熱則退熱。痛則止痛。或又以氣虛治。由是病

劇。人事不省。飲食已絕。

危哉

盛診視曰。君幾誤死。法當先去

其滯。遂用二陳湯加大黃六七錢。令守者曰。急煎俾服。至

夜分左眼若動。肝氣乃舒。大泄則有可生之機矣。至夜半時。腹中有聲。左眼果開。遺穢物斗許。中有堅硬如卵之狀。竹刀剖視。卽痰裹麪食也。此症斷之痰裹食非明眼不能既而氣舒。津液流通。卽索食矣。衆醫問故。盛曰。訓導公北人也。久居於吳。飲酒食麪。皆能助濕。濕能傷脾。脾土一虧。百病交作。有是病。服是藥。更何疑焉。衆醫咸服。

黃師文治一婦人。臥病垂三年。狀若勞瘵。諸醫以虛損治。不瘥。黃視之曰。此食陰物時。或遭驚也。問之。婦方自省。悟曰。曩者食水糲時。忽人報其夫墜水。由此一驚。病延至今。不能愈。黃以青木香丸。兼以利藥一貼與之。須臾下一塊。挾

之乃痰裹一水糲耳當時被驚怏怏在下而不自覺也。後安康無恙。

小兒醫陳日新形體尪羸。嘗曰病熱至暮尤甚。醫以陰虛治。或以癆瘵治。荏苒半載。病勢轉危。日新謂其父曰。欲得大黃通利大腸爲之一快。雖死無憾。其父從之。遂以導痰湯入硝黃煎服。自辰至申。下結糞一塊。如核桃許。抉開視之。乃上元看燈時所食粉餌。因痰裹在外不能化。由是致熱。日漸銷鑠耳。向使日新不自知醫。則終爲泉下人矣。誰謂劉張之法無補於世哉。

錢中立治周訓導年五十時患痰火之症。外貌雖癯。稟氣則

厚性不喜，醫視脉孟浪，指爲虛火，用補中益氣湯加參
朮各五錢。病者服藥踰時，反致氣喘上升，喘息幾殆。錢視
曰：此實火也，宜瀉不宜補。痰氣得補，火邪愈熾，豈不危殆？
先用二陳湯探吐，出痰碗許。其夜安寢。平明仍用二陳去
半夏，加朴硝、大黃，下結糞無數，其熱始退。更用調理藥，旬
日始安。吁！不識病機，妄施補瀉，鮮有不敗事者。

豐城尹莫強中，凡食已輒胸滿不下。多方治之不效。偶家人
輩合橘紅湯，取嘗之，似有味。因連日飲之。一日坐廳事，方
操筆，覺胸中有物墜下，大驚，目瞪汗如雨，急扶歸，須臾腹
疼，下數塊如鐵彈子，不可聞。自此胸次廓然，蓋脾之冷積

也其方橘皮去穰取紅一斤甘草鹽各四兩水五碗慢火煮乾焙搗爲末點服夫莫病經年藥餌多矣不知功乃在一橘皮世之所忽豈可不察哉又古方以橘皮四兩水五碗慢火煮乾焙搗爲末點服名曰二賢散以治痰特驗

編

吳茱山治一男子瘦弱因臥卑濕之地遂得溢飲之証頭目

眩暈羞日光寒熱時作

痰能作寒熱信然

四肢歷節疼痛

四肢歷節疼痛

乃濕飲流注關節

合羅案四肢病看之方妙處以大羌

活湯

大羌活湯方

羌活

獨活

升麻

靈仙

防

風

蒼朮

當歸

醫作風治或作虛治將及半年俱不

甘草

澤瀉

茯苓

效吳診脉曰寸口脉沉而滑兩尺弦此溢飲濕痰也但汗

吐之。諸醫以病者虛羸。當用補法。謂汗吐必死。吳曰。此溢

飲。當發其汗。遂以控涎丸一服。

控涎丸方
夏殭蠶

川烏
全蝎

製生

鎮粉
生薑汁打糊為丸
硃砂為衣薑湯下

却用爆乾綿子一斗燃之。以被圍

之。勿令氣泄。令患者坐薰良久。倏然吐出黑痰升許。大汗如雨。痛止身輕。其病遂愈。

一婦素有心脾氣痛。好燒酒。患舉則四肢厥冷。每用諸香附子薑桂之屬。隨服隨止。一日前患復作。遂以前藥服之。不安。仍飲燒酒二盞。酒下腹脇脹滿。坐臥不得。下木香檳榔丸一百丸。大便通後。痛稍可。頃間下墜愈痛。向夜延吳診視。脉數而有力。知前香燥太過。酒毒因利而發。即以黃連

解毒湯。入木香少許。二服而安。

秀按此條不當入痰案

王中陽治江東富商。自奉頗厚。忽患疾。心驚如畏人捕之。聞脂粉氣。即便遺泄。晝夜坐臥。常欲人擁護。方安甫交睫。卽陽氣不固。遍身紅暈紫斑。兩腿連足。淫濕損爛。膿下不絕。飲食倍常。酬應不倦。

非虛可知

累醫不效。王診得六脉俱長。三

部九候。往來有力。兩手寸尺特盛。至數遲數不愆。卒難斷

証。因問之。商曰。某但覺虛弱無力。多驚悸。及苦於下元不

固。兩腿風瘡。侍奉皆賴婦人。而又多慾。不能自禁。奈何治

之。王曰。時醫必作三種病治。一者治驚悸。二者治虛脫。三

者治風瘡。以余觀之。只服滾痰丸。然後調理。滿座愕然。王

曰此係太過之脉。心腎不交。

斷症妙

商曰然則腿脚爲風癱。

乎。王曰非也。水火亢行。心不攝血。運於下不能上升。

發於

肌膚日久濕爛。與火炎水濫。神情不寧。精元頻泄者。本同。

標異也。予欲逐去痰毒。然後調理。遂與滾痰丸二次。三日。

後脉候稍平。再令服之。商曰某浙產也。家人慮吾體虛。每。

求補劑。王曰君連年醫藥不效。反增劇者。不識虛實。認似。

爲真故也。再令服三次。越五日其脉和。已不言及驚悸之。

苦。但求遺泄之藥。王用豁痰湯。本方加茯苓。煎服月餘。諸。

症悉減。精爽能步。只求治腿瘡。更令服豁痰藥數劑。用嬰。

幼門泥金膏。以新汲水濃調。厚敷兩腿。乾則易之。經一時。

洗去則熱氣已衰皮肉寬皺然後用杖毒活血之劑治之
方出衛生寶鑑痰症
門泥金膏亦出此書

一貴婦忽心腹冷痛遂吐出宿汁不已又吐清涎如雞蛋清
之狀一嘔一二升許少頃復嘔諸藥不納嚙唾亦不能順

下。虞恒德治產後吐案
合看吐同症不同已經三日但聰明不昧。三日之後
聰明不寐

非虛可知囑後事將就木王診六脉弦細而長。虛症無
長脉令服滾

痰丸三十丸並不轉逆須臾坐寐移時索粥食之次日再

進三十丸更服局方茯苓半夏湯次日服小兒方白朮散

四五日飲食如常而愈

一人素清癯骨立苦滿腹冷痛呻吟之聲撼屋振床嘔吐清



汁如雞蛋清。諸醫不效。令服滾痰丸三十粒。卽寧睡。更不嘔逆。復診其脉。雖熟寐中亦甚弦數。睡醒仍更呻吟。再投五斗丸。其痛休作數四。但不甚大嘔。節續如廁。畧有大便。如水浸猪肉。亦如赤白滯下。小溲少許。皆如丹粉和膠膩。不多。餘皆是藥汁。迫暮大嘔。如雞蛋清水二升。藥丸皆如茶脚褐色。仍如前粒粒分曉。痛乃定。熟睡。次日畱豁痰湯數貼。令其服罷。仍服白朮散而愈。

燕人楊姓者久患冷氣。滿腹上攻下注。大痛不堪。任通陣壅。

上卽吐冷涎半升而止。

已見痰症

每日一作飲食不進。遂成骨

立。醫用溫補不效。視其脉六脉弦長勁急。兩畔別有細脉。