

觀聚方要補卷十目錄

小兒初生

平和飲子

甘草湯

朱蜜法

牛黃法

龍膽湯

紫丸

療初生不喫奶方

治胞熱撮口方

柴胡散

黃連法

百壽散
黃連甘草汁

治嘔吐乳奶方

茯苓圓

治胎寒腹痛方

治惡穢入腹嘔吐不止方

生地黃湯

釀乳方



瓜蒂散

五香散

定命散

沈瀼丹

諸癰驚風

龍膽湯

龍膽散

竹瀝磨犀角飲子

延齡散

胡黃連散

治驚癰方

抱龍圓

涼驚圓

瀉青圓

導赤散

防風導赤散

利驚圓

宣風散

治慢驚風方

虛風湯

銀白散



治卒得癰方

療驚癰癰掣方

烏蛇散

安神湯

犀角湯

治驚癰客忤方

朱砂鐵粉散

緩急湯

神烏散

人參牛黃散

羚羊角湯

犀角湯

銀棗湯

醒脾散

大醒脾散

烏蝎四君子湯

烏沈湯

礞石散

黑附湯

蝎附散
黑附子湯

川烏散

沉附湯



南京中医药大学图书馆藏

釣藤飲

陰癰散

醒脾散

寧神膏

防風天麻散

分肢散

沉香天麻湯

奪命散

神聖牛黃奪命散

無價散

固真湯

六柱散

琥珀散

白附丸

奪命散

柴胡加大黃湯

抑肝散

釣藤散

參附湯

紫金錠

治風痰吐沫方



治內熱痰壅方

加味回陽散

急構飲

諸疳

四靈圓

五疳丸

鐵粉圓

麝香圓

大蘆薈圓

胡黃連丸

三和飲子

蘆薈丸

保童丸

肥兒丸

消疳消食丸
黃連肥兒圓

蝦蟇丸

五蟾圓

五靈脂丹

黃芪湯

鼈血煎

不思食方



南京中醫藥大學圖書館藏

淨府散

抑肝扶脾散

清胃養脾湯

消痞飲

小兒諸症

紫丸

二物石膏湯

四物解肌湯升麻散

釣藤散

石膏散

加減四味飲子芍藥湯

藿香散

赤茯苓散

貝母散

牛黃圓

鶴蟲散

苦楝根散

黃芪圓

地黃圓補腎地黃圓
人參地黃圓

瀉白散

阿膠散 補肺散

益黃散

百木散 人參散

瀉心湯

異功散 和脾飲子
參苓散

藿香散

二氣散

惺惺散

消毒散

連翹飲

甜消散

治小兒盜汗方

石亭脂散

治小兒脾胃虛寒吐瀉等方

魏香散

紫蘇子散

葛根湯

六神湯 人參白朮散
銀白散
六神散



四順散

越桃飲子

人參犀角散

胡黃連散

惺惺散

清膈飲子

黑散子

海漂消散

貝母丸

甘瓜散

墜痰丸

溫脾丹

芍藥丸

海蛤散

金鈴散

白朮散

麥門冬散

山薊湯

滴金散

藿香散



雙金散

浴陰囊腫痛方

常歸散

三黃散

治吊氣方

治陰囊腫大方

呀方

升麻飲子

加減瀉黃散

大連翹飲

大連翹湯

烏梅散

五苓散

半夏圓

黃耆茯神散

治小兒蟲証腹痛方

治小兒直腸泄瀉方

乳附元

附苓元

治小兒嘔吐法

乳沈膏



香葛湯

消食圓

治夜啼方

阿魏丸

脫甲散

龜甲退熱散

犀角散

水萍散

調中散

神生救生散

牛黃解毒丸

四黃丸

益脾散

白附飲

碧玉丹

清脾飲



中國醫藥大學圖書館版權所有

觀聚方要補卷十

東都 丹波元簡廉夫

孫元昕兆壽

參訂

小兒初生

平和飲子顱顱治小兒初生日與。

人參 茯苓 甘草 升麻各一分

右水煎時時與之。臨時冷加白朮熱加芒消。

甘草湯十金兒洗浴斷臍竟棚抱畢以甘草如手中指一節許。

打碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計。

取一蜎殼入腹止兒當快吐吐去心胃中惡汁也。



朱蜜法 千金 飲甘草湯不吐者乃可與之以鎮心神安魂魄也

以飛鍊朱砂如大豆許以赤蜜一蜎殼和之以綿纏筋頭沾

取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日連之則

用三豆許勿過此則傷兒也

牛黃法 千金 與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃 治肝膽

除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也 以上三法外臺方引崔氏醫心方引

同品 ○幼幼張渙形色不實者不宜多服若胎熱或身體黃色

宜多服之

龍膽湯 千金 小兒初出腹面目悉黃而啼閉目聚口撮面口中

乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也宜與之 方出



紫九千金凡小兒不能乳哺當與紫九下之小兒始生生氣

盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不

時下則成大疾疾成則難治矣方出諸症

劉氏療小兒初生不喫妳方外臺

以乳兩合葱白一寸和煎一兩沸去葱與喫即能喫乳主效

○總微名通關散

治小兒胞熱撮口聖惠

牛黃錢一竹瀝合一

右令勻時時與少許服之此外臺劉氏療小兒喫妳不穩恐作撮口方

柴胡散聖惠治小兒變蒸經時不止挾熱心煩啼叫無歇骨熱

見後方要補卷十小兒初生



面黃

柴胡

甘草

人參

玄參

各一兩

龍膽

半兩

麥門冬

一兩半

右水煎。○直指小兒無玄參有防風。

集驗方黃連法

幼幼

凡小兒初生必有惡汁留於胃次若不消

去即胃膈壅塞易生蘊熱驚癇瘡癰皆由此也。用好肥黃連

搥碎每少許厚以綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁時一二點

在小兒口內即惡汁自下其後或間以朱蜜與之。○三因小

兒初生未須與乳且先與拍破黃連浸湯取濃汁調朱砂細

末抹兒口中打盡腹中舊屎方可與乳。

醫綱引海藏二味水煎灌下名百壽散。



○正傳凡生子于未發聲之先急宜取口中惡血以綿拭
淨後以黃連甘草二味等分煎汁灌一二匙則無病出痘
亦稀少若啼聲一發則嚇下矣亦當用黃連甘草汁飲之不
可忽也按小兒生下令吃甘草黃連汁本
出管見今所用甘連湯恐原正傳

小兒百日晬內或嘔吐乳妳或糞青色小兒
病源

用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚陳皮一錢於磁器內同
煎一二十沸却去丁香陳皮稍熱與兒服之

伏苓圓直指
小兒嬰兒初出惡穢入腹腹滿氣短不能飲乳宜用

赤伏苓 川黃連 枳殼

右等分爲末煉蜜圓桐子大每一圓乳汁調灌下此方本
出聖惠



治胎寒腹痛。直指小兒

木香

陳橘皮

檳榔各一分

棘桂

川白薑

甘草各半分

右末。取一掬水煎。以綿蘸與之。

治惡穢入腹。令兒嘔吐不止。直指小兒

木香

乾薑

伏苓

甘草各一分

酸木瓜

丁香各半分

右鹿末。一掬水煎。以綿與之。

生地黃湯。得効治生下遍體皆黃。身上壯熱。大小便不通。乳食

不進。啼叫不止。此胎黃之候。

四物湯加天花粉各等分

楊氏釀乳方

大成

解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉

二兩半

猪苓

茯苓

天花粉

各兩半

生地黃

二兩

茵陳

甘草

各一兩

右水煎食後令乳母捏去宿乳却服

瓜蒂散

袖珍小兒

治臍風撮口吹入鼻內啼則可治又療小兒三歲

忽發心滿堅硬脚手心熱則變為黃病不急治殺人

瓜蒂

七箇

赤豆

秫米

各七粒

右為末用一豆許吹兩鼻內令黃水汁出殘藥末盡水調服



中國醫藥大學圖書館版