

評琴
書屋
葉案
括要

第貳冊



評琴書屋葉案括要目錄

卷三

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

卷四

積聚

痞

噎膈反胃

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺

便閉

肺痺

胸痺

哮

喘

呃


疸



風 溫
熱

暑 寒

風 溫



評琴書屋葉案括要卷三

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺
鸞章翅霓

校刊

【汗】

脈細自汗。

下體怯冷

衛陽式微。

於朮炙草。

附子黃芪。

煨

薑南棗六味煎之。

綿黃芪

錢三

熟於朮

錢二

南棗肉

錢三

熟附子

錢七

炙甘草

錢五

煨老薑

錢一

勞傷營衛。汗熱相將。

脈弦大身時熱汗出

經云勞者溫之最良。

經云勞者溫之

桂枝

湯名桂芍生薑草棗

補血

湯名黃芪當歸

加減二湯。

嗽黃芪

錢三

桂枝木

錢一

炙草

錢五

南棗肉

錢三

當歸

錢半

白芍

錢半

煨薑

錢一



陽虛汗泄。亦屬勞傷。木芪防草。同補胃陽。

黃芪 三錢

白朮 二錢

防風 六分

炙草 五分

勞傷心神。氣泄為汗。生脈四君。生脈散合四君子湯見於梅案

人參 麥冬 五味 於朮 茯苓 炙草

案云。案牘積勞。神困食減。五心汗出。非因實熱。乃

火與元氣勢不兩立。此即內經所謂少火生氣壯火食氣氣泄為熱。為汗。當

治在無形。以實火宜清。虛熱宜補耳。議用生脈四

君子湯。

鎮攝汗止。參神芍美。草棗龍骨。送五味子。

人參 另煨

雲茯苓

生白芍



南京中医药大学图书馆版权所有

生龍骨

熟棗仁

炙甘草

煎藥送吞蒸熟北五味子三十粒。

案云陽明胃弱。致厥陰來乘。當丑時澀然汗出少。

寐多夢。

【脫】

附微先生法
治驗案一段

厥逆脈絕。陽微欲脫。人參附薑。胆汁冲。

人參

淡附子

淡乾薑

猪胆汁

服冲

服藥後。脈微續者生。暴出者死。

案云四肢冷汗氣喘。胸腹脹悶。都是陽微欲脫。脈

絕厥逆。勉與通脈。四逆湯。回陽驅陰以挽之。

絡血洞下。昏亂無神。子丑防脫。陰陽離根。參芪朮附。



五味相因。

人參

黃芪

於朮

附子

五味

案云、絡血洞下。昏亂無神。脈診三五參差。陰陽已屬離根。恐壞於子丑二時。真氣不相維續。勉用大封固一法。先生云大封固者。參附固守腎氣。附固守脾氣。芪附固守衛氣也。佐五味又欲固攝其陰。陽無陰無以附也。

陽飛欲脫。油汗神昏。參附童便。接續真元。

熟川附子

人參

童便

服冲

案云、遺尿目瞑。口開面亮。汗油陽飛欲脫。無藥力可挽。擬參附湯法。加入童便。圖元真接續耳。又

云、子丑為陰陽交界時。正不相續。復現脫象。用兩

攝陰陽方

用參附湯加五味子

又云、陽回。汗止神醒。無如陰液

欲涸。心熱渴飲。轉救胃汁。

方用人參麥冬五味茯苓建蓮

昏躁妄言。神氣消索。陰陽不交。五液枯寂故脫象欲作三才

湯加磁硃金箔。

人參錢一

天冬半錢

硃砂二分

熟地錢五

磁石五錢煨飛

金箔三張研冲

案云、議三才湯以滋水源。加磁石硃砂金箔以甯

神志。

神迷嚙語。陰陽相離。脈大不斂。欲脫之機。參神小麥。

阿膠炒之。龍骨牡蠣。鎮固相宜。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

人參錢一

清阿膠錢三

生龍骨錢五

茯神錢三

小麥仁錢五

生牡蠣錢五

案云、救陰無速效。急急鎮固陰陽。冀其甦息。余治

陰竭症。欲救陰以維陽。多用此二方法。因竊加入

分錢。上方或獨煎三才。用磁硃丸錢零同金箔研

勻冲服。真阿膠不必炒。用錢零同參另燉冲服。

固陽攝陰。附子人參。龍牡五味。暴脫治堪。

土木人參錢一

生龍骨錢五

五味子錢一

熟川附子錢四

生牡蠣錢五

此方列中風案中。但脫症最險要。不嫌重複。使學



醫者觸目留心。

羊城河南徐耕南少尹。親邀診其堂叔。據述叔年六十。因納妾喜補養。近日酷暑天氣。亦連日食酒。燉雄雞。芪燉綿羊。加以參茸補酒。偶外遊身即發熱。醫謂外感暑熱。內伏熱滯。頻進大劑苦寒服之。無功。反增胸脘脹悶。呃逆嘔惡。叔家人不明。仍信熱滯之論。余因求君診之。余隨之往診。按其脈浮虛無神。重按無有。余曰。氣虛中寒。大非熱症。家人訝余言。曰。食燥熱起病。何致寒中。余曰。寒藥便能寒中。又曰。病起身熱。余曰。身熱豈必服苦寒。據述

感暑起病。凡虛人感暑。初病與以清暑益氣。或補中益氣。一服熱或解矣。又曰中寒身應冷。何故反熱。

此一問却妙。古人有陽虛生外寒說。

余曰。臟腑一派陰寒。拒陽於外。而真

陽無所歸。此所謂重陰則熱也。故症有周身寒冷。

而偏服苦寒藥者。陽盛隔陰是。身熱熾而反

服燥熱藥者。陰盛隔陽是也。余見其家人不甚見

信。欲辭去。耕南苦留擬方。余曰惡悶呃逆。脫樣顯

然。恐非余藥力所能挽。交戌亥陰盛時。臟陰益肆。

余深慮其肢冷汗泄而陽脫矣。家人聞余言始懼。

亦誠求訂方。余即將先生此方加入分錢與之。

原方無分

錢

家人畏人參。余因以北麗參五錢代之。苦留余宿。余因止於耕南之家。初交申復邀診。謂漸覺肢冷神昏。余曰。午後便屬陰分。卽慮其汗泄脫矣。藥已服否。曰藥剛煎就。求先生再診。服之余診其脈。漸散。余曰。脈散四肢冷。亡陽汗至矣。宜冲入童便一杯。急進服。以挽之。藥將服。汗已漸泄。服後數刻。汗漸止。神漸清。病者再索藥飲。謂服此藥。脹悶已無。胸腹暢甚。久服苦寒。乍進溫熱中。寒者胸腹安得不暢快。余仍遵先生方。附子改用五錢。麗參仍用五錢。另燉土木參一錢。冲服。余曰。戌亥至陰之時。今四肢尚冷。仍慮其復脫。當速

煎服之。交戌再進飲。手足漸溫。旋即熟睡。明早診脈。漸有根柢。但口微渴。思飲。轉方議兼顧陽明胃陰。土木參附子麥冬木瓜各一錢。北麗參建蓮肉南棗肉各三錢。茯神一錢半。三帖諸恙略安。後將芪朮歸杞等參入加減而獲愈。

先生於脫症治法。回陽中必佐陰藥。攝陰內必兼顧陽氣。即此五症方法。足知其要旨。

凡陽脫於上。陰脫於下。陽脫如中風眩暈嘔吐喘。汗多亡陽之類是也。陰脫如瀉利崩漏胎產下。多亡陰之類是也。內閉外脫。如痧脹乾霍亂。痞脹。

瘞厥神昏不醒。臟腑窒塞之類是也。至難經謂脫陰者目盲。脫陽者見鬼。脫而至此。治亦難矣。醫者須為預防也。

【脾胃】胃虛少納。土不生金。音低氣餒。調養胃陰。沙

參玉竹冬豆桑甘。胃陰虛

生扁豆。一兩不研

白沙參。三錢

鮮桑葉。二錢

大麥冬。三錢連心

明玉竹。二錢

細甘草。四分

余治溫邪暑熱。或吐血。或一切燥熱症。因熱傷肺胃津致病。後納食少者。用先生此方法必應。渴者多煎代茶。用南棗肉四錢代甘草。雪梨乾亦佳。



九竅不和。都屬胃病。不食不飢。甘涼乃應。冬芍草麻。

蔗漿相稱。
大麥冬錢一 火麻仁錢二 小甘草五分 炙黑

生白芍錢二 臨服冲入青甘蔗漿一杯

案云、胃為陽土喜柔潤。惡剛燥。四君異功等竟

治脾之藥。脾為陰土 喜燥惡潤 胃宜通即是補。甘涼濡潤。胃氣下

行則有效驗。

口渴有痰。數服 胃陰未足。冬豆沙參。粳米草斛。肺胃 陰虛

炒麥冬 生扁豆 金釵斛

北沙參 白粳米 生甘草

知飢少納。胃陰有傷。麥冬桑葉。神斛蔗漿。



大金斛

大麥冬

生桑葉

雲茯苓

臨服冲甘蔗漿一杯

能食少運。溫通脾陽。苓朮益附。華撥乾薑。

脾陽虛

生白朮

一錢半

結雲苓

三錢

乾薑

一錢

淡川附子

一錢

益智仁

一錢

華撥

一錢

上一症。脾陽不病。故知飢。胃陰有傷。故少納。此一

症。胃陰不病。故能食。脾陽有病。故少運。蓋納食主

於胃。運化主於脾也。胃病先生主養陰。脾病先生

主扶陽。太陰濕土。得陽始運。陽明陽土。得陰自安

也。相因選錄。

此症在下治脾案中選上

使學者知一脾一胃一陰一



陽。治法迥別。李東垣善治脾而略治胃。若葉先生

可謂盡善矣。

胃陽受傷。溫通腑陽。參苓陳益。荷米炒香。胃陽虛

人參 益智仁 炒荷葉

茯苓 老陳皮 炒粳米

案云、腑病以通為補。若與守中謂求單等必致壅逆。

胃陽已虛。食入安化。苓朮樸陳。益砂仁夏。

生白朮 益智仁 川厚樸 法夏麴

雲茯苓 春砂仁 老陳皮

食難用飽。臍上過寸有聚氣橫東每三四日一更衣清陽失司。脈右濡萆薢半夏。蒲薑桂



南京中医药大学图书馆版权所有