

癰疹
頭眩
頭痛
頭風
眼目

耳聾
鼻病
口舌
牙齒

風執門

斑疹五十九

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以微汗散之切不可下 內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降於陰症畧例中求之 發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理 疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汁亦有可下者 疹卽瘡疹汗之卽愈通聖散中消息之 癰疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癰疹也發則多痒或不仁者是熱風熱濕之殊色紅者熱火化也 黃灰水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之

附諸方

玄參升麻湯 三四方

治傷寒失下熱毒在胃發癰或汗下吐後餘

毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參

升麻

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分溫服溫毒發斑亦宜服之

陽毒升麻湯

治人方

治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻

三分

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

炙各三分

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯

治人方

治發狂煩燥面赤咽痛潮熱

施子仁

赤芍藥

大青

知母

升麻

黃芩

石膏

各二兩

甘草

炙半兩

杏仁

去皮尖二兩

柴胡

一兩五錢

右咬咀每服四錢薑三片豆豉百粒水煎溫服

化癰湯 治傷寒汗吐下後癰發脉虛

人參

八分

石膏

一錢

知母

七分

甘草

二分

右咬咀時時煎服

守真加白朮

一方加玄參

八分

黃連橘皮湯

治溫毒發斑

黃連

去毛四兩

陳橘皮

杏仁

去皮尖

枳實

麻黃

去節湯泡

葛根

各一兩

厚朴

姜製

甘草

炙各一兩

右咬咀水煎服

調中湯 治內傷外感而發陰斑

蒼木

一錢半

陳皮

一錢

砂仁

藿香

芍藥

炒

甘草

炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼

各二錢

川芎

五分

麻黃

桂枝

各五分

右咬咀薑三片水煎服

消毒犀角飲子

牛蒡子

大錢

荊芥

防風

各三錢

甘草

一錢

右咬咀水煎服

通聖散

出丹溪經驗方

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍

各半兩

黃芩

石膏

桔梗

各一兩

滑石

三兩

荊芥

梔子

白朮

各二錢半

甘草

二兩

石劉水煎服

如身疼加蒼朮羌活

痰嗽加半夏

每服細末三錢生薑三片搗細盪起煎沸服之

頭眩

六十

丹溪心法

○頭眩

痰挾氣虛併火

治痰為主挾補氣藥及降火藥

無痰

則不作眩痰因火動又有濕痰者

濕痰者多宜二陳湯火者加酒

苓挾氣虛者相火也治痰為先挾氣藥降火藥如東垣半夏白朮大

麻湯之類

眩暈不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下

火動其

痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕左手脉數熱多脉澁有死

血右手脉實有痰積脉大是久病久一作虛久病之人氣血俱虛

而脉大痰濁不降也

昔有一老婦患赤白帶一年半頭眩坐立不

得睡之則安專治赤白帶帶愈其眩亦安

附脉理

脉訣舉要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風濕涎紫濕
細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審諦先理痰水次隨
症治

附諸方

獨活散

楊氏家藏方

消風化痰治頭目暈眩

細辛

去葉一兩

石膏

甘草

炙各半兩

防風

去芦

藁本

去土一

旋覆花

蔓荊子

川芎

獨活

去芦各一兩

右為末每服二錢水一鍾薑三片煎至六分食後熱服

川芎散

本事方

治風眩頭暈

山藥

甘菊花

人參

小川芎

扶神各錢

山茱萸肉兩

右為末每服二錢酒調不拘時日三服不可悞用野菊花

白木湯

濟生方

治冒雨中濕眩暈吐逆頭重不食

川芎

半夏

白木

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一鍾薑七片煎七分溫服不拘時

芎朮除眩湯

直指方

治感寒濕頭目眩暈

甘草

川芎

附子

白朮

官桂

各等分

右咬咀每服三錢薑七片水煎溫服食前

荆黃湯

張子和方

治頭眩

大黃

荆芥穗

防風

各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芎辛湯

齊生方

治風寒在

腦或感邪濕頭重痛眩暈欲倒嘔吐不

定並皆治之

川芎

一兩

細辛

洗去土

白朮

甘草

各半兩

右咬咀每服一兩薑五片茶芽少許水一鍾半煎八分臨臥溫服或食後服亦可

頭運方

利痰清氣降火

南星

製五分

半夏

一錢

桔梗

七分

枳殼

一錢

陳皮

一錢

甘草

三分

茯苓

一錢

黃芩

一分

右作一服薑七片水煎服食後

香橘飲

治氣虛眩運

木香

白朮

半夏

橘皮

扶苓

砂仁

丁香

甘草

右咬咀水二鍾薑五片煎服

加當歸川芎官桂治血虛眩運

白附子丸

治風痰上厥眩運頭疼

全蝎

炒牛兩

白附子

炮

南星

炮

半夏

旋覆花

甘菊

天麻

川芎

橘紅

僵蚕

炒

乾薑

生各一兩

右為末生薑半斤取汁打糊丸梧子大煎荊芥湯下五十丸

人參前胡湯

治風痰頭運目眩

半夏

木香

枳殼

炒

紫蘇

赤茯苓

南星

炮

甘草

炙各五錢

人參

三錢

前胡

橘紅

各五錢

右剉咀每服五錢薑五片水煎服

川芎茶調散

治風眩頭痛

見傷風

半夏白朮天麻湯

見頭痛

喝起散

大全良方

治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事喝起草

即蒼耳草也

右取嫩心不以多少陰乾爲末每服二錢酒調下

黑錫丹

治早起眩暈須臾自定以爲常此因老痰鬱痰所作必須

此藥劫之

見痰類

○廣按頭眩之症多主於痰無痰則不作眩有因寒痰濕痰者有因

熱痰風痰者有因氣虛挾痰者有因血虛挾痰者其症不一也夫

寒痰濕痰作眩或因外感寒濕或因內傷生冷熱痰風痰作眩或

因外感風暑或因內動七情氣虛眩暈或因脾虛不進飲食或因

胃弱嘔吐泄瀉血虛眩暈男子每因吐血下血女人每因崩中產

後而作也已上數方雖各有所主未能盡其變在智者辨之也
又嘗論之夫咳嗽頭痛頭眩三者乃病之標必治其病之本而病
方已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之
本也

頭痛

六十一

附眉眶痛

丹溪心法

○頭痛多主於痰痛甚者火多有可吐者可下者 清空膏治諸頭
痛除血虛頭痛不可治 出東垣試効方 血虛頭痛自魚尾上攻頭痛
用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

王節齋曰久頭痛病憂感風寒使發寒月洎重綿厚帕包裹者此屬

鬱熱本熱而標寒。世人不識。率用辛溫解散之藥。暫時得効。誤認爲寒。殊不知因其本有鬱熱。毛竅常疎。故風寒易入。外寒束其內。熱閉逆而爲痛。辛熱之藥。雖能開通閉逆。散其標之寒邪。然必熱濟熱。病本益深。惡寒愈甚矣。唯當瀉火涼血爲主。而佐以辛溫散表之劑。以從治法治之。則病可愈而根可除也。

附脉理

脉訣舉要曰。頭痛陽弦。浮風監寒。風熱共數。濕細而堅。氣虛頭痛。雖弦必瀉。按厥則滑。腎厥堅實。

頭痛治例

心法附錄曰。頭痛須用川芎。如不愈。參加引經藥。

太陽川芎 陽明白芷 少陰柴胡 太陰蒼朮

少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是濕痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藥本白芷

如風熱在土頭痛宜天麻蔓荊子白芍酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃耆酒洗生地黄南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如苦頭痛用細辛

如頂顛痛宜藥本防風柴胡東垣云頂顛痛須用藥本去川芎

且如太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實升麻葛根石膏白芷為主
太陰頭痛必有痰體重或腹痛脉沉緩以蒼朮半夏南星為主
少陰頭痛是寒氣逆爲寒厥其脉沉細麻黃細辛附子為主
厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩以吳茱萸湯主之

血虛頭痛當歸川芎爲主

氣虛頭病人參黃耆爲主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荊子二分細辛二
分其効如神

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也徒知體而不
知用者樊體用不失可謂上工矣

附諸方

加減三五七散

和劑方

治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦陽虛

頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有濕痺脚氣緩弱併皆治

山茱萸

去核三兩

細辛

一兩半

乾薑

炮三兩

防風

去芦四兩

茯苓

去皮三兩

附子

三箇半炮去皮臍

右爲細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散

治諸風上攻頭目偏正頭痛

見傷風

都梁丸

和劑方

治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷

風頭痛

香白芷

陳大者沸湯洗五次剉曬乾

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯下

小芎辛湯

濟生方

治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已

丹溪付徐

卷十二

頭痛

八

川芎 一兩

細辛 洗去土

白朮

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢木一鍾薑五片茶芽少許煎服

一方 治傷風感風一切頭痛

甘菊 一兩

細辛 半兩

甘草 七錢

白芷

羌活

香附子

薄荷

各三兩

荊芥

二十

茵陳 半兩

蒼朮

洗浸

川芎

各一兩

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

定風餅子

秘方

治偏正頭痛

草烏頭

半兩

香白芷 一兩

川芎 二兩

防風

天麻

甘草

炒各一兩

細辛

半兩

右為末薑汁丸如龍眼大捏作餅子每服一餅食後茶湯下

川芎丸

聖惠方

治風寒化痰涎利頭清頭自旋暈心忪煩熱頸項