

本草求源

参

三



本草求原卷三

隰草

牛膝

氣平

屬秋入肺

味苦酸

屬火木入心包肝

無毒是秉木火

之化以升陰于上仍歸金水以降陽于下

根直下生故也

使陰得陽宣而不滯陽隨陰降而血不泣故主寒

濕痿痺

入肺以通調水道則足三陽下行而濕熱寒濕皆除

四肢拘攣膝痛

不可屈伸

入肝活血養筋也

逐血氣

行血中氣則血因氣凝之病可逐非破血

之比以其入心

傷熱火爛

苦能瀉火故熱湯之傷火傷之爛可完

墮

胎

苦伐生生之氣兼酸則涌泄而又下行故胎墮

久服輕身耐老

統言其流通血

脉之療傷中少氣陰者中之守以陽爲化原益腎

功氣著爲病則陰傷氣少利陰氣填精髓續絕宣上順下以入通經通淋止

尿血莖痛產後腹痛血暈癰腫傷折陰分久瘧尿

秘失溺生用去惡血川產酒浸焙補肝腎粗而黃者

更生但性太下降凡血虛筋骨痛軟脾虛下陷而

精泄痢腿痛膝腫血崩均忌

按逐血中氣如何營之精端在脉中衛之浮氣行

脉外而不入脉然必衛氣充周乃能調和臟腑而

入於脉脉之內外總是一氣衛弱而營不行則血

中之氣著而為病。由是寒則疼。熱則腫。而為癰瘻。

為淋痢。為暑瘧。癰疹陰分久瘡。根苗同用。濃煎調。驚甲末服。胃虛加。

陳皮必得此上升而下行者。功乃捷。懷慶川產。

者。長大至三五尺。肥柔而潤。兼補精髓。一名各處。

所生名。

土牛膝。短而細。端破血氣。治小便淋痛。尿血。或沙石。

脹痛。不論川生土生并效。喉痺乳蛾。鮮者取汁和。人乳灌鼻。即。

痰涎從口鼻中。痢下先赤後白。名腸蠱酒。搗浸服。婦人血。

塊。尿秘莖痛欲死。酒煎或為末酒。調連葉用更佳。無名惡瘡。金瘡。

生搗敷。

甘菊花

一名節華。應重陽節而華也。

華于秋。飽霜不隕。莖葉味

苦。

能降肺。花味甘。氣香平。無毒。稟金精而兼水化。陰入心。

故能滋肺腎之陰。以平肝火。而生肝血。為祛風要

藥。

金能制木。肝主諸風。頭眩腫痛。凡香物皆治頭。血足則風熄。

性皆多燥。惟菊清肅。不目欲脫。淚出。肝主目。為陰。燦。故于頭目風火尤宜。

于陽風火上淫。目痛欲脫。皮膚死肌。惡風濕痺。風。而淚出。火降則熱除。風熄。

痺於皮肉。不知痛痒。金氣久服。利血氣。肝藏血。司。走皮膚。甘香屬土。治肌肉。

入心。則毛脉合精。而生血。血生。輕身延年耐老。利。則風升之用。暢而脉利。肢調。

氣之療眼目昏花同川椒為未生地汁為丸茶清下免終身目疾

同杞子蜜丸久服兼頭眩髮落胸中痰壅頭旋欲倒

合花用或和羹粥飲日三次收白菊軟苗陰干為末酒服或去腎膜風而生

菊花不論大小以香甘者入藥氣惡味苦者為野

菊名苦蕒傷胃忌用三月采葉五月采莖九月采

花皆陰乾用黃者入金水陰分小者童便浸晒干

更生精白者入金水陽分去風黑髮紅者入婦人

血分皆用甘者益益氣益血不離甘離甘則為偏

陰偏陽之氣莖葉並用同甘草濃煎最治五疔

楊梅瘡血線疔尤宜

或加皮膠有
瘕者加枯草

以諸疔皆肝經

風火之毒也

艾葉

生辛勝于苦氣溫熟熱苦勝于辛無毒博物

志言削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火故

艾名冰臺是陰中之陽水中之火凡陰血中陽虛

不能化濕鬱為血病得之則陽達陰化而血生與

陽耗陰故溫下元逐冷濕以開陰滯肝冷腹痛子

宮冷不孕

有艾
附丸

經不調陽虛下陷而胎動漏血腹

痛血崩產後下血

四物加之以
益陽固陰

及霍亂後下痢腹

脹而汗出風冷入中泄痢白朮湯有艾陰氣承陽而吐

衄固用之卽血熱吐血四生丸用之血虛不孕同香和童便煮

入六經行先期血少經不調醋浸煮同阿膠枳壳入四物以燉陽歸陰

產後血虛下痢下血蒲黃散用之妊娠下血崩漏屬陰

虛者四物加阿膠以益肺陰加艾以溫肝脾腎之陽升降氣血以和之皆于補陰

及寒涼劑中加之是欲陰得陽爲主不合陰寒傷

陽而後陰化以完陰也又肝熱血滯目痛燒艾烟出以碗

蓋之取碗中煤和黃姜活散用之風冷目淚肝熱痢病連水化洗或點之

葶藶苦木別三錢雄黃二錢硫黃一錢入艾絨中安陰陽瓦內置被裡酒湯及熏疥瘡入艾絨中安陰陽瓦內置被裡

烘皆達鬱之用也。又熟艾治丹田畏冷。人布袋集

濕脚氣。

夾入襪內

作炷灸風濕痺疼癆熱陰疽初起。竅

開利關竅之功

不拘州土生田野類蒿複道者佳俗稱

甜艾爲上火艾次之。今人皆尙祈艾考之經註所

州艾葉背白有莖寔九牛草耳非艾種。

治血痢

吐血宜生用取汁入丸散宜熟艾醋煮乾搗成餅

烘乾再研末入些茯苓同研則易碎作炷以陳久

爲良新則傷肌脉。

中風口噤灸承漿一穴頰車

二穴各五壯。

中風掣痛不仁不隨並以火嘴瓶

燒艾。嘴向痛處熏之。癰癤諸風。于陰囊下谷道。

正門當中間。隨年歲灸之。頭風久痛。揉艾為丸。常

嗅之。以黃水出為度。妊娠胎動。或腰痛。或搶心。

或下血。或倒產子死腹中。酒煮艾飲。胎動腹痛。


醋煎艾服。

茵陳蒿。經云。春三月。此為發陳。茵陳秋後莖枯。經

冬不死。春因舊苗而復生。故名茵陳氣平。入胃微寒。入腎味

苦微辛。香如艾。能疎利健行其絲如腠理。如脉絡。是因

冬令水寒之氣。具陽春發達之機。使土中之水由



木而達。凡諸邪成熱。從腠理脉絡而內薄中土。以

為黃疸者。皆散而出之。主治風濕寒熱邪氣。春陽生發

之氣能散。得水寒之氣則內熱除。如重

辛又主散熱結黃疸。黃而晦。合梔子大黃瀉腸胃

之濕熱。以治陽明之裏。如橘黃而明。合梔子栝

皮清心。胸之熱。以治陽明之表。二方皆治陽黃。又

治寒濕陰黃。理中湯加之。便溏之濕。勝為黃。加入五少陽之

瘧黃。加入小柴胡。及酒疸。同酒炒黃連黃栢干葛五味

足腫尿赤。是又穀疸。因傷食而得。同二朮苓女勞

田螺煮酒食。澤車通橘麴紅麴麥冬。黃疸。房勞後入水。致身目黃。額黑。小腹滿急。大便

○又飲花粉汁。并以猪勞疸。因勞而得。同胆草梔

膏煎髮至枯。去渣服。仁猪胆汁為丸。麥飲

食疸

同胆草苦參牛胆汁為丸傷酒酒下餘以姜湯麥牙湯山查湯任下

風疾攣

急

同秫米酒麴釀酒飲

通關節利小便除濕熱治時疾熱狂

頭痛頭旋風眼久服輕身益氣耐老皆生陽上升

水化行土化達之功令面白悅因陳生新故也

所治皆外感之陽黃陰黃與內傷濕熱之症若陽

虛虛勞寒濕痿黃及蓄血發黃勿用葉緊細有

八角背白香如艾采陰干用勿犯火以無花寔名

毛茵陳者佳有花寔者名鈴兒茵陳少效

青蒿

氣寒

屬陰

味苦

已出陽

無毒葉青細而香入望春

早生。是具水之精。得少陽生升之。氣能從陰引陽。

以出。達肝快脾。以化液生血。為補陰退熱之妙品。

與苦寒除熱傷胃。及甘寒益血不能退熱者異。主疥癩癰痒惡瘡。皆風熱之淫于

外者。得風升之氣。又香能入脾。以行氣。殺蟲治留。

于三陰。三陽則脾陰化。而肌湊之病愈。殺蟲治留。

熱在骨節間。腎陰虛血少。則陽陷陰中。骨內蒸蒸。

胆甘草。虛勞盜汗。煩熱口乾。熬膏同沙參麥冬。諸

未為丸。經血熱。血虛有熱。蓐勞虛熱。化液生血者脾也。脾

明目。益水達肝之功。療風毒心痛。肝藏血。主風。血與風本

熱。則血熱不散。即為風毒。所謂血熱。瘧疾寒熱。端

流。逆風入腸胃。而主血之心亦病。

采葉陰干。同桂等分爲末。先單熱多痰溫瘧。童便

寒熱酒。先熱冷酒。五更下。入黃丹一半。鼻衄熱黃。生搗敷金瘡。止血止

白湯下二錢。葉細而香。春生苗。至夏則高五六尺。凡蒿葉

疼。淡青。秋卽黃。惟此獨深青。秋不黃。開細淡黃花。結

子如麻。花寔俱香。春夏用苗葉。秋冬用子根。須炒

過。以受金氣厚。恐傷少陽生氣也。治下焦陰虛。

童便製。治上焦血分結熱。宜生搗汁服。按苦寒

直入心包。暑傷包絡。猝倒心痛欲死。同參連神薷

暑熱發紫斑。身大熱。將發狂。同連升二冬。暑月濕

霍亂

同藟米苓陳砂仁

產婦暑濕吐瀉

同參芎歸桂

皆重用之

多効

益母草

一名茺蔚一名薺又名野天麻

莖葉花穗氣寒味甘微苦

辛無毒二月生近水田野夏高三四尺葉如艾莖

方節節生穗充盛蔚密故名五月采穗性極耐旱

詩云中谷有薺燠其干矣得水濕之精具辛竄之味故滋養皮

膚主治癰疹可作浴湯又清熱涼血解毒但專于

行血惟經脉內滯難產胎衣不下血脹血暈瘀血

薄心惡露腹痛血風血閉經阻經行作痛

俱宜端午采紫

花的搗汁。晒干。和蜜參珀。宜之。若胎產挾虛。必兼乳沒血竭。沉香丹砂靈脂。子用。今人泥益母之名。而常用草。往往誤事。生搗汁服。消腫毒瘡瘍。五疔。乳癰丹遊等。兼敷之。並打撲內瘀。二便不通。取汁和童便下死胎。及熱入血室。發熱煩躁。同生地冬芍。枇杷青蒿五味。阿膠。治血熱胎漏。經行先期。同甘菊蒼耳銀花。紫地丁川貝。莠子。殭芡。蘇翹。甘地。枯草。消一切疔腫發背。無名腫毒。

莠蔚子

卽益母草子

春生苗。五月間穗開小花。每萼內

有四小寔。夏至後。莖葉皆枯。其子褐黑色。辛潤散兼

甘脾入微溫。無毒。是稟水土之氣化。具春溫木德之

全。充盛于夏。不受秋之降氣。故主升散。入肝胆血

分。補而兼行。為胎前產後要藥。以胎從厥陰始。結

產自少陽發伸也。主明目。得水精而達肝。凡風瞳

子散大勿用。血不足也。此味熱血滯目。病俱宜。除水氣。土氣衰則液

則液化血益精通血。脉養肝。凡肝氣虛而滯。致經

脉不調。崩中帶下。最宜。又安胎止痛。同四物杜久

服輕身。精氣充五月開花。結子時。連根葉并采。蔚也。