

圖書集成醫部全錄

第五十一冊
小兒諸卒中
驚癇



博物彙編藝術典第四百四十四卷目錄

醫部彙考四百二十四

小兒諸卒中門

孫思邈千金方 嬰孺客忤

萬氏幼科發揮 客忤

魯伯嗣學嬰童百問 風證風熱

徐春甫古今醫統 物觸候 小兒中暑

王肯堂證治準繩 中風 偏風口噤 中人忤 中惡 卒死 鬼持 疰病 尸疰 蠱疰 馬脾

小兒衛生總微方論 中風論 三疰論

方二物燒髮散 石膏湯 大黃牡蠣湯 二物石膏湯 桂枝湯 二物驢毛散 一物猪蹄散

治鬼持方 深師五邪丸 沈香順氣散 化風丹 安息香煎 千金湯 雀屎圓 太乙備急散 追風刺毒散

紫參丸 羚羊角散 水香散 桃奴散 鬼箭羽散 雄黃丸 鬼箭羽湯 殊聖方 雄黃丸 敗鼓皮散

雄麝散 犀磨湯 犀角散 真珠散 安神丸 真珠散 雄黃丸 蘇合香丸 保命丹 雄麝散

單方

鍼灸

祝由

醫案

博物彙編藝術典第四百四十五卷目錄

醫部彙考四百二十五

小兒驚癇門一

黃帝素問 奇病論篇

孫思邈千金方 驚癇論 候癇

錢乙小兒直訣 急驚風證治 慢驚風證治 發搐證治 癇癇證治

劉完素六書 驚風

張從政儒門事親 驚風 發驚潮搐 慢驚

羅天益衛生寶鑑 急慢驚風

李杲十書 治小兒驚論

朱震亨平治會萃 急慢驚風

幼科全書 驚風 西江月

方賢奇效良方 驚風搐搦不治證 驚風治證 驚風痰食五癇 症

萬氏幼科發揮 驚 急驚風有三因 驚後 癇 天鈞內鈞

育嬰家祕 天鈞內鈞

博物彙編藝術典第四百四十六卷目錄
醫部彙考四百二十六

小兒驚癇門二

魯伯嗣學嬰童百問 發搐 急驚 慢驚 脾風 急慢脾風下痰輕重驚癇 驚風 天鈞內鈞

虞搏醫學正傳 急慢驚風論

王綸明醫雜著 小兒病多屬肝脾二經 急驚 急驚變慢驚 驚搐 小兒用藥不宜峻厲 驚

薛氏保嬰撮要 肝臟 後目動咬牙 出痘發搐 驚搐等證誤用藥餌 驚搐目直 目動咬牙 睡中驚動

龔信古今醫鑑 驚風不治證 八候 痙證 搖頭便血

樓英醫學綱目 急驚 癇症

徐春甫古今醫統 驚風候各有所屬

博物彙編藝術典第四百四十七卷目錄

博物彙編藝術典第四百五十卷目錄

醫部彙考四百三十

小兒驚癇門六

方二

利痰九 益黃散 安神九 補陽湯 神鬼丹 導赤散 五龍丸 定喘湯 育聖白丸 調元湯
參苓白朮散 久病方 辰砂膏 琥珀散 抱龍丸 五龍丸 定喘湯 育聖白丸 調元湯
省風湯 珍珠丸 振定膏 七寶洗心散 葛根湯 又五龍丸 定喘湯 育聖白丸 調元湯
湯 醒脾散 大醒脾散 星香散 桂枝湯 又五龍丸 定喘湯 育聖白丸 調元湯
生 蘆薈散 扶苓二陳湯 生附散 定命飲 又五龍丸 定喘湯 育聖白丸 調元湯
散 養氣散 扶苓二陳湯 生附散 定命飲 又五龍丸 定喘湯 育聖白丸 調元湯
丹 神妙奪命丹 黃九陳湯 生附散 定命飲 又五龍丸 定喘湯 育聖白丸 調元湯
魏香散 釣藤飲 保命九 乳香 蟬蛻 木香 蘇合香 王監製 聖散 天南星 七寶散 濟丹 復丹 聖散 開關散 玉波
小柴胡湯 大承氣湯 大柴胡湯 九香 蟬蛻 木香 蘇合香 王監製 聖散 天南星 七寶散 濟丹 復丹 聖散 開關散 玉波

博物彙編藝術典第四百五十一卷目錄

醫部彙考四百三十一

小兒驚癇門七

方三

參蘇飲 八參羌活散 惺惺散 獨活湯 木通散 已風丹 羅氏鐵肝丸 赤散 仁齋犀角
風散 湯氏金風丹 定搐散 牛黃清心丸 睡紅散 鄭氏定搐散 木通散 已風丹 羅氏鐵肝丸 赤散 仁齋犀角
湯氏金風丹 定搐散 牛黃清心丸 睡紅散 鄭氏定搐散 木通散 已風丹 羅氏鐵肝丸 赤散 仁齋犀角
鄭氏金風丹 定搐散 牛黃清心丸 睡紅散 鄭氏定搐散 木通散 已風丹 羅氏鐵肝丸 赤散 仁齋犀角
化毒丹 安睡散 蛇頭丸 通直散 天麻丸 比金丸 直利散 白散 演志九 加味黃珠丸 五福
湯 茯苓散 釀乳方 固真湯 烏雞散 醒脾散 沉珠散 天麻散 梓木散 豆蔻散 平肝散 天麻散 防風散 砂七
散 八仙散 釀乳方 固真湯 烏雞散 醒脾散 沉珠散 天麻散 梓木散 豆蔻散 平肝散 天麻散 防風散 砂七
生事醒脾丸 蠟山觀音全散 天麻湯 烏雞散 醒脾散 沉珠散 天麻散 梓木散 豆蔻散 平肝散 天麻散 防風散 砂七
味羌活膏 琥珀散 龍九 又散 奪命散 醒脾散 沉珠散 天麻散 梓木散 豆蔻散 平肝散 天麻散 防風散 砂七
珠羌活膏 琥珀散 龍九 又散 奪命散 醒脾散 沉珠散 天麻散 梓木散 豆蔻散 平肝散 天麻散 防風散 砂七

博物彙編藝術典第四百五十二卷目錄

小兒諸卒中門

唐孫思邈千金方

嬰孺客忤

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是爲客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還衣服經履鬼神蠱暴惡氣或牛馬之氣皆爲忤也執作喘息乳氣未定者皆爲客忤其乳母遇醉及房勞喘後乳兒最劇能殺兒也不可不慎凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便向兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬氣皆令小兒中馬客忤慎護之特重一歲兒也凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外來亦能驚小兒致病欲防之法諸有從外來人凡有異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒牛尿令常有煙氣置戶前則善

小兒中客爲病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病者豈是一切小兒悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脈嫩弱秋初夏末晨夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢是故夏末秋初小兒多壯熱而下痢也未必皆是中客及魅也若治少小法夏末秋初常宜候天氣溫涼也有暴寒卒冷者其少小則多患壯熱而下痢也慎不可先下之皆先殺毒後下之爾元中記云天下有女鳥名曰姑獲一名天帝女一名隱飛鳥一名夜行遊女又名鉤星鬼喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚得來者是也鳥純雌無雄不產陰氣毒化生喜落毛羽於人中庭置兒衣中便令兒作癩病必死卽化爲其兒也是以小兒生至十歲衣被不可露也七八月尤忌

凡中客忤之爲病類皆吐下青黃白色水穀解離腹痛大糾面色變易其候似癩但眼不上插耳其脈急數者是也宜與龍膽湯下之加人參當歸各如龍膽秤分等多少也小兒中客急視其口中懸癰左右當有青黑腫脈核如麻豆大或赤或青或白如此便宜用鍼速刺潰去之亦可爪摘決之并以綿纏釵頭拭

去血也少小中客之爲病吐下青黃赤白汁腹中痛及反側偃側喘似癰狀但目不上挿少睡耳面變五色其脈弦急若失時不治少久則難治矣欲療之方用豉數合水拌令濕擣熟丸如雞子大以摩兒額及手足心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛卽擲丸道中痛卽止明萬氏幼科發揮

客忤

心主驚心藏神兒心氣怯弱或聞大聲見異物異人未有不動其神也謂之客忤客忤者口中吐青黃白沫水穀鮮雜面色變異喘息腹痛反側瘕癃狀似驚癰但眼不上竄耳治法宜辟邪正氣散驚安神蘇合丸至聖保命丹主之

客忤者謂客氣忤犯主氣之病也如五氣之邪自鼻而入則忤其心肝五味之邪自口而入則忤其脾胃有所驚恐則忤其神有所拂逆則忤其意當博求之故曰心誠求之雖不中不遠矣

兒性執拗凡平日親愛之人玩弄之物不可失也失則心思則傷脾昏睡不食求人不得則怒怒則傷肝啼哭不止此忤其心也平日未親愛之人未見之物不可使之見見則驚驚則傷心凡未見之人不可使之近迫近則恐恐則傷腎令兒成癰此皆客忤病也今之爲父母者則稱所畏者以止之如長老止夜啼之故事爲醫者因兒不服藥則持鍼以搏灸以迫之令兒生病

魯伯嗣學嬰童百問

風證風熱

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊蓄外則腠理開虛故風邪乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂躁搐掣氣壅口噤涎潮是也心中風則偃臥不能傾側發熱失音其舌焦赤若汗流唇赤者可治灸心俞或脣間白黑青黃乃心壞爲水或面目青黑時時竦動者並不治肝中風則踞坐不得低頭左脅疼痛諸筋掣急頭目轉動上視多怒其目青若遠兩目連額微青脣青面黃者可治灸肝俞大段青無其目一黃一白不治腎中風則踞坐面浮腰脊痛引小腹其耳黑若兩脅未有黃色起者可治灸

收其脣黃若一身通黃口吐鹹涎者可治灸脾俞或手足青而厥冷者不治凡人爲風邪所中皆自背上五臟俞而入風入於頰頰之間則口喎而牙噤風寒於咽喉聲音之間則語不出而失音風與氣搏氣與痰隔則喉間如鼾聲之聲響是風也始入於膚腠次達於經絡而搏於經脈筋得寒則拘急攣痛得熱則緩弛不隨風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也拘攣脈必浮緊緩弛脈必浮洪寒者小續命湯熱者追風剉毒散之類脈浮者病在表脈實者病在裏脈促者病在上在表者散之在裏者利之在上者湧之若虛而寒者則烏附之類又不可缺古人治法雖以灼艾之類爲本亦當消息權度而投劑焉雖然風寒暑濕皆能中人况又有因氣而中風者人之驟病莫急於中風倉卒之際若未能精審且與下氣豁痰蓋中風皆因痰鬱氣滯而作先用通關散以疏之急以南星生薑木香煎湯調蘇合香丸灌下牙緊者南星細辛末入麝香烏梅肉點擦牙自開進藥之後痰消氣下病勢稍蘇即詳審五臟外證而調理之宜省風湯羌活散勢甚者防風通聖散化風丹牛黃散釣藤散至寶丹等劑可選而用之

徐春甫古今醫統

物觸候

大抵小兒隨其心性不可觸逆凡有所愛之物不可強直取之心神所好若不遂欲心氣解散神逐物遷不食不言神昏如醉四肢垂痺狀如中惡醫士見之莫之措手如有此證詢其母及左右順其所欲然後用藥則安也

小兒中暑

小兒伏中暑證發熱汗出引飲或吐瀉癰亂腸痛又有脈虛手足微寒發渴口熱者又有煩熱而嘔吐利不食至成搐搦如驚狀似傷寒者不可便作驚病及傷寒用藥只可與五苓散六和半夏湯消息之萬無一失有偏寒偏熱者以意用藥甚不可執一也

王肯堂證治準繩

中風

張澳等方有中風方論今見小兒絕無患者而用藥多犯香燥恐血熱生風類中風證誤用之則爲害不淺故一切制而不載薛氏云中風之證西北方有之東南氣溫腠理疎泄人患之者皆類中風也況小兒元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽掣氣癰涎涌甚至昏憤口噤卽似中風誤以續命等湯投之多至不救大人且無真中況小兒乎凡有前證當辨其因若陽明經氣虛風邪所乘筋脈拘急者爲外因足厥陰肝火熾盛筋脈偏急者爲內因脾肺虛弱腠理不密外邪乘入或驚風過服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養肝致口眼喎斜者皆肝血不足肝火生風之類中風之類證也

偏風口噤

小兒偏風者屬少陽厥陰肝膽二經證也噤者筋急中風木太盛而乘於脾以勝水濕則金太燥然燥金主於收斂勁切故也又曰風之爲病善行而數變或左或右其因一也治須審而藥之若足陽明胃經氣虛風邪所乘其筋脈偏急者屬外因若足厥陰肝經風熱乘脾筋脈偏急者屬內因若脾肺虛弱腠理不密外邪所乘或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養脾致口眼歪斜或半身不遂諸證皆屬肝血不足肝火生風宜滋腎水養肝血壯脾土治法脾胃虛而動風者異功散加柴胡釣藤鉤脾肺虛而外邪所乘者用釣藤飲肝火血燥者用六味地黃丸津液不足者用白朮散若兼目緊上視寒熱往來小便淋瀝面色帶青兩脅脹痛之類皆肝經之本病也或唇口歪斜腹痛少食目泡浮腫面色青黃肢體倦怠之類皆肝木乘脾之證也當審五臟相勝而主之設執其見證槩投風藥反成壞證者有矣

中人忤

茅先生曰小兒生下犯人噤候面青黑合兩眼閉吐逆不下乳此候因生下來不免外人看問或有腋氣或因婦人月假不淨或外人帶邪神觸著生下來夾故乳哺使觸異氣之物氣血未就又被風邪擊致此所治者先用朱砂膏乳上吮下後用鎮心丸夾醒脾散與服卽愈如見不下乳眼視肚硬死候大凡初生下兒子家中人不見不可便與外人入房看問人家各有神祇又恐婦人腋氣及月假不淨觸著恐中忤忤卽是養兒之法

精氣衰弱，鬼毒惡氣中之其狀，外無他病，卒然心腹刺痛悶亂，欲死是也。凡中惡腹大而滿，脈緊大而浮者，死緊細而微者，生。餘勢不盡，停滯臟腑之間，更發後變為疰也。

治法：先下蘇合香丸，未醒以皂角末搐鼻，次服沉香降氣湯，加人參、茯苓，又能辟邪。客忤亦宜服。

卒死

巢氏云：小兒卒死者，是三虛而遇賊風，故無病倉卒而死也。三虛者，乘年之衰一也，逢月之空二也，失時之和三也。有人因此三虛，復為賊風所傷，使陰氣偏竭於內，陽氣阻隔於外，而氣壅閉，陰陽不通，故暴絕而死也。若臟腑未竭，良久乃蘇，亦有兼挾鬼神氣者，皆須邪退乃生也。凡中客忤及中惡卒死，而邪氣不盡，停蓄心腹，久乃發動，多變成疰也。

茅先生云：卒死候，眼合，齋齒遍身如綿，面青黑，口鼻冷。此候本因生下而遍身熱，或因有驚，患醫人一向退熱，不會下得驚積及癩積，遂積聚被邪氣至此。

右前件三個候都來一般，只是要辨元初受患根源，治之急下奪命散，與吐下風涎。

醒後便下勻氣散二服，補除後下朱砂膏、鎮心丸與服。如有伏熱來時，即下大附散與調理。二三日安樂前件三個形候，只是此一般調理。上件疾見鴉聲上啼，偏搐汗如珠，不得睡，眼瘴淚出，死候不治。

鬼持

巢氏云：小兒神氣軟弱，精爽微羸，而神魂被鬼所持，其狀不覺有餘疾，直爾痿黃，多大啼喚，口氣常臭是也。

嬰童寶鑑：小兒鬼持歌云：小兒氣弱，命中衰魂魄多應被鬼持。其候痿黃多哭，地不須用藥，可求師。

鬼氣歌云：鬼氣皮膚裏相傳，臟腑間腫虛如水。病瘕癰似驚，癩熱發渾身。澀心攣痛所攢，小兒還有此服藥急須看。

疰病

巢氏云：疰之言住也，謂其風邪鬼氣留人身內也。人無問大小，若血氣虛衰，則陰陽失守，風邪鬼氣因而

客之留住肌肉之間連滯臟腑之內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮腫沉滯至死死又疰易傍人故爲疰也小兒不能觸冒風邪多因乳母解脫之時不避溫涼暑濕或抱持出入早晚其神魂軟弱而爲鬼氣所傷故病也

尸疰

巢氏云尸疰者是五尸之中一尸疰也人無問小大腹內皆有尸蟲尸蟲爲性忌惡多接引外邪共爲患害小兒血氣衰弱者精神亦羸故尸疰因而爲病其狀沉嘿不的知病之處或寒熱淋漓涉引歲月遂至於死死又疰易傍人故名之爲尸疰也

蟲疰

巢氏云人聚蛇蟲雜類以器皿盛之令相噉食餘一存者即名爲蟲能變化或隨飲食入腹食人五臟小兒有中者病狀與大人老子無異則心腹刺痛懊悶急者即死緩者涉厯歲月漸深羸困食心臟盡利血心臟爛乃死死又疰易傍人故爲蟲疰也

馬脾風

暴喘而脹滿也

田氏云暴喘俗傳爲馬脾風也大小便噎宜急下之用牛黃奪命散後用白虎湯平之

馬脾風在百日內者不治

小兒衛生總微方論

中風論

小兒血氣柔弱肌肉脆薄若寒溫失度則皮膚開爲風邪所中始著俞穴而行經脈次隨氣血而入腑臟從其所著即生病焉其入腑臟者唯心肺二臟居膜鬲之上空隙之處又俞穴亦在於上故風乃易中而有患者其狀昏困不省手足抽掣心胃滿氣短多汗此尤爲急大抵其餘腑臟皆居膜鬲之下疊實之處又俞穴亦在於下故風乃難中而無患者其入於經脈者爲病甚多今舉其有患者具之風症者一云風

邪傷中風經也或因解脫或臍瘡未合爲風所傷皆令發瘳其狀口噤不開項背身體強直耳中策策而痛一向昏愖不省其脈如弦直上下也雖與驚癇相似然發而時省身輒者驚癇也若發不時醒身輒強直者風瘳也其卒然身瘳者死凡角弓反張者亦由風傷陽經也故令背腰反折不能俛屈如角弓之狀此亦頗似瘳病然瘳病身體強直此病身體反折所以異也中風口噤者手三陽之筋入絡頰頰足陽明之筋上夾於口風邪中於諸陽之筋使機關攣急不利故使口噤不能開也診其脈遲者主中風拘攣及不隨者風邪寒熱入於經絡搏於筋脈筋脈受邪冷則四支拘攣熱則緩縱不隨也診其脈脈急細如弦者筋急拘攣也若脾脈緩弱者四支不隨也中風口眼喎斜者由風邪入於頰頰之筋其脈偏急故令口眼喎斜目不能平視語不能正也診其脈浮而遲者可治又云夜臥當耳有隙因風入耳亦令人口喎也中風瘳不省者由風邪先中於陰病發於五臟其狀奄忽不知人事喉中噫噫有聲舌強不能言汗出身軟眼下鼻兩邊人中左右有色白可治若一黑一赤吐沫者難治汗不出體直者死

三症論

小兒疰病有三一者鬼疰小兒神魂氣弱早晚抱持出入無時爲鬼厲邪氣所干其候皮膚掣痛游易無常或心腹刺痛天矯悶亂遁名中惡甚者卒致於死緩者延引歲月更變沉滯以至於死又注傍人二者尸疰人腹中有蟲曰尸疰小兒血氣嫩弱邪氣外傷留滯身中尸蟲移引相乘爲病其候沉沉嘿嘿不知的病之處或寒或熱或心腹悶痛涉引歲月遂至於死又注傍人三曰蠱毒疰謂諸毒蟲之中有一能噉其餘者卽爲之最名之曰蠱或因人作或因引注隨飲食入小兒腹中食兒臟腑其候心腹刺痛懊悶欲絕利下無時或便血片急者卽死名曰中蠱之毒緩者涉引歲月以至臟爛乃死又注傍人

方

增損續命湯

千金方下同

治小兒卒中風惡毒及久風四肢角弓反張不隨并癱瘓僻不能行步

麻黃 甘草 桂心各一兩 芎藭 葛根 升麻 當歸 獨活各十八銖 人參 黃芩 石膏各

半兩 杏仁二十枚 右十二味咬咀以水六升煮麻黃去上沫乃納諸藥煮取一升二合三歲兒分爲

四服一日令盡少取汗得汗以粉粉之

石膏湯 治小兒中風惡非不能語口服了尿四肢不隨

石膏一合 麻黃八銖 甘草 射干 桂心 芍藥 當歸各四銖 細辛二銖 右八味咬咀以水

三升先煮麻黃三沸去上沫內餘藥煮取一升三歲兒分爲四服日三

大黃牡蠣湯 治少小中風狀如欲絕

大黃 牡蠣煨 龍骨煨 瓜蒌根 甘草 桂心各二十銖 赤石脂 寒水石各六銖 右八味咬

咀以水一升內藥重半兩煮再沸絞去滓牛歲兒服如雞子大一枚大兒盡服入口中卽愈汗出粉之藥無毒可每日二服 有熱加大黃 不汗加麻黃 無寒水石卽代之

二物石膏湯 治少小中風手足拘急

石膏如雞大子大一塊碎 眞珠一兩 右以水二升煮石膏五六沸內眞珠煮取一升稍稍分服

桂枝湯 治少小中風脈浮發熱自汗項強鼻鳴乾嘔

桂心 生薑 甘草 芍藥各一兩 大棗四枚 右五味咬咀三物以水三升煮取一升分三服

二物鹽毛散 治少小新生中風

鹽毛取背前交脊上脊中拔取如手母指大一把 麝香二豆大 右以乳汁和銅器中微火煎令焦熟

出爲末小兒不能飲以乳汁和之葦筒貯瀉著咽中然後飲乳令入腹

一物猪蹄散 治小兒寒熱及赤氣中人

猪後脚懸蹄 右燒末搗篩以飲乳汁一撮立效

二物燒髮散 治少小見人來卒不佳腹中作聲者用

向來者人頭上髮十莖 斷兒衣帶少許 右合燒灰細末和乳飲兒卽愈

一物馬通浴湯 治少小中忤

馬通三升 右燒令煙絕以酒一斗煮三沸去滓浴兒卽愈

一物猪通浴湯 治小兒中人忤軀啼面青腹強者

蜀椒 左顧牡蠣各六銖碎 右二味以酢漿水一升煮取五合每服一合

雀屎圓 治小兒卒中風口噤不下一物

雀屎如麻子 右丸之飲下即愈大良雞屎白亦佳

太乙備急散 主卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼瘵及中蠱症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒陰

毒病六七日

雄黃 芫花 桂心各二兩 丹砂研水飛 蜀椒各二兩 藜蘆 巴豆各一分 野葛三分

附子炮裂去皮臍五分 右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆和合更搗令勻調以銅器中密貯

之勿洩有急疾水服一字匕可加至半錢匕兒小者半之痛在頭當鼻衄在膈上吐在膈下利在四肢

當汗出此之所謂如湯沃雪手下皆愈祕之非賢不傳

獺肝丸 治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病

獺肝一具 雄黃 莽草 丹砂 鬼臼 犀角 巴豆各一兩 麝香二分 大黃 牛黃各一兩

蜈蚣一條 右十一味末之蜜圓空腹服如麻子大一圓加至三圓以知爲度

治鬼持方

虎睛爪并指骨毛 右繫小兒臂上辟惡鬼

深師五邪丸 療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此爲鬼忤當得殺鬼丸

丹砂 雄黃俱飛各八錢 龍骨 馬目毒公 鬼箭各五兩 鬼臼二兩 赤小豆研三兩

芫青一枚 桃仁百枚去皮尖熬別研 右九味搗下篩細絹篩合諸藥拌令勻調後內蠟和之大如彈

丸絳囊盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬見之所服蜜和圓如梧子大一服三九日

三服忌五辛生血物

沉香順氣飲 治小兒物忤逆觸

沉香 茯神 紫蘇葉 人參 炙草各一錢 右爲細末紫蘇梗煎湯調化不拘時服

安息香煎 治同前

安息香 蘇合香 檀香 藿香葉 甘草 膽南星各等分 右爲細末薑汁調作小餅每用磨化塗

爛上及焚烟避一切客忤及物觸

三生丸 全幼心驚

小兒暑風暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之證非此三生料瞑眩之劑不

能伐之

白附子 天南星 半夏並去皮各等分 右生研猪膽汁和丸黍米大量兒大小以薄荷湯下令兒側臥

嘔出痰水即甦

綠雲丹 經方

小兒風痰卒中

銅綠不計多少 右研粉醋麪糊炙于大每用薄荷酒化服一丸須臾吐涎如膠神效

通關散 嬰重百問下同

治卒暴中風不省人事牙關緊急藥不得嚥下

細辛 薄荷 牙硝 雄黃各等分 右爲末每用少許吹入鼻中候嚏然後進藥或用白梅擦牙更以

莖蒲末著舌下牙關即開

追風剉毒散 治中風內外皆熱

大黃 郁李仁炒各二錢 桑白皮炒 檳榔 防風各半兩 羌活一兩 右剉散每服二錢黑豆三

十粒同煎乳食後服

省風湯 治驚風口噤筋脉掣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆胃膈煩滿恍惚不定等證

生南星 防風各四兩 甘草 半夏湯浸一宿 黃芩去麤皮各二兩 右剉散每服二錢生薑一片

去滓溫服不拘時

羌活散 治傷風寒驚熱或中風體硬

羌活 川獨活 前胡 柴胡 川芎 白茯苓 桔梗 枳殼 人參 地骨皮 天麻各等分

甘草減半 右剉散生薑薄荷煎不拘時服 一方加麻黃乾葛薏苡仁 加蟬蛻治驚熱

防風通聖散 治小兒熱甚驚風或斑疹出不快者更熱劇黑陷將欲死者或風熱驚厥人不愈者諸

防風 川芎 大黃 當歸 薄荷葉 芍藥 麻黃去根節 芒硝各半兩 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石六兩 生甘草二兩 白木 荆芥 山梔子各二錢半 右判每二錢薑二片水一盞煎七分不拘時服

化風丹 祛風化痰退熱定搐

羌活 獨活 防風 天麻 膽星 人參 川芎 荆芥 粉草 全蠍各等分 右爲末煉蜜丸如

芡實大薄荷湯調下一二丸 一方加辰砂麝香

釣藤散 治吐利脾胃氣虛生風

釣藤鉤三錢 蟬蛻 天麻 防風 蠅尾 人參各半兩 麻黃 白直僵蠶炒 炙草 川芎各二

錢半 麝香不拘多少 右判散白水煎 寒多加附子末半錢

至寶丹 治諸癰急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並皆治之

生犀角屑 生瑤瑁屑 眞琥珀研細水飛 雄黃各一兩 金箔一半爲衣 銀箔各五十片

眞片腦研 眞麝香研 眞牛黃研各一錢 安息香一兩半爲末以無灰酒濾去沙石約取一兩

慢火熬成膏 右件將犀角瑤瑁屑搗羅爲細末研入諸藥令調勻將安息膏以重湯煮化和搗爲劑如乾

卽添入少熟蜜盛磁器中旋丸如桐子大二歲兒卻服二丸人參湯化下大小以意加減又治大人諸卒

中不語中諸惡氣中諸物毒熱暗風產前後血暈死胎不下並用童子小便一合生薑搗自然汁三五滴

同溫過化下五丸立效

辟邪膏 張漢方 嬰兒血氣未實皆神氣軟弱除父母及乳養之常照管外不可令見生人及抱往別

房異戶及不可見牛馬獸畜等其父母家人之類自外及夜行歸家亦不可見兒恐經履鬼神羸

惡暴氣若犯之令兒吐下青黃赤白水穀解離其狀似發癰者但眼不上戴脈不弦急名曰客忤

眞降香剉 白膠香 沉香 虎頭骨微炒 鬼臼去毛 草龍膽 人參 白茯苓 右件各半兩搗

羅爲細末次入水磨雄黃半兩細研水飛次研麝香一錢都拌勻煉蜜和如雞頭大每服一粒煎乳香