

新刻幼科百效全书

中



新刻幼科分門症論卷之中

胎熱

胎熱者。由母娠之時。氣鬱受煎。燂睡炕。及悞服溫劑。致令熱畜於內。薰蒸胎氣。兒生之后。或壯熱驚啼。面紅唇赤。眼目赤腫。鵝口重舌。赤遊丹毒。便秘溺赤。眼翻天吊。皆胎熱之症也。不可醫求速効。當令乳母忌鷄魚煎燂辛辣之物。又服調氣養血清解之藥。釀乳哺之。兒服犀角解毒湯①合導赤散②。隨症加減。通用大連翹飲③。

金谿

儒醫

龔應圓

輯著

校刊

建邑

書林

劉龍田

校刊



胎寒

胎寒者。由母娠之時。多食生冷。或外感。多服涼劑。內傷。兒生之後。旬日內。或昏睡。吮乳。面青唇白。腹疼瀉白。啼哭。已。曲足握拳。口噤不乳。四肢厥冷。皆胎寒之症也。治宜理湯主之。④否則變為盤腸內吊。鉤藤膏⑤治之甚妙。

胎驚胎風

此候皆由娠母驚狂顛。損傷心血。或外挾風邪。應之於胎。兒生之後。面青搐搦。口噤身熱。脊強。目直。竄視。最為難治。凡胎眼合。不可作慢驚治。而妄用溫藥也。只宜通用豬乳膏⑥治之。或用全蝎全者。將薄荷葉裹外。以麻線纏火土炙燥。研

為末。另研珍珠射香少許。和勻。煎麥門冬湯調下。

胎黃

兒生下。遍身面目皆黃。狀如金色。壯熱便秘。弱未。皆由受濕熱傳於胞胎也。治宜地黃茵陳湯七主之。

臍風撮口噤口

三者之候。名異而原一也。皆由斷臍結縛不緊。為水濕風冷之氣。侵入臍中。傳之於心。蘊畜其邪。沒傳脾絡。其候舌強唇青。口噤。搐搦。腹滿。臍腫。多啼。皆裡氣鬱結。壅閉不通也。四肢冷。爪甲黑者。即死。口噤不開者。用南星。太皮臍為末。加水片少許。用指蘸生薑汁於牙齦上擦之。立開。方用藥。若唇撮急。

灸承漿穴七壯。服藥通用撮風散①主之。或二虫丸②亦妙。

夜啼

小兒生下有二啼。其一面紅多泪。無燈則稍息。見燈則啼。是心熱遇火。兩陽相搏。故見燈而啼甚也。其候手腹熱。溺赤。治宜涼心安神。導赤散③加梔仁薄荷天麻主之。其二夜哭多睡。少天明則已。面色青白。便赤青白。治宜去宿冷。溫下焦。先用備急方④。又芍藥湯主之。⑤其三祟物所侵。小兒目有所覩。口不能言。但睡中驚惕。抱母大哭不已。面色紫黑。治宜蘇合丸⑥。琥珀抱龍丸⑦主之。又有脾胃虛。吐瀉。少食而啼者。宜六君子湯⑧加炮姜水香主之。有心血不足而夜啼者。

安神丸(主)主之有乳母缺乳。兒無乳哺。故啼哭也。有兒生
疳重舌。要乳吃。口到不能吮乳。便啼。不可不辨。

急驚

急驚症候。夜卧不寧。身熱煩燥。便秘溺未。痰喘咬乳。目直上
視。牙關口噤。手足搐搦。脉浮數洪緊。皆由內有實熱。外挾風
邪。心受熱而發驚。肝生風而發搐。二臟交爭。涎痰壅塞。關竅
不通。風氣畜盛。而無所泄。故暴烈而為急驚也。治宜先通關
用通關散(主)或援生散(主)次截風定搐。用截風丸(主)定搐散
(主)或牛黃抱龍丸(主)痰熱既降。當養血安神。用安神丸(主)若
搐定而尚有微邪。宜消痰清熱。若搐不定。仍議下之。



慢驚慢脾

慢驚多發於大病之後。或候汗下。或吐瀉久。而脾胃虛弱。虛熱生痰。凝滯咽喉。如牽鋸之聲。時復癰瘕。口氣四肢俱青。白。二便利。露睛啼哭。忽如啞聲。皆脾肺虛弱故也。治宜健脾土為主。甚不可攻擊。症雖有痰。只以六君子湯（古）加天麻。鈎藤。炮薑主之。若痰多唇白。肢冷如冰。不省人事。此虛慢之極。用固真湯（三）主之。又有慢脾風者。皆由慢驚傳變。始因吐瀉。久而脾虛生風。入經絡。則手足搐搦。痰涎壅盛。面色枯槁。項軟。喘甚。昏沉不省。最為難治。若驅風則無風。可驅。若療驚則無驚。可療。脾間痰涎。虛熱往來耳。治宜理中湯加附

子④若大衝有脉。當灸百會穴。

附驚風所得之因

蓋驚風則一。而所因則異。詳具於左。有傷風熱。致心熱盛而
生驚。肝邪動而發搐。治先發散。通心氣。疎肝經。安魂退熱之
劑。有傷暑熱而發驚搐。人事不甦。脉沉細數。治宜消暑清心
飲。③辰砂五苓散。③之類。有傷風咳嗽。痰涎壅盛。而發驚搐
者。治宜導痰順氣之劑。用牛黃抱龍丸。⑤有胎毒瘡腫即愈。
其毒內攻腹脹而發驚搐者。治宜百解散。⑥如瘡再作可治。
否則喘脹而死。有大人喊叫。或犬吠。鷄鳴。雷響。因驚而發搐
者。治宜鎮驚安神。用牛黃鎮驚丸。⑦茯神金銀濃煎湯下。有



中醫藥大學圖書館版權所有

傷風寒。醫過表散。汗多亡陽。而為慢驚者。治宜保元湯。
因客忤而驚搐者。治宜鎮心丸。
血不足。稍為驚恐。而便掣搦。治宜固真湯。
成慢驚。治宜姜半散。
止。以其氣得流通。而邪易散也。

驚風不治症

急驚。目睛不轉。口中出血。而足擺跳。肚腹搐動。或神緩而摸
骹尋衣。或痰驚而神昏氣促。灌藥不下。通關不寢。心中熱痛。
忽大叫者。不治也。慢驚。四肢厥冷。直臥如尸。吐瀉痰喘。二便
不禁。脉沉肢冷者。不治也。

癰症

小兒癰病。古有心癰。面赤目瞪。吐舌齟齬。心下煩燥。氣短自
數。肝癰。面青唇青。眼直上竄。手足拳掣。抽掣。脾癰。面色痿黃。
露睛直視。腹滿自利。四肢不收。肺癰。面如枯骨。驚跳搖頭。腰
脊反折。手瘕吐沫。腎癰。面色黧黑。口噤流涎。目直腹脹。不動
如尸。病因不同。宜隨脉症。分陰陽虛實而治之。其始身有熱。
抽掣啼叫。咬牙竄視。是為陽癰。陽病脉浮數。面色光澤。病在
六臟肌表。此尤易治。用百解散。⑤抱龍丸。⑥元之類。其始身無
熱。手足青冷。口噤驚啼。吐舌搖頭。是為陰癰。陰病脉沉微。面
色黯晦。病在五臟骨髓。此最難痊。宜固真湯。⑦南星治之。或



以日發為陽癰。夜發為陰癰。以仰臥屬陽。覆臥屬陰。亦可
驗。蓋陽症不宜用溫藥。陰症不可用寒涼藥也。通用五癰丸
辛六癰丹三治癰九三主之

痺症

夫痺者。乾瘦也。小兒為痺症。大人為勞瘵。皆由寒熱失理。飲
食不節。肥甘恣食。致傷脾胃。或因吐久。瀉久。痢久。瘡久。熱久
汗久。咳久。瘡久。皆脾胃虧損。亡失津液。而為痺病也。又有瘡
後疹後。耗傷氣血。而成痺症。大法辨虛實。酌補瀉扶胃氣為
主。古人論五臟五痺之症。備詳於左。心痺者。即驚痺也。發熱
自汗。面黃頰赤。口舌生瘡。驚悸煩渴。小便赤澀。皆由心血不



足。更加乳食不調。心臟積熱所致。治宜寧心養血退熱之劑。
用心疳丸。^③或寧心丸。^④肝疳者。即風疳也。肌肉消瘦。目胞
赤腫。翳生眵泪。白膜遮睛。擗眉劓眼。瀉如青色。皆由外感風
寒。內傷飲食。邪氣相干。肝臟受熱所致。肝者眼之候。伏熱壅
滯。以致肝風入眼。治法涼肝養血。順氣調脾為主。用肝疳丸。
^⑤脾疳者。即食疳也。黃瘦面腫。身熱肚大。瀉下酸臭。合面困
卧。吃土吃米吃茶。治宜磨積調脾為主。用大肥兒丸。^⑥或調
脾湯。^⑦若積而虛者。先扶胃氣。方與磨積。肺疳者。即氣疳也。
潮熱喘嗽。鼻爛流涕。咽喉不利。皆因傷風寒。汗後勞復。更加
飲食不調。以致肺氣受傷而得。治宜清肺止咳之劑。先用清

肺湯。^①次用化愚丸。^②其鼻常用熊膽泡湯。小兒蘸洗。俟前藥各進數服。再用欽鼻散。^③入鼻欽瘡。腎痺者。即急痺也。潮熱。肌瘦。手足如冰。滑泄肚痛。翕々熱渴。薰蒸于陽明。齒腐銀爛。治宜清熱退痺之劑。用六味地黃丸。^④加龍膽草。知母。疳者。皺眉多啼。嘔吐清沫。肚大腹痛。唇口紫黑。皆由乳哺不調。食肉太早。為積滯而為疳。治宜安虫去積。調脾為主。用史君子丸。^⑤痺癆者。潮熱往來。五心煩熱。盜汗骨蒸。喘咳神枯。渴瀉惡食。肚硬如石。面白如銀。朝涼暮熱。肌肉削瘦。六脉細數。皆由病久而脾胃氣虛。治宜補養清熱為主。用痺癆丸。^⑥或大肥兒丸。^⑦缺乳痺者。皆由乳母無乳。與食飼之。然小

大項小。臍突胸高立坐伶仃。神枯精疲。啼叫不已是也。補露者。潮熱往來。頭骨分開。翻食吐涎。煩渴。嘔穢是也。二者。疳之易名。皆由脾胃久虛。不能消化米穀。無以滋其氣血。致肌肉消瘦。柴骨枯露也。又有胎中受氣血不全。臟腑少血。致之治宜蘆薈丸。(一) 蚶皮丸。(二) 之類。無辜疳。皆由內有積熱。外感風邪。風熱相搏。故結挾在項。狀若瘰癧。軟而不疼。按之轉動。宜服消疳養血之劑。若走馬疳。用正硝散。(三) 通用千金肥兒丸。(四) 至寶丹。(五)

吐瀉

內經曰。胃虛則吐。脾虛則瀉。脾胃俱虛。吐瀉兼作。宜辨虛實。

而治之。若先瀉後吐。面白神疲。不熱不渴。額前有汗。脉沉濡者。乃脾胃虛寒也。宜理中湯。四小異功散主之。五先吐後瀉。面赤唇紅。煩渴溺赤。脉洪數者。乃脾胃有熱也。宜黃連芍藥湯。五五苓散加竹茹主之。六又有積滯於脾。再為飲食所傷。不能運化而吐瀉者。宜消導二陳湯。九有脾胃氣虛而吐瀉不止者。宜溫補為主。六君子湯。四夾暑傷食吐瀉者。用加味二陳湯。辛有長夏時內傷外感致陰陽不能升降。乖隔而為吐瀉者。治宜六和湯。立胃苓湯。立之類。有霍亂而不得吐瀉者。名乾霍亂也。有遍身轉筋。手足厥冷。腹中絞痛。謂之轉筋吐瀉。又名絞腸沙。升降不通故也。大法用鹽湯探其吐。夏月

鹽水急可吐。後隨症調理。或用蘆粟米煎湯服尤妙。

嘔吐

內經曰。嘔吐皆屬於胃。虛則吐。胃熱則嘔。火氣炎上之象。

蓋吐有冷吐。熱吐。積吐。傷風嗽吐。傷乳吐。氣乳吐也。冷吐者。

皆由風寒入胃。或食主冷。或傷宿乳。胃虛不納。吐出乳片不

消。多吐而少出。或清涎夾乳吐出。或朝食暮吐。或暮食朝吐。

面白。眼慢。氣緩。神疲。六脈沉微。二便清利。治法溫胃和中。余

宿冷之劑。參朮二香湯。或助胃膏。熱吐者。因兒夏月感

暑熱在胃。或過食炙煇。積熱所致。其候煩躁熱渴。面赤

唇紅。便秘。溺赤。吐少而多。治法清熱止吐。用葛半湯。若

