

水菓部

穀菜部

金石部

禽獸部

祛寒之劑

清暑之劑

利濕之劑

潤燥之劑

渭珍

本草醫方合編

卷四



喜黃鵲

喜黃鵲之始來悲秋蟬之哀鳴

未曉字休無見

松年

何至於西首堂

肆意欲影

鵲聲鵲鳴

東風彈見洒松年何書

初學欲影習字



導子甘溫而瀉脾之菓也脾者黃宮故

醫方集解卷之四

能交水火而媾心腎安靖上下君相火

邪古方治心腎不交勞傷白濁有益十

二經脉血氣滯精氣厚腸胃除寒熱治

脾泄久痢白濁夢遺女人崩帶及諸血

病大便燥者勿服去心皮蒸熟焙乾

用得茯苓山藥白朮枸杞良黑而沉水

者為石蓮清心除煩開胃進食而治噤

口痢淋濁諸症石蓮入水則沉入鹵則

浮至頂鹵乃可煎落田野中者百年不壞人得食之髮黑不老肆中石蓮產廣

祛寒之劑寒中于表宜汗寒中于裏宜溫蓋人之

其所則折壽而不彰寒者陰慘肅殺之氣西陰盛則

陽衰迨至陽竭陰絕則死矣仲景著書此從傷寒以

立論誠欲以寒病為綱而明其例也其在陽者則

用桂麻柴葛之辛溫以散之其在三陰者非假薑附

桂萸之辛熱參朮甘草之甘溫則無以祛其陰冷之

邪冷而復其若天與日之元陽也諸傷寒濕者皆視

此為治矣

理中湯

治傷寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹痛糞

溇脉沉無力或厥冷拘急或結胸吐衄及感寒霍亂

脾經也腹滿而吐食不下自利腹痛為太陰病自利渴

者為熱不渴者為寒喜嘔腹痛便溇皆虛寒所致寒徹

于外則手足厥冷拘急寒凝于中則結胸泄瀉吐衄霍

中樹上其味大苦不宜入藥。蓮心為末米飲下瘰癧

後血渴

蓮蕊鬚 甘溫而瀉清心通腎益血固精

烏鬚黑髮止夢遺遺精吐崩諸血略與

蓮子同功

藕節 瀉平解熱毒消瘀血止吐衄淋痢

一切血症和生地汁童便服良藕生甘寒涼血散

瘀宋大官作血蝕謬落藕皮血遂渙散不凝一人病血淋痛脹欲死李時珍

以髮灰二錢藕汁調服三日而愈止渴

除煩聖惠方藕汁蜜和解酒毒解毒爛

若陰寒所致者宜此湯。三陽傳陰經而下利者為協熱利。陰寒直中陰經而下利者為寒利。外邪傳裏而腹痛者其痛不常。陰寒在內而腹痛者痛無休。利大腹屬太陰。少腹屬少陰。臍下屬厥陰。亦有與痰火者。三陽下利身熱。太陰下利手足溫。下利身冷其大較也。下利雖有表症不可發汗。為邪氣內攻走津液而胃虛也。

白朮陳壁土炒二兩人參 乾薑炮甘草炙一兩 每服四錢自

利腹痛者加木香不痛利多者倍白朮渴者倍白朮

益氣燥濕故能生津踈臥沉重利不止加附子此兼少陰症腹滿去甘

草甘令嘔吐去白朮加半夏薑汁白朮甘壅薑夏散逆臍下動氣

去朮加桂白朮補氣桂泄奔豚悸加茯苓飲停則悸茯苓利水寧心陰黃加茵

陳寒結胸加枳實本方等分蜜丸名理中丸仲景曰大病瘥後喜



熱酒煮熟甘溫益胃補心多心止瀉實能

大止怒久服令人懽益心生搗金瘡

傷折熟搗塗折裂凍瘡肘後方卒中毒

多益善孟詵曰產後忌生冷澄粉亦佳

安神益胃

荷葉苦平其色青其形仰其中空其象

震震仰感少陽甲膽之氣燒飯含藥裨

助脾胃而升發陽氣潔古枳朮丸用痘

瘡倒靨者用此發之蠶等分爲末胡

勝于人能散瘀血留好血治吐衄崩淋

唾久不了了胃中有

此足太陰藥也人參補氣益脾故以爲君白朮健

濕故以爲臣甘草和中補土故以爲佐乾薑溫胃散

故以爲使以脾土居中故曰理中王海藏曰上世下瀉

脈微細而弱者理中湯主之經又曰傷寒下之利不止

醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤

石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便○宋徽

宗食冰太過病脾疾國醫不效召楊介進大理中丸上

曰服之屢矣介曰疾因食冰臣請以

冰煎此湯是治受病之源也果愈

本方三兩加附子一枚名附子理中湯亦可作丸即四

治中寒腹痛身痛四肢拘急漸傷曰傷卒中曰中中有中

之殊治之當分微甚微則不換金正氣散加附子附子

損傷產瘀熬香末服一切血症洗腎囊風東垣

曰雷頭風症頭面疙痞腫痛憎寒壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥重劑誅罰無過處清震湯治之荷葉一校

升麻蒼朮各五錢煎服鄭真一曰荷葉研末酒服三錢

治遺精極驗

芡實一名雞頭子

甘瀉固腎益精補脾去濕

治泄瀉帶濁小便不禁夢遺滑精同金櫻膏

為丸名水腰膝痺痛吳子野曰人之食

陸二仙丹使華液流通轉相灌溉其功勝于乳

石也經驗後方煮熟研膏合粳米煮粥食益蒸熟搗粉用酒精藥或連殼用

精氣李惟熙云菱寒而芡暖

菱花背日芡花向日

加木匠入肺加桑白皮本方加枳實茯苓蜜丸名枳實

理中丸崔行功治寒實結胸欲絕胸膈高起手不可近

大陷胸不瘥者崔曰此是下後虛逆氣已不理而

其氣次療諸疾用之如神渴者加花粉自汗者加牡蠣本方去甘草加茯苓

烏梅名理中安蛇丸陶仲文治胃寒吐蛇蛇得甘則動故

吐得辛則伏故加椒梅本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯治

太陽表症不除而數下之協熱而利心下痞鞭表裏不

解者欲解表裏之邪全藉中氣為敷布故用理中以和

先表之意也犬抵陽熱為邪則腹滿而咽乾陰寒為邪則腹滿而吐利本方加黃連茯苓

名連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷本方加

甘蔗 甘寒和中助脾除熱潤燥止渴治消

渴消痰解酒毒利二便外臺方嘔嘔或搗汁治發熱口

乾便治嘔噦反胃梅師方蔗汁薑汁和服大便燥

結蔗汁熬之名石蜜即白霜糖唐大曆間有鄒和尚始傳造法性味甘溫補

脾緩肝潤肺和中消痰治嗽多食助熱損齒生蟲紫砂糖功用畧同

芋艿 一名烏芋 一名地栗 甘微寒滑益氣安中開

胃消食飯後宜食之除胸中實熱治五種噎

膈憂膈志膈氣膈熱膈寒膈噎亦五種氣噎食噎勞噎憂噎思噎消渴

黃疸血症蠱毒未服能毀銅注機曰合辟蠱能毀銅銅錢食之

則錢化可見為消堅削積之物故能開五膈消宿食治誤吞銅也

陳皮茯苓名補中湯治泄瀉瀉不已者加附子惡食

不化加砂仁本方加當歸白芍陳皮厚朴川椒入薑

名溫胃湯治憂思鬱結脾肺氣凝脹滿上衝飲食不下

本方加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯海藏亦用本方理中例法

加青皮陳皮名治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

四逆湯仲景四逆者四肢厥逆也再加乾薑二兩即通脈四逆湯治三陰傷寒四逆少陰主藥然三陰通用之

太陽症脈沉亦有此者身痛腹痛下利清穀惡寒木

渴四肢厥冷或反不惡寒面赤煩燥裏寒外熱或乾嘔

或咽痛脈沉微細欲絕腹痛自利裏寒也三陰自利居多身涼脈靜者順身熱脈大者逆

逆兩寒故惡寒不渴四肢者諸陽之本寒則血脈凝滯陽氣不能敷布故一身盡痛而手足厥冷也反不惡寒

菱 一名菱音枝 俗名菱角

甘寒。安中。消暑。止渴。解

酒。有兩角三角四角老嫩之殊。武陵記以

三角四角者為菱。兩角者為菱。菱花隨月而轉。猶葵花之向日。

西瓜 甘寒解暑除煩。便醒酒。名天生

白虎湯。西瓜甜瓜皆屬生冷。多食傷脾。助濕。衛生歌云。瓜桃生冷宜少。

食免致秋來成瘧痢。瓜性寒。曝之尤寒。稽含賦云。瓜曝則寒。油煎則冷。物性之

也。異

穀菜部

粳米。粳硬也。糯也。

甘涼。得天地中和之氣。和

胃。補中色白入肺。除煩清熱。煮汁止渴。

面赤發躁者。陰盛格陽于外也。寒留胸中。故食入即吐。膈有寒飲。故逆而乾嘔。虛火上炎。故咽痛。脈沉者。伏藏也。按少陰脈。有沉。有緊。有數。而仲景統以微細言之。蓋沉必重按始得。緊數亦在沉細中見。不知沉細中見數。大而緊數也。薛慎齋曰。人知數為熱。不知沉細中見數。為寒甚。真陰寒症。脈嘗有七八至者。但按之無以而察之。耳宜深察之。

附子 一枚 生用 乾薑 兩 甘草 兩 炙二 冷服。面赤者。格陽於上。

也。加葱九莖以通陽。喻嘉言曰。陽虛之人。雖有表症。其汗仍出。其手足必厥。纔用表藥。立

至亡陽。不用表藥。外邪不 腹痛者。真陰不足也。加芍藥

二兩以斂陰。咽痛。陰氣上結也。加桔梗一兩以利咽。利

止。脈不出。加入參二兩以助陽。補氣血。嘔吐。加生薑二

兩以散逆氣。以上皆通脈四逆湯。加減法也。



仲景白虎湯。桃花湯。竹葉石膏湯。並用之以清熱。補不足。張文潛粥記。粥能暢胃氣。生津液。每晨空腹食之。所補不細。昂按。今人終日食粥。不知其妙。迨病中食之。覺與藏府相宜。迨非他物之所能及也。

粳乃稻之絕名。有早中晚三收。晚者得金氣多。性涼。

尤能清熱。北粳涼。南粳溫。白粳涼。紅粳溫。新米食之動氣。陳

廩米冲淡可以養胃。煮汁煎藥亦取其

調腸胃利小便去濕熱除煩渴之功。集成

云。陳米飯緊作團。火煨存性。麻油

膩粉。調傳一切惡瘡。百藥不效者。

糯米。本草名稻米。按詩黍稷稻粱禾麻。菽麥名八穀。此稻與禾所以異乎。

甘溫補脾肺虛寒。堅大便。縮小便。收自

此足少陰藥也。寒淫于內。治以甘熱。故以薑附大熱之

劑。伸發陽氣。表散寒邪。附子生用。亦能發表。甘草亦補中散寒之

品。又以緩薑附之上僭也。甘草為君。乾薑為臣。附子為佐。必冷服者。寒

盛於中。熱飲則格拒不納。經所謂熱因寒用。又曰治寒

以熱涼而行之是也。此奇制之大劑也。用腎位遠。非大劑不能達。仲景云。傷寒醫下之。續

得下利清穀。腹滿身痛者。急當救裏。宜四逆湯。清便自

調。身痛者。急當救表。宜桂枝湯。蓋身痛尚屬表。症急則

先救裏。而後解表也。厥陰篇曰。大汗出。熱不去。內拘急

四肢痛。又下利。厥逆而惡寒者。四逆湯主之。按厥逆症

四肢厥冷。指甲青。脉沉疾。按之有力者。為陽厥。當下之。宜大承氣湯。如脉沉遲。按之無力者。則為陰厥。宜四逆湯。更須速灸之。凡傳經熱邪。則為陽厥。溺赤而四肢熱。直中真寒。謂之陰厥。陰縮而四肢冷。程郊倩曰。世言傳經為熱厥。直中為寒厥。斯言甚謬。三陽之厥。多傳于失

下。此為熱厥。少陰之厥。悉屬于寒厥。陰之熱厥。仲景書

汗。同龍骨牡蠣。發痘瘡。解毒。然性粘滯。為粉能撲汗。化膿。

病人及小兒忌之。糯米釀酒則熱。熬錫尤甚。錫即飴糖。潤肺。

和脾。化痰止嗽。仲景建中湯用之。取其甘以補脾。緩中。多食發濕熱動痰火損齒。

穀芽 甘溫。開胃快脾。下氣和中。消食化。

積。炒用。

大麥芽 鹹溫。能助胃氣上行而資健運。

補脾寬腸。和中下氣。消食除脹。散結祛。

痰。鹹能化一切米麵菓食積。通乳下胎。

外臺方。麥芽一升。蜜一升。服下胎神驗。

降立齋治一婦人。喪子乳脹。幾欲成癰。

僅有傷寒。二日至四五日。而厥者。必發熱一條果如傳邪之說。則在四五日固得矣。論中何云。一二日不知何經之邪。而神速若此。其曰厥應下之者。下其熱。非其厥也。遇發熱則可下。遇厥則萬不可下矣。推原其故。厥陰與少陽。一府一藏。少陽在三陽為盡。陽盡則陰往。故有寒熱之往來。厥陰在三陰為盡。陰盡則陽往。故有寒熱之勝復。凡遇此症。不必論其來自三陽。起自厥陰。只論熱與厥之多少。熱多厥少。知為陽厥。厥多熱少。知為陰厥。熱在後而不退。則陽過勝。而陰不能復。遂有痙痺便血等症。厥在後而不退。則陰過勝。而陽不能復。遂有除中亡陽等症。仲景所以調停二治法。須合陰陽進退之機。陽勝宜下。小承氣湯中。已去芒硝之寒。而有厚朴之溫。在厥陰中。破陽以行陰。陰勝宜溫。縱有陽邪。一見厥利。便宜烏梅丸聚辛熱之品。而加苦寒之佐。在厥陰中。破陰以行陽。雖有上熱如篇首消渴。氣上衝心之症。亦不慮其為打格也。扶陽抑陰之旨微矣。又曰烏梅丸于辛酸入肝藥中。微加苦寒。納逆上之陽邪。而順之使下也。名曰安蚘。實是安胃。故併主下利。見陰陽不相順接。而下利之症。皆可以此方括之也。經曰。凡陰陽不相順接。便為厥。手足逆冷是也。方時行曰。三陰三陽之

單用麥芽一二兩炒煎服立消其破血散氣如此良方云神麴亦善下胎皆不可輕用久服消腎氣王好古曰麥芽神麴戊己腐熟水穀李時珍曰無積而服之消人元氣與白朮諸藥消補兼施則無害也炒用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味為使

小麥味甘微寒養心除煩利溲止血時珍

曰素問麥屬火心之穀也鄭玄屬木許慎屬金別錄云養肝與鄭說合思邈云養心與素問合當以素問為準按麥秋種夏熟備受四時之氣南方地暖下燥不如北產之良仲景治婦人藏燥症悲傷欲哭狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥一升甘草一兩每服一兩亦補脾氣聖惠方小麥飯治煩熱少睡多渴

脉俱相接于手足陰主寒陽主熱陽氣內陷不與陰氣相順接則手足厥冷也附喻嘉言論桂附九曰藏為陰可勝純陽之藥府為陽必加陰藥一二味制其僭熱經絡之淺又當加和營衛併宣導之藥本方加白朮大棗名木附湯金匱治風濕相搏身軀煩疼及中寒發厥心痛本方除甘草名乾薑附子湯仲景治下後復汗晝躁夜靜不嘔不渴無表症脉沉微無大熱者

晝日煩躁虛陽擾亂外見假熱也夜安靜不嘔渴脉沉微無大熱陰氣獨治內係真寒也凡陰虛之極陽必厥陽虛之極陰必躁薑附直從陰中回陽不當以晝日煩躁而疑之矣又治中寒厥逆眩仆無汗或自汗淋漓中寒之症身強口噤眩運無汗或自汗者漢理素虛而陽微也傷寒發熱中寒不發熱以此為異仲景于傷寒則詳之而中寒未之及何也曰陽動陰靜陰寒既鬱而成熱遂從乎陽傳變不一靡有定方故極推其病不得不詳也不及外熱者陰邪一定而不移則不變故不必詳也

麵甘溫補虛養氣助五藏厚腸胃然能

壅氣作渴助濕發熱陳者良寒食日紙袋盛懸風

處名寒食麵年久不熟入藥尤良

浮小麥即水淘咸浮起者鹹

涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸汗為心液夢為心穀浮者

無因故能涼心麥麩同功

麥麩醋拌蒸能散血止

痛熨腰脚折傷風濕痺痛寒濕脚氣互

易至汗出良麥之涼在皮故麵去皮即熱凡瘡瘍瘰癧潰爛不能

著席者用麥麩裝褥臥性涼而軟誠妙法也

甘平益氣和中宜脾利胃陶弘景曰稷米入亦

不識書記多云黍與稷相似又註黍米

煩躁陰盛格陽陰症薑附湯加當歸肉桂人蜜和服名

薑附歸桂湯喻嘉言曰服薑附湯後繼服此湯

得藥病相當也再加人參甘草名薑附歸桂湯

加薑煎喻氏曰服前湯後繼當服此兼補氣血本方除甘草加葱

白通湯復陽通脈再加人尿猪膽汁名白通加人尿猪胆汁

湯仲景見後本方加人參一兩名四逆加人參湯仲景治惡寒

脉微復利利止亡血惡寒脉微復利陽虛陰勝也利止則津液內竭故云亡血與四逆溫

經復陽加人參生津益血再加茯苓六兩名茯苓四逆湯仲景治汗下

後病不解而煩躁過汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而裏虛陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用

茯苓人參入心以除煩本方除乾薑加芍藥三兩名芍

宜入發宿病。詩云：黍稷稻粱，禾麻菽麥。此八穀也。俗猶不能辨證。況芝英乎。按黍稷辨者頗多，皆無確義。時珍曰：黍稷一類二種，粘者為黍，不粘者為稷。昂謂詩人既云八穀，何必取一類者。強分二種，是仍為七穀矣。蓋稌稷同音，故世妄謂稌為稷。不知稌乃黍類，似粟而粒大疎散，乃北方下穀。南方全無，北方亦不之重。安能越度梗糯而高踞八穀之上也乎。陶氏所說，因是稌黍所以疑也。若稷當屬高大如蘆，世之所謂蘆稷者，實既香美，性復中和，幹又高大，所以能為五穀之長。而先王以之名官也。况稌黍所生不徧，而蘆稷薄海蕃滋。本草乃指蘆稷為蜀黍，其名義亦不倫矣。此實從來之誤。敢為正之，以質明者。又蘆稷最能和中，煎湯溫服，治霍亂吐瀉如神。昂嘗病腹中啾啾，經兩月，有友人見報，飲以蘆稷燒酒一醉而積病暢然。性之中和，又可見矣。

藥甘草附子湯仲景治傷寒發汗不解反惡寒者虛故也

汗出表不解而惡寒獨曰反其為過汗陽弱可知汗出為營虛惡寒為衛虛若重補其陰則惡寒愈甚但回其

陽則陰愈却矣故用附子以回陽而加芍藥以斂陰此營衛兩虛之救法李樞曰汗後亡陽惡寒者表虛也芍藥附子甘草湯下後惡寒者裏虛也四逆湯其有表邪

未盡者必兼發熱柴胡加桂湯又有裏實熱伏于內陽微于外而惡寒便堅者猶須下之傷寒百問曰汗後惡寒人必虛下後發熱人必實是也

本方除附子用甘草四兩乾薑二兩名甘草乾薑湯仲景治傷寒脉

浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急用桂枝湯誤攻其表得之便厥咽中乾煩躁吐逆以此湯以復其陽脉浮自汗

便數惡寒陽不足也攻表重虛其陽得湯便厥胃之津液傷也故以甘草益氣乾薑助陽尤慮辛熱有傷其陰

隨與白芍甘草湯益其陰血復其津液若厥愈足溫者

故症雖鄰于少陰而不敢用四逆也

若厥愈足溫者

粟 甘鹹微寒。養胃。益氣。治胃熱消渴。止

霍亂利小便。千金方。粟米粉。水丸。梧子大者七枚。內醋中細吞之。

治反胃吐食。即梁米有青黃赤白黑諸色。

陳者良。

蕎麥麵 甘寒。降氣。寬腸。治腸胃沉積。孟詵

曰。能鍊五藏垢穢。泄痢帶濁。傳痘瘡潰。昂按亦能解酒積。

爛湯火灼傷脾胃虛寒。勿服。

黑大豆 甘寒。色黑。屬水。似腎。腎之穀也。

豆有五色。故能補腎鎮心。腎水足。則明。各入五藏。

目。腎水足。利水下氣。古方治水腫。每單用。或加他藥散。

更作為藥湯以和其陰。其脚即伸。芍藥甘草各四兩。

別見和門本方加吳茱萸。名茱萸四逆湯。治厥陰少陰。

本方加當歸。木通。名當歸四逆湯。治感寒手足。

細欲絕。及男婦寒疝。臍下冷。引腰膝而痛。寒傷。當歸。木通。

能通血脈。仲景當歸四逆湯見後。本方加茵陳。名茵陳四逆湯。治陰黃。

本方加生脉散。陳皮。名回陽返本湯。治陰盛格陽。本方

加官桂。良薑。半夏。名漿水散。潔治虛寒水瀉。冷汗。脉微。

甚者嘔吐。此為急病。漿水者。泄利漿水。澄澈清。冷也。又曰。加漿水煎之。

當歸四逆湯。景治厥陰傷寒。手足厥冷。脉細欲絕。成氏曰。手

足厥寒者。陽氣外虛。不溫四末。脉細欲絕。者。陰血內弱。脉行不利。與此湯復陽生陰。

熱祛風

炒熱酒沃飲其汁治產後中風危篤及妊娠腰痛兼能發表

金云一以去風

一以消血結

活血

產書云熬令烟絕酒淋服下產後餘

解毒

蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡

緊小者良

小者名馬料豆每晨鹽水吞或鹽水煮食補腎

畏五參龍胆猪肉忌厚朴

犯之動氣

得前胡

杏仁牡蠣石蜜諸胆汁良

赤小豆

甘酸

思邈

色赤心之穀也性下

行通小腸利小便

心與小腸相表裏

行水散血

消腫排膿清熱解毒治瀉痢脚氣

背有患脚

當歸

桂枝

芍藥

細辛

三兩

甘草

炙

通草

即木通

大

康

二十枚

仲景又曰其人素有久寒者加吳茱萸

薑

半斤

酒六斤和煮名四逆加吳茱萸生薑湯

此足厥陰藥也成無已曰脉者血之府也諸血皆屬乎

心通脉者必先補心益血苦先入心當歸之苦以助心

血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急

急食甘以緩之大棗甘草通草以緩陰血

四逆之名多矣而有因寒

因熱之不同此則因風寒中血脉而逆故以當歸辛溫

血中之氣藥為君通脉散逆必先去血中之邪故以桂

枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒為輔未有營衛不和而脉能通者故以芍藥甘草大棗調和營衛通草利九竅通血脉關節諸藥藉之以破阻滯而厥寒散矣周揚俊曰四逆湯全從回陽起見四逆散全從和

氣者。用赤小豆袋盛。朝夕踐踏之。遂食同鯉魚煮。食汁能消水腫。煮粥亦佳。

傳一切瘡疽 雞子白調末。穰之性極粘。乾則難揭。人等根末則不粘。宋仁宗患疥。道士贊能取赤小豆

四十九粒。呪之。雜他藥傳之而愈。中貴任承亮親見。後任自患惡瘡。傳永投以

藥立愈。問之。赤小豆也。承亮始悟道士之呪偽也。後過豫章。見醫治脇疽甚捷。

任曰。莫非赤小豆耶。醫驚拜曰。用此活三十餘口。

止渴解酒通乳下胎。然滲津 願勿復宜。

液。服令人枯瘦 十劑曰。燥可去濕。桑白皮赤小豆之屬是也。

也。按二藥未可言燥。蓋取其行水之功。然以木通防己為通劑。通燥二義似重。

故本集改熱藥為燥劑。而以行水為通劑。

綠豆 甘寒行十二經清熱解毒 一切草木金石

解表裏起見。當歸四逆全從養血通脉起見。不欲入寒熱之味。恐劫其陰也。蓋少陰藏中。重見真陽。陽不固。邪不去。厥陰藏中。職司藏血。不養血。則脉不起。陽不寒之人。亦不用乾薑附子。止用吳茱之走肝者。自內達外足矣。

四通散 仲景此和解之寒劑。因名四通。附次于此。治傷寒少陰症。陽邪入裏。

四逆不溫。或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下

重 陽邪傳裏。熱結于裏。故四肢逆而不溫。氣通挾痰。故欬。氣虛挾飲。故悸。裏有結熱。故小便不利。腹痛下利。

傷寒邪在三陽。則手足必熱。至太陰。則手足溫。至少陰。則熱邪漸深。四肢逆而不溫。至厥陰。則手足逆冷。經

曰。熱深厥亦深。熱微厥亦微。與此湯以散傳經之熱。

柴胡 芍藥 枳實 甘草 等分為末。水調飲。欬

加五味子乾薑併主下利 五味收通氣。乾薑散肺寒。肺與大腸相表裏。上欬下利治。



砒霜毒。利小便。止消渴。治瀉痢。連皮。

用。其涼。粉撲痘瘡潰爛良。一市氏誦觀。音經甚誠出。

行折一足。哀叫菩薩。夢僧授一方。綠豆粉新銚炒紫色。并水調厚敷紙貼。杉木。

扎定其效如神。

白扁豆。甘溫。腥香。色白微黃。脾之穀也。

調脾煖胃。通利三焦。降濁升清。消暑除。

濕。能消脾。止渴。止瀉。專治中宮之病。土。

濕去。正。解酒毒。河豚毒。備急方。新汲水。氣自旺。調末服能解砒。

毒。多食壅氣。子粗圓。色白者入藥。連。

皮炒研用。亦有浸去皮及生用者。

法類。悸加桂枝。引導。小便不利。加茯苓。甘淡。腹痛。加附。

子。以補虛。泄利下重。加薤白。能通大腸。以泄氣滯。

此足少陰藥也。傷寒以陽為主。若陽邪傳裏。而成四逆。

有陰進之象。又不敢以苦寒下之。恐損其陽。經曰。諸四。

逆不可下也。故用枳實泄結熱。甘草調逆氣。柴胡散陽。

邪。芍藥收元陰。用辛苦酸寒之藥。以和解之。則陽氣敷。

布於四末矣。此與少陽之用小柴胡意同。有兼症者。視。

加減為治。陶節菴曰。病在一經。有用熱藥。又用寒藥者。

真武湯。四逆湯。熱藥者。庸醫狐疑。詎能措手。不知寒藥。

治少陰。乃傳經之熱症也。熱藥治少陰。乃直中之寒症。也。昂按仲景傷寒論。陽明症。熱藥。僅一茱萸湯。少陽症。藥主和解。亦有加乾薑者。其餘四經。用薑附黃桂者。不。