

	午 31
	8
	共 2 册

萬氏女科

上

重刊小叙

萬氏婦人科即楚黃羅邑萬密齋先生所著
之濟陰編也其書予婦人一道自調經以迄
產後條分縷析洞悉源委雖窮鄉僻壤罕遇
良醫但能別其句讀明其意義按方劑藥亦
可立起沉痾真壽世之金科也昔王念齋

明府尹吾西昌日曾授梓官衙後解組携板
以去故江右傳布不廣庚午鄉校長兒君弼
出其門竊附淵源幸有藏本予鄉居多暇為
校訂重刊用廣其傳并紀其本末如左

康熙甲午初冬上浣西昌七十老人裘琅玉

聲氏題於世德堂

聲

調經種子湯

當歸身 八錢 川芎 四錢 熟地 一兩 香附 六錢 白芍 六錢 茯苓 六錢

陳皮 三錢 吳茱萸 炒三錢 丹皮 三錢 玄胡索 三錢

若過期而經未色淡者血虛有寒也加官桂炮姜熟艾各一

錢若先期三五日色紫者血虛有熱也加條芩三錢到四貼

生薑三片水碗半煎至一碗空心溫服渣再煎臨卧時服經

至之日服起一日一服藥完經止即當入房必成孕矣縱未

成孕經當對期俟經來再服最效歌曰歸芍熟地香附芩

茯苓陳皮皮索

產前治法

產前之症俱昭客門治之。惟有子懸胎漏胎動。難更可畏。是橫生倒養。不可不急講也。子懸之症。乃胎熱。子不安身。欲起立于胞中。故若懸起之象。其實非子能懸掛也。若作氣盛下之立效矣。用

人參 二錢 白朮 五錢 茯苓 二錢 白芍 五錢 黃芩 三錢 杜仲 二錢

熟地 一兩 生地 三錢 歸身 二錢

此方全是利腰膈之聖藥。少加黃芩清之。則胎得寒。子自定。況方中滋補有餘。而寒涼不足。蓋胎繫於腰腎之間。而胞又結於

任娠之際今藥皆直入于內經之中則深根同蒂子即欲動而
不能況又有清子之藥有不泰然於下者乎

漏胎乃氣血不足之故急宜以峻補之方用

人參二錢 白朮五錢 杜仲二斤 拘枸二斤 山藥二錢 歸身一錢

茯苓一錢 熟地五錢 麥冬二斤 北味五分 復肉二錢 甘草一錢

水煎服

此方不寒不熱安胎之聖藥也凡有胎不安者此方安之神效
胎之動也由于男女之顛狂今補其氣血自然鎮足又何至墮

胎哉

胎動卽漏胎之兆。亦以此方治之。無不神效。

難產如橫生倒養。牝坎凸頃刻也。若無急救之法。何以成醫之聖。然而胎之不順。由於氣血之虧。氣血既虧。子亦煎力。往往不能轉順頭。遂至先以小出。或先脚下矣。倘手足先出。急以針刺兒之手足。則必驚而縮入。急用

人參 一兩 歸身 三兩 川芎 二兩 紅花 三錢

連灌之。少頃則兒頭直而到門矣。倘久之不順。再將前藥服之。不可止也。若兒頭既已到門。久而不下。此交骨不開之故。

并木炭 一兩 歸身 二兩 川芎 一兩 人參 一兩 煎湯服

少頃必然一聲响亮兒即生矣倘見頭不下萬上不可用柞
枝蓋此味專開交骨兒未回頭而見門先開亦斂之道故必須
見頭到門而後可用此方也此產前之法必當熟悉于胃中而
後臨產不致倉皇

小產治法

小產雖無大產之虛而氣血亦大傷矣宜急補之則日後坐胎
不致再有崩漏方用

人參 五錢

茯苓 三錢

熟地 一兩

杜仲 二錢

炮姜 五分

白朮 五

錢

水煎服

此方乃補氣補血之聖方胞動而下必損帶屢補其氣血則帶
屢損處可以重生他日受孕不致有再損之虞也

又治胎動方

白朮 一兩 熟地 一兩 水煎服

此方妙在用白朮以利腰臍用熟地以固根本藥品少而功用
專所以取效神也此方可以救貧苦之人名黑白安胎散

又治胎漏方

白朮 五錢 熟地 一兩 三七根末 五錢 水煎服

此方妙在三七根乃止血神品故奇效如响各止漏絕

治產難方

難產婦人之常但難產非見之橫逆實母之氣甚以致見身不能回轉于是手先出而足先墮矣但見此等生法口中念無上至聖化生佛百遍兒之手足即便縮人急用

人參一兩 附子一錢 歸身二兩 川芎五錢 黃芪一兩

煎湯與之兒身即順立刻產下蓋參芪補氣歸芎補血氣血既足兒易舒展何必服催生之丸哉倘不補氣血而用催生墮胎之藥必致轉利轉虛不殺母必殺子矣

又治產難方

如胞漿已破血來許久而不生者皆因血氣乾枯所致急宜用
歸身四兩川芎一兩益母草二兩人參一兩

鑿煎湯頻服與之自無不下如貧不能得許多參卽數錢亦可
或重用黃芪代之亦可如用黃芪必須三四兩再加附子一錢
橫生逆產俱可治

產後治法

產後之病不可枚舉總以補氣補血爲主產後往往血暈頭痛
身熱腹疼或手足逆而轉筋或心忪滿而吐嘔風邪入而變陰
寒或涼氣侵而直爲厥逆皆然此定於旦夕而危急亂于頃刻

也此時若作外症治之藥下喉卽終之症莫測矣可不慎歟方用
人參五斤白朮五斤熟地二兩歸身二兩川芎二兩荆芥未
二錢炒黑色

此方爲主有風感之加柴胡八分有寒八之加附子一錢肉桂
一錢其餘諸症俱不可亂加以此方服之無不神效但可或減
分兩而不可去取藥味蓋產婦一身之血盡行崩下皮膚腠理
如紙之薄邪原易入然亦易出也故于大劑補正之中累加祛
邪之藥少粘氣味邪則走出于軀壳之外焉可照乎常無病之
人虛其邪之難散而重用逐邪之方也方中妙在純是補氣補

血之品全不願邪盡于補正正氣既盛邪氣自逐此方中原有
荆芥之妙劑不特引氣血各歸經絡亦能引邪氣各出皮毛此
方之所以真奇妙也惟有玉梳痛手接之少痛者宜加入山查
十粒菟仁五個可也一劑可去之餘藥萬不可輕用增入也或
問熟地三日內可用否曰一日何嘗不可用也

產後聖方

人參三系

歸身一兩

川芎五系

荆芥末

一錢炒黑

益母炒

二

水煎服

有風加羌活五分有寒加肉桂一錢血不淨加山楂五粒血暈

加炮姜五分鼻中出血加麥冬二錢夜熱加地骨皮一錢有食
加山查五粒谷芽一錢有痰加白芥子五分餘斷七不可侵入
此方純補氣血而不治表所以爲妙屢治產後無不神效

又產後聖方

產後最宜服參但貧者不易得今酌定一方代之

黃芪

八錢密炙

白朮三錢

歸身三錢

茯苓一錢

熟地四錢

一錢

益母神二錢

淮膝一錢

炮姜一錢

如白汗眼花瀉小爲大是將脫也宜服參附湯人參二兩附子

一錢或二錢三錢參不可得則前方芪可加至三兩更加附子

一錢

臨產宜服獨參湯參不可得則前方去牛膝炮姜加滑石末二錢產自易此湯局月即可服

治乳腫硬方

產後諸症悉屬虛惟乳腫硬發熱則暫宜疏滯可方如左

漏蘆 瓜蒌 橘葉 廿艸節 各一錢 青皮 通艸 各八分

蒲公英 金銀花 各一錢 一二劑即瘥不可多服

小兒開口良方

川山回一片方半 二錢 甘炒五分 煎汁極濃磨川山里二三匙

開口餘搽乳頭上。三日後水見大便出黑屎爲驗。可免終身
切驚風。屢試屢驗。小兒開目。最忌金里黃連。切不可用。

小兒免麻疹方

俟本兒臍帶落下。以新瓦二片。上下各一片。將臍帶夾在中間。
焙成炭。存性。務宜勤視。總以烟盡爲度。取出用碗覆地上。去火
氣。一時取起。戥秤如濟炭重一分外。用辰砂五厘。同臍炭放乳
酥內。乳成細末。另用當歸一錢。防丰一錢。煎流水二三匙。調煎
未與小兒服盡爲度。三日後小兒通身發出沸瘡。樣脫去皮。膚
即驗終身可免麻疹。縱出亦必稀。

又稀痘神驗方

麻子

去壳取肉揀肥白者三十六粒

硃砂

一錢男所極細末須逗紅劈砂爲妙

眞麝香

五厘

將硃砂射香二味共爲細末然後入大蘇三味共研一處極

細成膏子于五月五日午時搽小兒頭項心前心窩爲背心兩

手心兩足心酌勝灣並兩脇窩兩腿灣共一十二處俱要搽到

勿使藥有餘剩如錢大搽後不可洗動待其自落本牢搽過一

次出痘數粒次年端午時再搽一次出痘一二粒再次年端

陽午時又搽一次痘永不出如未過一週小兒于七月七日九

月九日亦依前法搽

之更效傳方之家已十六代不出痘有益無損誠寶赤之靈丹也