

驗方新編

卷十

伍



小兒科

雜治

驚風

痘症

麻症

引種牛痘



驗方新編卷十目錄

小兒科雜治法

初生去毒開口法

岐真人兒科秘法

兒科外治法

稀痘並免驚風

晝啼不止

曲腰啼哭

初生遍身發黃

初生無皮

保嬰各法

夏禹鑄審小兒顏色苗

指紋切要

初生面紅啼哭不止

夜啼不止

遍身奇癢叫啼不止

初生遍身紅赤

週身脫皮



兩腿生瘡脫皮

初生身如魚泡如水晶

紅絲瘤

頭縫不合

小兒鬪眼

兩腮腫硬

口流涎水

口生白點

初生小兒或兩腮腫硬或口內生瘡或生馬牙或重舌水舌蛇
舌吐舌及口不開不食乳等症

身似蛇皮鱗甲

瘡似楊梅破爛有孔

顙門腫大

初生眼目紅赤腫爛

小兒變蒸

口角生瘡

口腫並生馬牙



北京中醫藥大學圖書館版權所有

重舌

木舌

舌忽脹大腫硬即時氣絕

蛇舌

吐舌

頸軟

痰喘有聲

喉嘶聲啞

小兒病後口不能言

兒不食乳

吐乳

缺乳

斷乳

龜胸

龜背並治龜胸

腹痛

肚腹脹大亮如水晶

肚皮忽然青黑

腹中鳴如蛙聲

肚臍腫出



南京中医药大学图书馆版权所有

臍內膿血不乾

預防臍風

臍風

小兒中惡以及痰閉火閉氣閉乍然卒死

氣喘

小兒初發瘧疾

暑月水瀉

吐瀉

初生陰囊過大

小兒痢疾

陰囊赤腫

忽然陰腫

陰縮入腹

陰囊腫墜光亮啼哭

初生小便不通

陽物腫痛

大小便不通

小便數日不通遍身腫痛



北京中醫藥大學圖書館版權所有

初生大小便出血

夜睡遺尿在床

初生糞閉閉塞

足趾向後

疳疾

胎毒

小兒科驚風

驚風論

慢驚

慢驚治驗

急驚

小兒科痘症

痘症治法

痘有四宜

痘有四忌

發熱

形色

起脹



南京中医药大学图书馆版权所有

養漿

痘毒

治驗

看耳法

暑月出痘

出痘兒睡不可驚動

推拿法

舌上痘疔

痘出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目閉面青唇白
氣息俱涼

收結

痘症諸方

辨痘法

辟穢氣法

冬月出痘

二十四項方

痘疔

赤斑核



南京中醫藥大學圖書館版權所有

熱症方形虛疔又現元氣本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出快

上身痘已起脹下身痘尚未出或出而陷下不起

痘不起漿

痘症黑陷不起

兩頭痘

蛇皮痘

空倉痘

菜黃痘

血泡痘

白漿痘

漏痘

蛙痘

琉璃痘

草尾珠痘

黑痘

頭面頸項諸痘



南京中医药大学图书馆藏

眼中生痘

出痘眼目紅腫

出痘眼痛

出痘縮舌

舌上爛痘

出痘腎腫

陰戶有痘

痘出不透腹痛黑陷

雜痘一齊湧出

痘症作癢

免痘入眼

出痘症眼有膿血

舌與鼻孔有痘

舌上有痘

出痘口噤不語

腎嘴有痘

痘症夾斑夾丹夾疹而出

中痘中風

驗痘出齊法

痘中生疽癢不可忍



南京中醫藥大學圖書館版權所有

痘症發熱胡言亂語

狂熱痘毒麻木致死

痘症潰爛膿水淋漓

痘症小便不通

痘症口鼻耳目出膿

痘風餘毒入目致生翳筋膜或成珠目翳眼

痘後風眼或起翳赤紅

痘後兩目難開

痘後鼻常流涕作臭

痘後唇口生瘡

痘齊熱退愛睡地上旦發

皮肉紅腫而痘不腫

痘症泄瀉

痘症大便不通

痘風眼邊紅爛作癢

痘後耳內腫痛時流膿血

痘後唇不蓋齒

痘後齒癢或出血



痘後牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳

痘後口角流涎

痘後咽喉腫痛

痘後昏迷亂語

痘後聲啞

痘後心痛不可忍

痘後肚腹腫脹

痘後浮腫

痘後癰毒初起紅腫

痘毒色白

痘後遍身無皮膿水淋漓

痘後中蝕疳瘡

痘風瘡逢春即發

孕婦痘症

發熱

見點

灌漿

墮胎

產後出痘



北京中醫藥大學圖書館版權所有

引牛痘說

信洋痘說

小兒科癩症

癩症論

癩症與傷寒

論癩症輕重

癩症四忌

癩症治法

癩發不起

癩症作癢



南京中医药大学图书馆藏 版权所有

驗方新編卷之十

小兒科雜治

初生去毒開口法

小兒初離母體口有液毒形如血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門他日發爲驚熱瘡疾惡痘等症須於未啼時急用絲棉裹指捲去口內濁穢以清肺腑

又方 新產小兒飲食未開胃氣未動是混一清虛之府以甘草細切少許將潔淨細絹包裹用滾開水泡浸盞內不宜太甜乃用軟帛裹指蘸汁徧拭口中去其穢濁隨用胡桃肉又名核桃去皮研極爛

以稀絹或薄紗包如小棗納兒口中任其吮汁吮盡方可食乳非



中醫藥大學圖書館版權所有

獨和中且能養臟最佳法也

又方 熟軍 枳壳 歸尾 生甘草各五 紅花 桃仁各三 此藥

須早預備兒初生時即以水一茶鍾煎至半鍾以新棉花

藥水內泡透取出裹指上納兒口中吮之再泡再吮不吮則口過

片時小兒解下黑糞再與吮之以糞色不黑為止此藥必於下地

六個時辰內服之服後方可食乳此方最能去毒免疫有益無損

又方 凡小兒落地時燒椒欖核一枚存性研末硃砂五分和勻嚼

生芝蔴一口津吐和藥絹包如棗核大安兒口中待啞一時久方

可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾出痘稀少故也

又方 淡豆豉 甘草各三 濃煎汁屢屢與食以一酒杯為度其毒

自下又能助養脾氣且免驚風

又方 若母體氣素寒小兒清弱者及產時收生遲慢致受風寒者
兒必面色眊白唇色淡紅只以淡姜湯服之最能去胃寒通神明
並可免吐瀉之患此法最妙人所未知服後仍照前各法
保嬰各法

凡天寒孩兒生下不哭或已哭不響宜急用衣物包裹再用香油紙
撚將臍帶艾火灸斷使暖氣入腹漸漸作聲而活若先剪斷臍帶
氣絕死矣

有悶臍生者兒冀門有一膜閉住其氣故不能作聲當以手微拍之
則膜破而能哭如拍之不破須用女人之輕巧者以銀簪輕輕挑

破或不能挑者急用煖衣緊抱勿令散放用藥水浸其胞衣天寒則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破出聲而甦

兒生三日有於髮際中間灸者乃灸其風路也然此法因舊地多寒故宜若東南地土多溫斷不宜灸

兒生次日卽看口中上腭有白泡點子卽以銀針輕輕刮破將泡中白米取出勿令落入喉中仍以陳墨擦之如次日不取則泡堅難破慢事又有馬牙在牙齦上白點如碎米亦須急急挑出以墨擦之間日再看再生再挑

兒生三日相傳洗三若受風寒臍風由此而起雖夏日亦宜避風冬日尤慎之又慎况初生亦宜戒浴欲其勿受外邪也



北京中醫藥大學圖書館藏

兒生下時欲斷臍帶必以蘄艾一小丸用香油浸濕薰燒至焦方斷其束臍須用軟綿帕裹束勿令兒尿濕臍此須防臍風第一要法
小兒臍帶落下即用淨板刷洗將臍帶取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡取出安置新瓦上用碗蓋之存性研爲細末將透明硃砂研末飛過如臍帶灰四分用硃砂二分和勻蜜糖拌塗乳婦乳頭上令兒吮食使穢氣胎毒卽從大便遺下箇箇保全此延生妙法臍帶內有虫當去之

小兒初生兩乳必有核子以散爲度否則腫硬成毒啼哭不已如初生洗浴時卽將兩乳揉去乳汁其核自消

小兒初生每日用茶加鹽少許蘸拭其口二三次此法至穩至妙世