

婦科精蘊月經論

第三十八章經難經痛症

是編專論婦人月經不調，首以經痛肇其端，蓋經水由婦人子宮流行，每月一次，究其故則有三事，可爲預兆者：一因精珠由子核而出，或一兩個，或數個不等；二因子宮血管衣積血

三因子宮內皮血管將血滲出，及其內皮上衣之珠離落，三者皆經行之基也。按精珠由子核自落一節，每出於不自知，而最爲經之原，維其所以然之故，則當考察也。夫子宮外有微絲血管甚多，旋繞而成衣一層，由廣筋直至子核，此衣之外有肌絲，亦旋繞而與血管相附，故當精珠由子核而出，則子核積血

而紅，遂令旋繞子宮之血管衣，及子宮內皮，亦積血，卒至子宮內皮，將各所積滲而外之，則血溢於子房內矣。血管既滲血入子房，勢必由子宮之頸而遞落陰道，由是而外行之，此行經之大略也。

當此時也，苟其人之身體，及子宮各處，別無疾病，則所覺不過骨盆重墜，腰腿略痛，暗昧無神而已。值身有病，成子宮各處紅腫，或子頸陰道受病，則遇行經必疼痛，且或因忍痛傷及身體者，此經痛之證也。

至論經痛之原，其故不止一端，約而言之，則有三事：一因身體不快，或腦筋不安，或血脈質點不佳，是爲腦筋痛也；二因

子宮受惠。三因子核患壞，苟其人腦筋子宮與子核三者俱安，則斷無有是症。蓋嘗經證之，必於凡上三端有其一，乃可起斯症焉。且有其一，卽成是症者常多，不必三者均見。始足肇此也。故凡醫者遇斯症，卽可據此三事以察之，而治法亦按察出之原以施之，庶得澄本清源之道耳。

顧論經痛，宜分五等，以下論列之。

一因腦筋痛，以致經難。

二因子宮積血，或發炎致經痛。

三因阻塞難出。

四因內皮生假衣。

五因子核患壞。

皆經痛之大端也。

詳辨痛處。

且經痛一症，不能實指其痛處。蓋凡因腦筋痛，紅

腫與阻塞三者痛處每在子宮、子核與骨盆統膜、或子宮左右之連網等處痛者居多，其常犯而纏綿者，則痛每在貼附骨盆之統膜，縱統膜曾經發炎已愈，而該處腦筋尚極疼難忍，甚或因月經積滯，以致炎勢復發者，亦未嘗無之，然痛處究無一定之區，縱於行經之候，頗有形狀可觀，亦未必驟能定其痛處，蓋經痛非祇一端，苟醫者凡遇經痛，不求其原，而拘執古方，則欲其奏功也，蓋亦鮮矣，是非於其病狀察有確據，設法以去之，不可，然即如此，亦或有未盡明而受惑者，幸惑者較少耳，故欲分辨經痛各有不同，並欲設法逐次治之，則當於下逐一講求也。

腦筋經痛症

凡因腦筋痛，以致經行既難而痛者，其故子宮

子核各處非有發炎祇因該部腦筋不安耳

病原 今夫事物之能令胃內腦筋不安者多矣故每當消化時則有肚痛一事焉即事物之能令眼內腦筋不舒或頭面各腦筋受鬱者亦屬不少則子宮亦何獨不然蓋當經水積脹之時即可有腦筋痛一事且也凡人因激鬱而眼腦筋即痛者其人亦必因激鬱即起子宮腦筋痛可知腦筋固有相因者也顧究其腦筋致痛之原復有數端

一因週身之腦筋反常故易致痛

一因血欠紅輪或紅輪太多及血溢

一因血經有病或感受霉毒與酒溼風溼以致血經受患



一因受用太奢，多嗜肥甘，晏安身弱。

一因水性楊花，淫慾過度，以致腦筋痛弱。

病狀 經痛每多於將行則先覺痛，至已行則痛止，亦有痛而復止，止而復痛，直至經淨而痛乃泯者。病人腰腿疼痛，兼週身亦略痛，此其常也。然余曾見有每經行而痛不見於別處，獨限於一手之小指外面者，更有於將行之先，獨覺鼻根疼痛，數日乃止者，此又希奇之症也。又有忽然疼痛，急切難忍，以致謔語狂妄者，病人倒置牀上，極形痛苦，如是者約數時，痛忽減而經即行，惟數日內仍覺微痛，至經淨則痛亦止。

辨症 凡行經而覺子宮痛者，固可無疑，其爲經痛症，然苟其

經水潔淨，無甚淆雜，既無血團而行無苦狀，更察其內無塞滯，如此則可證其非因子宮塞滯而起。雖塞滯一節，非易詳辨，然執此以辨，可證其病即屬腦筋。至於因紅腫而致者，其與此不同之處，在乎週身無恙，且此為每月所必有，而非或有或無者也。若發炎者，更與此不同，蓋此則子宮內皮既無炎狀，即子核各處亦無紅腫，且於經淨之後未復之前，既無白帶，亦無疼痛，是更與之不同。按是亦即病屬腦筋，於下文逐一詳之。

判症

凡人受腦筋痛，以致經痛者，苟能於起居飲食盡行遷

變，則可冀其能愈，倘無所變，則殊非易治。

治法

治此症，其首當講求者，乃察知其於行經時，何以令腦

筋痛之原，次卽設法以去其原，譬如頭面之腦筋痛，未必無所因而起，故治法無庸拘於患而貴得其原，蓋有因牙壞或耳積垢等因而起者，苟去其牙與耳垢，則痛亦卽止矣。茲所論之經痛，亦正相同耳，故察其若有風溼酒溼入血，則宜用哥枝禁泡，水或沙利先酸，或圭厄禁並熱水，或清熱水氣薰洗，皮外宜受暖衣，天寒尤宜謹慎。倘病人素性奢華，安於淫逸者，宜遷往村鄉，日常操作，夜則早息，飲食則淡薄有益，如此，則素性既遷，宿癖自泯矣。苟其血欠紅輪，則應鐵劑補血，兼以行動多吸清氣，食宜新鮮，心宜安靜，若血溢則宜放血，或泄瀉及各消洩之法，其因感受霉毒氣而起者，則遷換地土，服金雞納霜與鐵

劑甚妙，更能吸受海風，曠觀海景，則受益良深，而以海水沐浴亦效。凡此皆最要之治法也。外此，則仍借外治各法以助之。其中以電氣爲最妙，宜以一線放於尾閭骨，或子宮頸，一線放於肺胃腦部，時常電之，獲效良多。然而腦筋經痛，又有因產孕而自斷根者，是又不待治而自愈者也。其餘專制腦筋痛者，尙有數法：一方用印度加喇嘴酒，每服廿五滴，每四點鐘一次，或於極痛時服之亦妙；或綠養冰十釐，每八點鐘一次。若兼微有抽筋者，則以顛茄膏一釐與高告油和勻，作丸三粒，每八點鐘納一粒入糞門，可止抽筋，惟不可多用，或以阿魏酒射入糞門，亦甚見功。每次用二三錢，開暖水三兩，或以綠養冰十釐和暖水。

六兩射之亦可，而以暖水沐浴，略浸下體，約二三十味呢極妙。

紅腫經痛症

凡婦人每當月經時，其子管子宮之內皮及子核皆發紅，卽骨盆各肌皆可紅脹，倘值其人身體欠安，以致紅腫特甚，則藏匿該處血管之腦筋必作痛，此痛之所由來也。然究其所以紅腫之故，或因本體有患，如子宮不正，抑或身體欠安，如發炎等，皆經痛之原也。此則謂之曰紅腫經痛症，蓋亦偶爾之事，非每月必犯者。故與別有異。按紅腫之勢，其於月經時，能延累腦筋作痛者，每見於子宮與小腹統膜及圓筋等處，或骨盆各肌亦常紅腫者，大率以子宮內皮發紅致痛者居多。且該處既腫痛，則

須俟月經行候始能消之而當紅腫之勢發現則經痛之狀亦肇端矣

病原 此症常因骨盆發炎而致或因受孕過勤子宮受鬱紅腫以致者要其起病之原則有數端

一因血溢

一因受雨溼身或外感

一因心神忽變如驚愁煩腦

一因四合血管欠力流行懶慢

一因子宮逼歪

一因子宮生肉瘤

一因子宮本體脹大

一因子宮內皮發炎

一因子宮四圍連網發炎

一因骨盆統膜發炎

此皆紅腫經痛症之基也更有各處未至發炎而子宮之血管

已先積脹者，故值經期之際，即將該處腦筋壓抑，則痛可立作矣。

病狀 凡婦女在前未嘗犯斯症者，初起忽覺骨盆疼痛，經水較少，或不能出，週身不安，脈浮而速，身皮乾癢，眼赤頭痛，腦筋不安，晝不息，夜不眠，甚或微兼譫語。若見一二處發炎者，則當經期之候，或未至之前，病人必覺昏沉頭重，骨盆特痛，如是者，至經淨各患乃止，甚有既淨之後，各事乃漸止者。

辨症 紅腫經痛，祇因血旺而無發炎者，則其身體不適之狀，忽然起病之形，自與腦筋經痛、塞滯經痛不同，再觀其素無發炎之勢，則又與發炎經痛有異也。凡因發炎以致經痛者，則其

炎勢每見於經期末至之前，而期後困倦，思臥懶言，兼流白帶等狀，更爲此症所有，他症所無者也。

判症 欲判症之安危，首貴察其病勢。若病勢有可挽之機，則症自安。倘病根難除，久必危殆。如症因子宮生癰，或子宮內皮炎，或小腹統膜，或子宮夾膜發炎，或子宮生歪，不能放正等類，皆病勢綿纏，誠非易治者也。

治法 治此症，亦如腦筋經痛，必須察其起病之原，然後按症施藥。倘症因血經受病而起，則一切放血泄瀉、戒口及行動、吸受清氣等事，皆宜小心致意。若病因偶感風寒，或受溼，則宜服鴉片及發表止痛安腦之劑。倘因四合血脈運行欠力，則應補

血行氣宜用藥表劑兼以行動勿好懶閒其因子宮離本位血脈時行腫脹者則應設法將子宮扶正緣子宮不正最爲紅腫經痛症之端或欹前或擁後或下垂不等皆其反常弗正之勢而爲此症之基也且經痛之因此而致者醫者雖已察確其子宮不正尙疑其弊未易能爲此症之基然觀其腹下既重墜及用帶裏紮而得安舒等事則知子宮不正誠足以致紅腫經痛者也其因子宮生癰以致此症者則又當割治乃足以壞其功若因附近有發炎延及子宮受患者更宜按法施治務清其源則症自療矣

塞滯經痛症



夫婦女時或經結停閉於子宮房內，不能行於陰道者，則疴痛之象殊覺裏急，慘如生產，故名之曰塞滯經痛者，以其急而不行，脹抑以致痛也。考其塞處，或在子宮內口，或塞於其頸，不等。卽在陰道與陰戶及半陰膜等處塞閉者，亦未嘗無之。今夫內腑爲水所脹，如膀胱胃腸等，至不能收縮，則肌肉收縮時，勢必疼痛難忍。一俟消除乃舒，否則日久脹鬱，逼痛難堪。而子宮亦何獨不然？蓋經脹不行，勢必作痛，其理亦然也。

病原 至其何以致痛之故，則不一，當分而論之。

一因子宮頸生窄，或稟賦原屬如此。

一因子宮翻轉。

一因陰道生窄。



一因子宮內皮生癰

一因陰膜塞閉

一因子頸肌內生癰

是皆此症之原也。以上數者，偶一有之，卽塞閉而經流不暢，以致作痛焉。按子宮頸生窄，有因稟賦如是者，有因子宮內皮發炎而致者，有因受丹成瘰致窄者，而子頸彎曲，則塞其陰道，形如三角，譬之樹膠管，微曲之則尙可通流，倘對頭彎，則不通矣。至子頸翻紐者，亦或有之，然而甚少，時或因子口不正，藕於陰道，則半閉之，而經亦因之不暢矣。更有於子宮內皮生一小癰，而阻其行者，試以探管入內，仍尙可入，而經水則受礙，不能外流，倘癰生於子房門戶，則其症更險。

病狀 當經期應行之候，積數時而脹溢不出，則骨盆小腹皆痛，其逼痛之狀，恍若小產，卒至經流，則痛稍減，逾時復閉，脹痛如前，如是者數次，其候分三層，始必先因塞閉，血積子宮房內，繼則經積，致令子宮舒縮逼痛，再久之，卒至子宮肌舒縮，略逼血外行，則暫緩，此其病勢如此，無論其塞閉之處，或在陰道，或在子頸，皆然，惟塞在子宮者，則有血團隨經而下，病人卽形舒暢，此其大略形狀也。

辨症 顧觀上文之病狀，無難辨其爲塞閉經痛，然於病狀未

現之先，未易實指其爲斯症，且塞閉既深，則非探管不能查確，若祇塞於陰道，則入指常可摩覺，卽塞在子頸等處者，用探管

