

增訂洪氏小兒一盤珠上卷

金川邑庠生洪金鼎玉友氏纂男濂洛 參訂

小兒要畧論

古人云。寧治十男子。莫治一婦人。寧治十婦人。莫治一小兒。此言小兒號曰啞科。治之甚難。景岳先生又謂其甚易。何以見之。蓋小兒之病。無脉可診。血氣未充故也。病之痛癢。又不能以言傳。惟有望聞切而已。難乎不難。而獨言其易者。抑亦以小兒之病。不過外感風寒。飲食驚風。吐瀉之類。並無七情六鬱。色慾憂思之患。故予治小兒表病。不過香蘇散。惺惺散之類。治小兒裡病。不過平胃散。藿香散之類。治小兒虛痰諸症。不過二陳湯。六君子之類。治小兒實熱諸症。不過小牛黃丸。瀉青丸之類。凡此表裡虛實之病。解表攻裡。只宜輕劑。毋容太表太下。以傷胃氣。至於驚風吐瀉。各種雜症。則又分門別例。而治之矣。

觀面部法

額屬心。心乃鼻屬脾。左腮屬肝。右屬肺。額乃腎經為主宰。五經辨色要分明。面赤心家原有熱。黃乃脾積不須疑。脾虛色白如鉛粉。青則肝經風熱形。黑色之時主腎病。好手醫人着意尋。

看手指法

五指摸摸稍頭冷。便是驚風宜速防。若逢中間一指熱。小兒必定是風寒。中指微微獨自冷。決然麻痘症相當。男左女右分明辨。說與醫人仔細看。

看寒熱法

鼻冷定知是瘡症耳。冷皆因風熱病。遍身潮熱是傷風。發熱解表須當定。上熱下冷為傷食。足冷額熱傷風症。額冷足熱不同看。驚風忽至先可信。

看脉訣法

小兒有病須憑脉。一指用一指。三關定氣息。避冷數熱古今傳。浮風沉積常先識。左手人迎主外感。右手氣口主內疾。洪緊無汗是傷寒。沉細原因傷食積。數大脉來驚風至。虛軟無力慢驚遍。大小不勻為惡候。二至為脫。三至逆。五至為虛。四至損。六至平和。曰無疾。七至八至病尤輕。九至十至痛勢急。十一二至死無疑。古人妙訣無一失。小兒之脉。非比大人之多端。但察其強弱緩急四者。即是肯綮。



看經紋法

經紋經絡三關識。說與醫人仔細覓。紅黃定知五臟和。活潑潑來無病人。紫青傷食純而伏。純黑如墨症候逆。按之不動為肉傷。好手醫人也費力。如鎗直射驚風至。亂如魚骨氣不息。紋細又多青帶紫。應知腹痛時時泣。浮而紅者熱在表。直上三關危如急。病久微紅細若絲。脾虧快把補藥吃。枝又長短病尤輕。弓灣裡順外為逆。長珠還珠猶可救。流珠一見真不吉。醫人詳察風氣命。神聖功巧此其一。

看危症法

小兒渾身熱似火。手足如冰真難過。黑掩太陽口角青。盧醫一見也須驚。黑色如針垂眼下。醫如扁鵲也須怕。黑色目中總不良。小兒十日必然亡。水腫之病準頭黑。此兒應知腎氣絕。咳嗽最忌白入眉。肺氣虛絕報君知。目暗無光不轉睛。三朝必定難存命。眼似開而又不開。能言能是死之媒。嘔吐不止止又吐。土虛脾敗何須顧。搖頭咬齒欲噉人。看看定是鬼為隣。頭門或腫或深沉。元氣虧而命難留。蛔虫吐出腐而敗。脾絕小兒終是患。五心忽腫為何因。假火發外實驚人。四肢無事忽搖動。醫到此無藥用。此是小兒危急症。說與醫人莫順情。

小兒初生要訣

一初生下地不宜久浴。恐冒風寒。必患臍風發熱等症。
一方止用陳茶烹墨洗口。一方用甘草湯洗拭口。去其穢濁。
一方母氣素寒。小兒清弱者。拭口以淡姜湯。胃寒通神明。
一小兒初生洗口後。用釀乳方先吃。候胎尿下。方與乳食。
熟庄黃五分而白乳陳枳殼五分枳榔五分水通五分車前子五分勾藤勾燈心燈心根
一目開唇紅面赤。加此三分。一面白體怯弱者。不乳必吃。
一小兒初生一七。二三七日之內。口中上脘生小粟子一串。或破爛。必啼哭不止。宜詳看之。不可誤作臍風夜啼等症。宜用柳花散。此方屢效。醫人知之者少。

上兒茶 明雄黃 白礪砂 川黃柏

共為細末。乳調。以鴨毛蘸藥。擦上日數次。吞下即愈。

一小兒初生。小便赤澀。用陳茶錢滑石錢一車前錢水煎燈心引。



一 小兒初生手指連皮不能分開用琴線鋸開而血不止用生蒲黃為末擦之血即止若過一七二七則難鋸矣
一 小兒初生古方多用硃砂輕粉白密黃連以下胎毒不知此皆傷脾敗陽之藥輕粉下痰損心硃砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷反致變生諸病是固不可不察也
一 小兒初生拭口後用胡桃肉去皮嚼極爛以薄絹包如小囊納兒口中使吮其汁非獨和中且能養臟最佳法也

臍風要論

凡小兒初生患臍風在富貴之家居多貧乏之家甚少其故何哉予每究心其中恒見富貴孕婦多服補藥及膏粱厚味積胎元至九十月猶不知服清熱和氣之藥故今小兒生下而自口開牙根時生白點一入醫人之手即用針挑及致牙床腫脹不能吮乳不曰馬口臍束手不救吁可歎哉萬一遇此不得已而用之針宜向外隨用清胎散擦之以封針口退火除痛真秘訣也宜早解胎毒自不患此

清胎散

生黃栢 生蒲黃 淨青黛 各五分 共為細末 硃砂 厘人中白 三錢 調前藥擦牙根

田氏擦牙方

天南星 為末 水片 樟腦 各三厘 姜汁 擦牙根立開

一方牙根有泡有粟以布裹指擦破口即開用姜虫為末塗之

一 臍風啼哭肚多青筋每見醫人用燈火一二百壯損其皮膚愈增哭泣百無一生萬不獲已止用十餘壯慎之慎之

臍風治法

小兒名曰是啞科好手醫人意揣摩初離母腹患臍風一時要治不知何我曾定方於未產早清胎熱自平利若速生下仍不免依方治驗笑呵呵舌尖強便不吮乳清胎散用可速除再有三般神妙散始見奇功若扁盧外有數臍古妙方生毒慈腦與田螺加入麝香漿臍子一同搗爛不須多敷遍臍旁一指厚半時札處起沉痾內服小紅丸一顆解清胎毒笑顏多若因口噤還多沫斷臍良方亦可活為末勾藤湯送下或將產母乳上塗令兒吮之真有益奇方奇效何疑乎

清胎散方見前

第一解表神妙散

防風 荊芥 紫蘇 蟬退 薄荷 木通 細辛 赤芍 各五淡豆豉七粒為引

第二攻裡神妙散

枳殼 枳榔 木通 熟庄黃 勾藤 勾七 車前 連翹 姜虫 甘草 各五燈心為引

輕者服此二方即愈

第三解毒神妙散

熟庄黃 川連 化石 枳殼 木通 勾藤 姜虫 連翹 甘草 各五燈心引



五六天不愈。大便閉結。加推車郎。一隻去頭。

小紅丸 巴豆去 牛子 胆星 雄黃各三錢 神砂一錢

斷臍良方 勾藤一錢 銅綠一錢 輕粉一錢 辰砂一錢 射香一錢 錢全蝎尾十隻 右藥共為細末。每服一方。

又易簡單 獨蒜一錢 中脘一錢 上以艾炷灸。

又易簡單 蜈蚣一條 足蛄一錢 末砂一錢 輕粉一錢 各三分。共為末。乳汁調下。

臍石症

臍石四圍腫硬痛。活命丹方吃即安。焙乾十個全虫尾。加入二分好麝香。辰砂銅綠和輕粉。各用五分不可。性五味研成。為細末。二分一服。即安康。乳調搽在乳頭上。令兒吮食。亦為良。此方不是尋常藥。我曾試驗。細推詳。

又治臍石單方。不論男婦皆效。小兒更妙。射香一錢 蒼朮一錢 三味用一半煎水洗臍傍。一半煎吃效。

治胎毒法

初生小兒中胎毒。猶如湯潑一身紅。皆因母食膏粱味。清胃散煎連見功。生地丹皮熟石羔。知母各六分 連轅亦相同 令兒吃之。真有益。為麥粉鋪熱即鬆。以舊芋布包為麥粉。緩緩撲小兒身上。紅即退。如無為麥粉。菜豆粉代之。

遊風丹毒起或一片或數片或時紅腫或時消是也此症宜速治通則不救

遊風丹毒原無定頭面四肢皆見形。忽然紅腫似流霞。走入心胸便殺人。好把消毒飲速救。外有單方敷亦靈。若還二便皆不通。連為湯用莫留停。

消毒飲 牛蒡一錢 荆芥 防風 黃芩一錢 升麻 甘草各一錢 燈心為引

連為湯 連為 瞿麥 車前 木通 滑石各一錢 歸尾 赤芍 防風 荆芥 蟬退 熟庄黃 黑梔仁 黃芩一錢 甘草

各味 三分 伏龍肝為引

簡易單方 伏龍肝一名壯土 用一兩 明雄黃二錢 二味共為末。再加蚯蚓十條。同搗爛。以好醋調敷紅處。隨乾隨換。即退。冬月

無蚯蚓。以陳燕子泥代之。

臍瘡治法

剪臍不慎患臍瘡。日流黃水不能乾。只用枯礬與龍骨。微火炙。微微攪上自然安。

鵝口瘡



北京中醫藥大學圖書館版權所有

胃中濕熱鵝口瘡。口中滿自最難當。快用牛黃散吃下。咽喉紅腫亦同方。外有良方來洗口。白胎退下自安康。
牛黃散為細末。乳調鵝毛掃入口中。日數次即效。牛黃 硼砂 雄黃 黃連酒炒各二分 牛黃恐難卒辦。以玄明粉五代

又治鵝口瘡單方 用紅棗一個 去核入明礬一塊火煨候枯取出。又用水片半分 硼砂二分同研末。先用雄雞血塗口。後以末藥塗之。又方 鵝屎兩 水浸搗爛澄清去渣洗口。白胎即退神方也。

盤腸氣

盤腸氣痛腰屈曲。耳香沒藥真堪搗。加上麝香為細末。各味二分緩緩服。古方只用四磨湯。服後仍哭金不贖。

四磨湯

不用片各味完。用磨水服。枳殼個 檳榔個 沉香塊 小廣香塊 小

金不贖

煨姜引 又加艾葉一枚 公丁香隻 白蔻仁個 小茴香分 勾藤勾四隻

又單方 用慈腦生薑煎湯洗其腹。良久尿出痛自止。

變蒸論

小兒初生有變蒸。發熱驚恐仔細認。額多微汗唇生泡。耳冷吐乳真可信。自生之日為伊始。三十二日一變蒸。三百六十零五骨。每逢十變骨格成。當此之時宜保護。誤投藥味恐生嘔。若兼外感從何辨。唇無白泡卧蜷形。畧與千金黑散服。服之解表自安寧。

千金黑散

麻黃槌去灰 水泡過 杏仁槌去 熟庄黃芩 二水煎服

傷風感冒

傷風感冒感病尤輕。微微發汗自然瘳。一錢紫蘇姜一片。十粒豆豉自康寧。服後若還仍發熱。惺惺散用自然平。悞把紫苓湯退熱。醫人用藥最堪嘔。若果咳嗽流清涕。通神散用亦合宜。

惺惺散

桔梗 細辛 北薄荷 白芷 茯苓 羌活 花粉 防風 木通 甘草各四分 生薑為引。

通神散

紫蘇 薄荷 羌活 細辛 蟬退 乾葛 防風 南星 牛胆 連翹各等分 生薑為引。

發熱論

小兒發熱非一端。或因食積或因寒。有實有虛有積熱。說與醫人仔細看。

一發熱面紅目赤氣粗口渴啼哭煩燥解表即退。宜服 紫蘇 薄荷 防風 蟬退 連翹 木通 車前 羌活 荊芥



地骨皮五錢 硃燈心引
一發熱面白眼青氣微神倦溫補即退宜服
白朮炷 白苓 半夏六錢 參鬚分 蟬退五隻 廣皮 甘草 天麻煨 薑汁各五

一發熱面赤。氣促。兩鼻煽動。汗多。此肺竅不通。肺火有餘。宜服
牛旁炒枳壳 蘇子 北芥子 萊菔子 勾藤 茯苓

一微熱面白氣促兩鼻煽動體虛者宜服白茯苓陳皮半夏蘇子芥子人參肉桂甘草炙黑姜萊菔子

一虛熱日久不退。或手足心時熱時退。虛煩口渴。宜服
 生地錢一 棗皮六分 山藥六分 丹皮四分 白苓六分 澤瀉四錢 當歸酒洗 白芍酒洗

一身熱痰鳴脾胃虛寒宜服人參_{三分}白朮白苓半夏_{各六}陳皮甘草炙附子_{各四}姜引

一疳積發熱肌瘦大便艱澀汗下不解積熱也宜服
川鬱金 胆星 熟庄黃 君子肉 紅麴米 絡三共為細末

一發熱咳嗽。鼻塞聲重。宜服桑皮、薄荷、桔梗、乾葛、紫蘇、
知母、洛五、細辛、三杏、二七。

久熱面目浮腫。鼻流清涕。比體虛復冒風寒。宜服黃芪白朮當歸各六分。麻川柴胡各五分。人參桂枝各四分。方風

甘草各三
煨姜引。

一發熱鼻中出血宜服桑皮杏二味丹皮赤芍也胃皮百葉甘草訓个各五

驚風

小兒急驚風。愛愛驚來目顫力。熱盛田工急驚。空門十闍安。道長。氣足升主拜。同方。長孝貢工。盛長育。一。

二更通來面自發毛最去風效毒效小工凡十生後力驚定不常周胃人并并
反張唇紅魚馬癰清大熱要

風收毒故 恙居 方風 蜀古 前用 單坐 頤之 太養水 導丁 只之 則人 汚力

六牙包三登心。
 一入通口與大黃一。
 天麻炒。薄荷。枳壳。
 荆芥。桔梗。白附。
 甘草。分各四。
 胆星。

分炷心弓

魚力方 巴豆 一錢 牛子 錢半 胆星 雄黃 錢 右為細末 辰砂 魚衣

白朮 半夏 廣皮 人參 甘草 五

治急驚發搐
胆星兩錢
黃錢神砂
雄黃錢半
犀角香分
甘草湯煮
為丸薄荷
湯下服後
吐痰即愈

瀉青丸 瀉陽治急驚水旺生風口眼歪斜 當歸 川芎 桃仁 熟地 熟地 羌活 防風 胆草 湯水為丸茶送下

利驚丸 治急驚發熱喘滿大小便閉 天竺黃 輕粉 青黛 硃砂 二入參 甘草 冰片 麝香 共為末每服茶送下

梅花散 治急驚大小便閉痰涎壅盛 硼砂 牙硝 芒硝 硃砂 二入參 甘草 冰片 麝香 共為末每服茶送下

麥冬湯下

錢氏黃龍散 治急驚表邪未退內亦有熱 柴胡 赤芍 黃芩 甘草 芍藥 水煎姜棗引

四物勾藤湯 治急驚水旺血虛目動筋攣 當歸 川芎 白芍 生地 勾藤

大驚卒恐

小兒忽被大驚神氣失散潰亂不堪發熱驚恐陰陽相逆經脈空虛尚何賓邪之有耶斯時也收復正氣猶恐不暇顧可復為

清散即如硃砂琥珀不過取其鄭重之意亦非救本之法今幼科諸書皆以大驚之症例作急驚論治誤亦甚矣不知急驚

由風熱而致所以不同治大驚氣散之病當以收復神氣為主宜秘旨安神丸 人參 杏仁 茯神 半夏 當歸

白芍 橘紅 五味子 甘草 金箔 十張

安神鎮驚丸 治同 人參 南星 茯神 天竺黃 棗仁 當歸 麥冬 白芍 薄荷 木通 龍骨 金箔 姜汁

為引

慢驚風

慢驚之症實非驚吐瀉亡陽病後成本欲怯風風不見欲將痰瘰瘰瘰無形此症多因脾腎虧虛痰泛上目無神加減醒脾湯速

救異功多服亦有靈不愈六君加南星附子四肢厥冷理中行服後仍然病不休助胃九子亦可尋手足一邊牽動者慢投約

味恐生噴氣已絕十難一動者脾

人參 白朮 炮白苓 茯神 志肉 棗仁 甘草 路路金 蝎尾 洗去頭 肉桂 煨 砂仁 天麻 細公丁香 三

異功散 人參 白朮 炮白苓 甘草 炙陳皮 路路金 等

星附六君子湯 南星 製 附子 製 白朮 白苓 陳皮 人參 法半夏 炙甘草 路路金 等

理中湯 黑姜 白朮 錢人參 甘草 一四股厥冷加附子一錢

助胃丸 人參 錢白朮 炮白苓 錢一公丁香 錢砂仁 錢廣香 不規火肉桂 煨 肉桂 五藿香 一陳皮 一淮山藥 錢一煉密為丸

予嘗治慢脾之症用白朮白苓廣皮人參炙草棗仁當歸勾藤以補土平肝不應即加附子三三往往獲效

景岳胃關前治慢脾瀉不止反腹中時有微痛

熟地二錢 山藥錢半 豆豉錢半 炙甘草分 黑姜分 吳萸分 白朮炒 錢

景岳六味回陽飲治慢驚四肢厥冷

人參 附子 乾姜 炙甘草 熟地一錢 當歸土炒一汗多加黃芪 一泄瀉加白朮

舌症

舌下又生一小舌名為重舌。苦難當。此是心脾原積熱。連喬湯服是良方。重則綉針旁一刺。徐徐出血自然康。若向中央刺一

下血流不止反為殃。又用蒲黃為細末乳調塗舌更為良。

連喬湯 歸尾 連喬 黑枝仁 熟大黃 熟石羔 黃連 甘草 各三

又單方 治重舌神效 用黑棗一個去核留肉包青卷一錢火煨熟取青水濃調以筆蘸點舌下數次即消。

弄舌虛實辨 古云弄舌屬虛非一定之說不可不辨

弄舌舌紅兼有刺此為火逼要推尋口渴飲水并煩燥誤投補藥最難留我曾治驗有良方瀉心湯服即安寧。

瀉心湯 川連五分 酒炒切細片 冷水浸出味徐徐吞下即安 又方 川礪砂水片各三厘為末乳調塗舌尖即安。

治驗

淦城歲進士楊樹德先生令姪夏月吐瀉後患弄舌症自服人參六分更甚請予往治予用川連五分治之彼云弄舌屬虛不

從治予曰唇乾舌燥兼有紅刺此心經火逼堅執用之服後片時即睡睡久不醒又云誤用黃連速將人參六分煎吃少時弄

舌又作復請予往看彼云自誤非淺予將萊豆半鍾米一鍾煎水調六一散一錢服之頓愈愈後一日不進食予將鯽魚一個

砂仁五粒醋煮熟以鼻嗅之即進食而安。

弄舌虛症 姑潤無胎十難救一二誤用

弄舌微微吐即收得於病後最難療古方只用補脾散服之舌定不須憂。

補脾散 人參 白朮 白朮 陳皮 川芎 黃芪 當歸 炙甘草 各等 姜棗引。

又蛇舌風 舒長能捲兩邊每用好明雄黃一塊點舌數次即安不必服藥。

舌出不收

舌出不收

舌出不收名吐舌此是心經實熱來人中白內加水片研末塞之又何害忽然收入問何方川連一味一時回人中白即小



南京中醫藥大學圖書館藏

便桶內。漬垢是也。
又方 水片雄黃礪砂。共為末。乳調塗舌亦效。

舌上白苔

小兒舌上白苔多。名為鵝口。最難當。或存神方來速救。礪砂鵝屎急洗之。
肺熱雄黃加入更為奇。
沉香滾痰丸 治舌上白痰。

熟大黃三錢 黃芩二錢 上沉香五煨 礪石六

口舌生瘡

口舌生瘡或赤爛。急用古方瀉黃散。若兼口渴喜飲冷。白虎湯煎不可慢。

瀉黃散 藿香 黑枝仁 石羔 防風 各五

白虎湯 甘草 熟石羔 桴知母 各一

目睛潤動 兩目不紅不腫。無故而轉動是也。

小兒無故忽自動。此因風木上相攻。相火肝血兩相虧。養血滋陰極有功。

加減四物湯 當歸 川芎 芍藥 生地 柴胡 黑枝仁 各三

六味地黃湯 治同上 生地 八 棗皮 淮山 各六 白芍 五

補中益氣湯 治口動已定。或睡中咬牙。黃芪 人參 白朮 當歸 各八 柴胡 升麻 陳皮 甘草 各四

唇口搖動

唇口之病屬陽明。無端自動是脾虛。六君子湯宜連進。少佐升麻信有靈。誤認風痰非所治。祛風降火反生噴。

六君子湯 人參 白朮 白苓 廣皮 半夏 甘草 各六

搖頭急症

諸風掉眩屬肝經。無故搖頭風熱併。快服柴胡清肝散。加些白芍不須驚。六君子湯仍可用。加上勾藤柴芍靈。

柴胡清肝散 柴胡 梔仁 炒川芎 連翹 桔梗 甘草 黃芩 各等

六君子湯 治同上 人參 白朮 廣皮 半夏 白苓 甘草 柴胡 勾藤 各五



南京中醫藥大學圖書館藏

嘔吐泄瀉四時通用惟夏月不同治

一口濕唇紅嘔吐加竹_茹如石生黃芩

一、小便短少。加水通車前子。

一嘔吐泄瀉兼寒熱加紫蘇全胡

小兒傷食忽泄瀉胃苓湯煎總不差服後依然泄不止七味白朮最堪誇

藿香止氣散合四苓散治嘔泄初起尤妙

胃痛加白芍香附 羅必燁本方加肉蔻

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 豬苓 白苓 白朮 澤瀉 枳實 等

七味白朮散
人參錢一 白朮錢一 白苓錢一 藿香錢一 乾葛錢一 炙甘草錢一 白芍錢一 白芍錢一 酒炒代木香

又單方
治泄瀉
甘草蜜炙
白芍酒炒
車前子鹽水炒

神效丸 治胃虛泄瀉如神。並治嘔吐火嘔泄加竹茹石羔。

藿香一兩
砂仁一兩
白茯苓一兩
赤茯苓一兩
煨甘草一兩
生甘草一兩
每丸重一錢

針燒丸 治胃虛嘔泄立止後仍服神效丸尤妙

黃丹一兩 硃砂五錢 白礬五錢 火煨
三味共為細末 用黑棗肉十個同搗勻為丸
如豆大 臨用針刺放燈焰上燒過存性 研爛米泔

水調吃瀉泄立時即止。

治嘔泄四肢厥冷面白唇青

硫黃三錢胡椒一錢蒸熟炒米飯搗為丸

理中湯 治脾虛吐瀉不煩渴大便稀白

乾姜
白朮
人參
附子
各等

六味合四神丸
治小兒泄瀉。日少夜多。

熟地錢一棗皮茯苓淮山藥各八澤瀉丹皮故芷炒吳萸炒六分炒肉蔻煨去油四肢冷加附子肉桂各五姜棗為引

夏月吐瀉俗云天乾地漏凡小兒三伏之內不宜重

夏月吐瀉多因暑更兼發熱最難除速求止泄泄不止藿香砂仁阻嘔命多阻悞把柴胡前退熱醫人用藥最糊塗我曾治驗

有良方依方取效救嬰兒



南京中医药大学图书馆版权所有

夏月嘔泄熱三者並作最為急症。初服香如飲。解表退熱最為斟酌。夫香如飲夏月發汗之藥。不先服以解表。吐泄為暑氣所逼。何由而止。誤為兜瀉。泄反如傾。不數日而殞。醫人之誤。此其一也。若初起無熱。又不煩渴。用神效凡即效。嘔瀉一上嘔下泄。煩渴飲水。急用藿香砂仁白朮肉蔻等藥。速求止之。而嘔泄更甚。必致陽火歸內。心胸壯熱。手不能近。而四肢厥冷。誤為泄瀉。脾土速投人參附子肉桂。百無一生。醫人之誤。又其一也。小便短少。泄如瀉水。多用車前水通黃。柴胡全胡。利水退熱。必致寒陰發厥。然後補脾止泄。則隨斃不能顧矣。醫人之誤。又其一也。一泄後目不轉睛。面白唇青。手足抽掣。已成慢脾風。時作時止。十不能救一二。予今次第定方。秘方取效。活兒錄矣。香如飲厚朴錢。扁豆炒研。甘草生薑為引。如口渴甚。加酒炒黃連。三香茹飲宜冷服。熱吃更泄。初服一劑得微汗。其熱自退。泄雖不止。亦無妨。如熱不退。又蒼朮木瓜香如飲。五乾葛。五烏梅。麥冬。三甘草。三嘔不止。加竹茹。口渴加連荷竹葉。五熱必退。泄亦漸止。如不退。當服六一散。錢再服。麥冬澤瀉。白朮。白苓。淮山。扁豆。苡仁。北味。麥冬。或服神效丸。瀝炒米一撮。和伏龍肝為引。至此則無不全愈。如又微熱不退。當服八仙長壽丹。熟地黃。棗皮。山藥。茯苓。丹皮。澤瀉。麥冬。北五味。如泄又不止。則內火已退。當服補脾之藥。以防慢脾。白朮。錢人參。五白苓。肉蔻。個去油。甘草。蜜炒。五分。故芷。八苡仁。錢。欠實。錢。砂仁。炒。三建蓮子。去心。陳糯米一鍾。炒黑為引。一泄後兩目無神。眼泡深陷。兼有翳膜。手足微冷。似成慢脾。當服加減醒脾湯。黃芪。錢當歸。白朮。茯苓。神白。芍。人參。肉。棗。仁。天麻。六丁香。甘草。三。龍眼肉。個。五為引。已上數症。依方取效。活人眾矣。神而明之。則又存乎其入。

痢症

小兒痢症多夾食。只用小牛黃丸吃下。後自然紅白去。千金肥兒餅可覓。若將痢症雜方投。逐污行氣損兒。泣。方見。小牛黃丸。熟大黃。川鬱金。胆星。檳榔。厚朴。五。川連。酒。炒。木香。分。

噤口單方

噤口痢症有神方。砂糖少許與煨姜。食鹽火煨。二三。分。陳倉米砂其煎湯。吃後胃開能入藥。調和脾胃自然康。

蒼朮。陳皮。厚朴。甘草。扁豆。霍香。砂仁。等。

一口渴加烏梅。木瓜。一紅朮去加丹皮。生地。地榆。一白多加吳萸。一裡急後重加水香。

痢症轉瘧久不愈。

黃芪。人參。白朮。當歸。甘草。陳皮。五。柴胡。升麻。五。三。

一久痢氣虛兼嘔腹痛。乾姜木香。久痢脫紅。用補中益氣湯為主。

一出肛紅大作痛。加丹皮赤芍。川連槐角。

一不紅不痛。倍加升麻黃芪。加烏梅以收斂之。

一肛出作痒。濕毒生蟲。嚙爛肛門者。以雄黃銅綠為細末。麻油調搽肛門。即效。內服補中益氣湯。加花椒葱腦。

瘡疾

小兒瘡疾名童瘡。只用消食把痰却。便閉腹痛小牛黃。方見發熱無汗通神畧。若將截瘡雜方投。誤兒不治誰能覺。

通神散 紫蘇 薄荷 川羌活 北細辛 防風 乾葛 甘草 生薑為引。一四肢怯冷。加桂枝。

又方 治瘡解表後仍不退。天竺黃 公丁香 天麻 川貝母 當歸身 各五

又單方 治瘡解表後仍不退。白糖霜 錢燒酒杯 臨瘡之日清早調吃。小兒不能飲酒。用水半杯。燒酒半杯亦可。

六君子湯 治小兒痰瘡。人參 白朮 白苓 半夏 甘草 各等

咳嗽

有痰有聲名咳嗽。風寒邪氣肺經受。若兼發熱及憎寒。通神散服功方就。方見瘡舌上黃苔并口渴。二賢散加黃芩。吸火鬱肺

金聲不轉。瀉白散吞若神佑。痰寒喉中喘急者。巴豆塞鼻真堪救。巴豆一粒去壳。搗爛用綿花

二賢散 又名潤廣陳皮 水洗過 甘草 分五

瀉白散 桑皮 杏仁 泔川貝母 黃芩 甘草 胆星 各等 體實寒鼻。氣粗加麻黃 分

肺脹症

肺脹何以辨來由。兩鼻煽動汗如流。胸高氣喘難呼吸。誤認風痰非所求。我曾治驗有神方。瀉肺通竅自然瘳。坊間小兒肺脹

喘疾症。我有神方急救之。蘇子芥子蘿蔔子。桑皮亭陸與杏仁。枳壳庄黃大腸通。肺氣下降藥方靈。

又有古方治喘滿。醫人多作風痰看。大黃檳榔二牽牛。人參加入亦相當。五味研成為細末。密水調吃亦相安。俗云。此是馬脾

風稍遲用藥歸泉鄉。

瀉肺通竅湯 治肺脹。大汗如雨。大便不通。肺竅閉塞。

麻黃 微炒 水 治肺脹。北細辛 路 二桑皮 黃芩 馬兜鈴 亭陸子 蘇子 大黃 路 五 杏仁 五

潤肺通竅湯 治體虛肺脹。無汗。白面肌瘦。但氣急鼻煽。



茯苓 陳皮 當歸 白朮 威靈 杏仁 肉桂 北芥子 半夏 萊菔子 各分 乾姜 蘇子 各三

咬牙症

牙床原屬手陽明。噉乳咬人實可驚。若因驚恐抱龍丸。面赤啼叫用瀉心。呵欠項強肝實熱。柴胡清肝散最靈。病久胃虛牙症。補中益氣白芍桃。

抱龍丸 都雄黃 辰砂 各錢半 胆星 兩 竺黃 錢三 射香 五 為末 和丸 每丸重三分 薄荷湯下

瀉心湯 黃連 五分 柴胡 清肝散 柴胡 黃芩 桃仁 白芍 川芎 連翹 桔梗 各六

補中益氣湯 黃芪 炙水 白朮 炒 當歸 各八 柴胡 陳皮 升麻 炒 人參 甘草 各四分 外加白芍 桃仁 炒 各六

治驗

淦城文博達同學兄令郎。病後微熱不止。噉齒咬人。諸醫用怯風藥不應。請予往治。予曰。風必口眼歪斜。手足抽搦。此鬼咬牙。原屬胃火。遂用人參三分。黃連一分。服後下結糞一次。夜復咬人。又用人參三分。石羔五分。知母一錢。化石五分。共為末。服之不數日而全愈。

蟲病

小兒蟲病多吐沫。病根原為食甘肥。雞肉雞蛋及糖食。三色原來皆香味。令兒多食自生蟲。未滿三旬鮮食之。若因蟲痛從何辨。唇生一泡見病根。痛時腰曲忽大叫。臍下猶如曲弓弦。我今定方來速效。隨時加減自然痊。

一小兒蟲痛。體實口吐黃水。面紅唇燥。當服化蟲丸。花柳 君子 祛 檳榔 烏梅 枳殼 慈腦

一小兒食積蟲積。肚大青筋。當服紅燕丹。石燕 退火 煨 醋 滓 七 為末 用二兩 紅麴米 炒 所 為末 硃砂 水 飛 過 為

末。每服一錢。數日蟲積消。後服異功散。

一小兒忽吐蛇蟲。生活能動者。火逼也。服化蟲丸。

一小兒忽吐蛇蟲。死敗不能動者。脾敗不能養蟲也。多不治。當服安蛇理中湯。花椒 乾姜 白朮 熟附子 人參 甘

又單方 治蟲痛。連頭葱。香油炒食。化蟲為水。



又外治法 花椒兩苦棟根同播爛又用生薑兩灰麪兩同煮糊敷肚皮一炷香蟲即動隨服化蟲丸將蟲一齊退下即安。
一蟲痛口渴飲水不已此蟲在胃脘吸其津液用苦棟根皮五錢煎水加射香二分服之口渴即止真神方也。
一小兒蟲積眼生翳膜肚大青筋當服蘆薈丸後服異功散。蘆薈錢三蝦蟇肝三錢乾雷丸三錢蕪夷錢三右藥共為末每服七分。
用猪肝醃食尤妙。

又單方 治蟲疳害眼 蕪夷 青箱子共為末各錢一用雞肝一具不落水研爛入白酒釀飯上蒸熟食之。

癰症 小兒癰症有五癰治先尋火與尋痰脉滑沫出痰為病脉散腮紅火熱肝治法先分痰與火識破樞機總不難。
夫癰症之發其症不一或眼目直斜口噤流涎或手足抽掣腰曲脊強或形如死狀或一二時方醒宜服導痰湯。
導痰湯 主方五癰初起輕者服之即安 雄黃 貝母 陳皮 茯苓 桔梗 北細辛 菖蒲 瓜蒌 薄荷 蟬退

天麻 鬱金 甘草各三 竹瀝姜汁為飲。

一小兒忽然昏迷抽掣有力為實邪肝癰是也用。

柴胡清肝散方見咬牙門大便不通加庄黃胆草。

一小兒忽然昏迷目赤吐舌飲水為心火心癰是也用。

硃砂安神丸 黃連酒炒二分當歸 生地 甘草各一錢硃砂一分

一小兒忽然昏迷目直發熱面色光潤脾癰是也宜服。

導痰湯 加紫蘇香附蒼朮。

一小兒忽然昏迷面白色手足微動肺癰是也宜用。

五味異功散 人參 白朮 白苓 甘草各等

一小兒忽然昏迷肢體如尸口吐白沫腎癰是也宜用。

六味地黃湯 生地 棗皮 山藥 茯苓 丹皮 澤瀉 紫河車

五癰外治方 耳後高骨間有紫青筋紋用針挑破即醒。

又單方 用竹瀝姜汁灌之即醒。

又單方 用細辛牙皂巴豆為末些微吹鼻即醒。



又單方 用蒜搗爛水調汁以茶匙挑入鼻中二三匙效。
便血症

熱入大腸多便血。補中益氣湯可過。方見前。加入川連與黃芩槐米阿膠一並嚼。
小便滴血為尿血。六味湯加枝子末。又如連喬與麥冬清心降火命自活。方載前。癰症門。
薰前見血清胃散加入槐米與槐角。薰後見血清胃散加入連翹與犀角。
清胃散 石羔煨 青皮 生地 知母 丹皮 甘草 各一錢

吐血症

小兒吐血不須驚。多因飲食積熱成。初起只用平胃散。加入紅麴荆芥穗。服後若還仍不止。再把甘露飲來進。

平胃散 蒼朮 陳皮 川朴 甘草 各一錢 紅麴米 二錢 荆芥穗 五分 炒黑

甘露飲 生地 天冬 麥冬 枳殼 黃芩 丹皮 各八分

一治鼻血不止 生地 桑皮 栢葉 杏仁 黃芩 丹皮 赤芍 各八分

煩渴症

小兒煩渴症非一。有實有虛。須當識。我曾隨症有驗方。依方取效。真有益。

一唇紅舌上乾燥。用生地水通竹葉知母。各六分

一唇紅舌黑。用熟石羔淡竹葉麥冬連喬。各六分 杜心土為引。

一口渴小便閉澀。用豬苓赤苓澤瀉乾薑花粉。各六分

一夜間渴甚。小便不已。用生地黃丹皮澤瀉白苓山藥棗皮麥冬北五味。各六分

一服清火藥渴甚仍不止。當用乾姜白朮人參甘草附子烏梅。

一傷風發熱口渴。用炒梔仁五淡豆豉。十二水煎服。

予治一小兒夏月泄瀉。後煩渴飲茶。小便不止。用熟地黃棗皮山藥茯苓丹皮澤瀉肉桂煩渴略減。後用人參白朮白苓陳皮。

半夏甘草花粉麥冬北味四劑而愈。

予治一小兒夏月泄瀉。煩渴。用黃連煎湯調六一散即安。

予治一小兒泄瀉。後神倦口渴。用白朮白苓人參甘草麥冬即安。



予治一小兒泄後渴甚吐蛇用花椒附子人參白朮烏梅即止。

解顛症

顛門不合曰解顛。少笑多愁屬腎虛。父母精血多不足。先天虧損把藥扶。

六味鹿茸丸。熟地四兩。桑皮二兩。藥二兩。澤瀉半兩。丹皮半兩。白朮半兩。鹿茸洋油酥脆北味錢煉蜜為丸。

外方用天南星為末。醋調綿包烘熱貼顛門。

又外方用細辛肉桂乾姜為末。乳汁和敷上。

補中益氣湯。治顛門忽然低陷。黃芪一錢。白朮炒。白朮炒。當歸各八升。麻錢。柴胡。陳皮。甘草。水附子。錢入參。五。

一顛門忽然高腫突起。用生地。丹皮。茯苓。澤瀉。山藥。棗皮。柴胡。白芍。各等。

龜胸症

龜胸原來肺受熱。攻於胸膈胸自高。急把龜胸丸子吃。龜尿壅之莫憚勞。再炙龜甲入丸子。服後方知藥力高。

龜胸丸。熟大黃。麻黃。黃連。百合。桑皮。燻汁。木通。枳殼。葶藶子。杏仁。炒。芒硝。各等。龜甲。醋。右藥七味為末。以杏仁。

芒硝同研如脂。煉蜜為丸。

取龜尿法。古方用荷葉承龜。用鏡照之。多不應。予用鑊一口。放龜在內。又用鑊一口。蓋定。打鑊驚之。其尿即出。屢效。

用龜尿以鴨毛每日刷小兒胸高處數次。惟平乃止。勿以效遲而不用。

龜背症

龜背皆由風入脊。人於骨髓把骨岢。初起背脊高少許。漸漸跣來背自由。小續命湯去附子。加入防風金不贖。外把龜尿點骨。

節。徐徐刷上功莫忽。

小續命湯。麻黃。桂枝。當歸。人參。乾姜。甘草。川芎。杏仁。白芍。黃芩。防風。各等。

五遲症

五遲者。立遲。行遲。齒遲。髮遲。語遲是也。蓋腎主骨。齒者骨之餘。髮者血之榮。五遲者皆先天有虧。父母精血不足。

地黃丸。五遲主方。熟地。兩。桑皮。兩。山藥。兩。茯苓。兩。澤瀉。兩。丹皮。兩。依古方。等分減半。

一立遲。本方加鹿茸肉桂附子。一行遲。加牛膝鹿茸五加皮。一齒遲。加骨碎補故芷。

一髮遲。加龜板鹿茸首烏。一語遲。用菖蒲茯苓神人參丹參天冬麥冬志肉甘草煎服。



南京中醫藥大學圖書館藏

五軟症
五軟者。頭項手足口肉是也。皆胎秉脾胃氣弱所致。口軟不能嚙物。肉軟不能輔骨。用補中益氣以補中州。解齋門若頌軟天柱不正。手軟持物無力。足軟不能立地。皆用六味地黃丸加鹿茸五味子。

五硬者。仰頭噤氣。手足心硬。口緊肉堅。硬是也。此陽氣不榮於四肢。獨陽無陰之候。木乘土位所致。用六味加麥冬五味。若兼風邪。小續命去附子。二方俱見前。

洪氏寸金丹 治小兒食滯感冒。無不應驗。價廉而功大也。

藿香 蒼朮去土微炒 川厚朴去粗皮剉 陳廣皮 吳神麴炒黃色勿令焦 紫蘇葉 生白芍 赤茯苓 桔梗 白芷法半夏

洪氏退潮丸治小兒發熱痰喘驚風等症

牛黃一錢無牛黃加倍
星亦能清心化痰
胆星三錢全蠱水洗淨去川鬱金
天竺黃 羌活 防風 蟬蛻洗淨去頭
川貝母 化石末

去渣加明礬五錢澄清和煎藥作酒丸每丸重四分硃砂為衣姜水下。

洪氏大紅丸 鎮驚治小兒病後體虛微熱及慢脾等症。

天麻水 姜水 蟲水 黃水 白附水 胆星水 九水 全水 雄水 黃水 白水 木水 壯水 侯水 神水 骨水 志水 肉水 草水 甘水 草水

洪氏黃金丸
治小兒急熱急驚熱痰結胸等症

明雄黃
胆星
川鬱金
玄明粉
熟大黃
五味子
古方用巴豆
玄明粉大黃
易之
右藥共為細末
濃煎薄荷勾藤湯為

丸酒。水每丸重四分。

小兒黃丸 治小兒諸般積熱。

熟大黃 川鬱金 腥星 檳榔 川厚朴 各味甘草 廣木香 火不見川連 酒炒各 味三錢 右藥共為細末 薄荷湯洒水為丸 每

丸重五分。

加麥冬五味若葉
白芷 法半夏